Do-
2628

D.o 2628 (N)

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ZAKŁAD GEOLOGII

GENERAL-REGISTER

DER ERSTEN

ZEHN BÄNDE

NUMMER 1 VON 1850 BIS NUMMER 10 VON 1859

DES

JAHRBUCHES

DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN

GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT.

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ZAKŁAD GEOLOGII

VON

AUGUST FRIEDRICH GRAFEN MARSCHALL VON BURGHOLZHAUSEN,

ERBMARSCHALL VON THÜRINGEN, K. K. W. KÄMMERER, ARCHIVAR DER K. K. GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT u. s. w.

Bibl. Kat. Nauk o Ziemi
Dep. Nr. 72.

WIEN, 1863.

AUS DER KAIS. KÖN. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

BEI WILHELM BRAUMÜLLER, BUCHHÄNDLER DES K. K. HOFES.

Wpisano do inwentarza
ZAKŁADU GEOLOGII
Dział B Nr. 85
Dnia 12. XI. 1946.

POLITECHNIKA GDAŃSKA
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
II 15011

POLITECHNIKA GDAŃSKA ZAKŁAD GEOLOGII

General-Register

der

Jahrgänge 1—10 des Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Von August Fr. Grafen Marschall.

Die Benennungen von Behörden, Anstalten, Aemtern und Vereinen finden sich im Personen-Register. Den Namen minder bekannter Orte, Gegenden, Flüsse, Berge u. dgl. ist die Benennung des Landes oder Bezirkes, in welchem sie liegen, in einer Klammer beigefügt. Ortsnamen, die zugleich zur Bezeichnung von Formationen oder geologischen Gruppen dienen, z. B. „Dachstein-Kalk", „Werfener Schiefer", „Wiener Sandstein" und ähnliche, sind im Sach-Register zu suchen; ebenso Benennungen von Gesteinen, die von den darin enthaltenen organischen Resten entlehnt sind, z. B. „Ammonitenkalk", „Cerithien-Schichten" und ähnliche. Da in den Jahrgängen 8, 9 und 10 die „Verhandlungen" ihre eigene, von der des Textes gesonderte Seitenzahl führen, sind die darin vorkommenden Gegenstände nach denen des Textes aufgeführt und von diesen durch den vorgesetzten Buchstaben *V* gesondert. Die Buchstaben a, b, c, d vor den Zahlzeichen II und III bedeuten die 1., 2., 3. und 4. Abtheilung des betreffenden Jahrganges, deren jeder seine eigene Seitenzahl hat.

I. Personen-Register.

Abel (Jos.). „Bergbau in Serbien." II. b. 57. — Gyps von Mährisch-Ostrau. II. b. 160. — Steinkohlenpflanzen von Mährisch-Ostrau. III. a. 119. Achenbach (Ad.) „Geognostische Beschreibung der Hohenzollern'schen Lande." VIII. 803. Ackerbau-Gesellschaft von Wisconsin (Nord-Amerika). VII. 794. Adler (C. v.). Hauerit. I. 156. — Schwefel von Kalinka. I. 157. Agassiz (L.). „Contributions to the Nat. Hist. of the United States of America." IX. *V.* 65. Aichhorn (S.). Arbeiten des geogn.-mont. Vereins für Steiermark. V. 228. — „Beschreibung der Mineralien-Sammlung des Gratzer Joanneums." VII. 185. — Säugthiere (fossile) von Gratz. VIII. 365. Akner (M. J.). Mineralien von Nagyág. VIII. 122. — Petrefacten-Sammlung. X. *V.* 87. Alken. Nivellement zwischen Nordbahn und Stephanskirche. VIII. 243, 244. Allouez (Cl.). Entdecker der Kupferlager am Lake superior. VII. 785. Alpern (S.). Analyse von Bimsstein. VIII. 152. — Analyse vom Dolomit. VIII. 563. — Analyse von Porzellanerde. VIII. 152. Alth (Dr. v.). Bukowina. V. 219. — Gyps-Formation der Nord-Karpathenländer. IX. 143, *V.* 14. — Höhenbestimmungen in der Bukowina. III. b. 132; X. 345. — Höhenbestimmungen in der Bukowina, der Marmaros und des Kolomeaer Kreises. X. 345. — Oestliche Karpathen. II. a. 139; X. 406, 407, 435. — Paläontologische Sammlungen. X. *V.* 86. Altmann (Dr.). Stein- und Braunkohlenmuster. V. 429, 430. Andrae (Dr. C.). Bergsturz in Siebenbürgen. II. d. 60. — Büdösberg. IV. 169. — Geognostische Reise durch das Banat. III. a. 203. — Gratz und Hartberg. V. 437. — Salsen bei Reiszen. IV. 169. — Sand- und Mergel-Concretionen. IV. 175. — Steiermark und Illyrien. V. 529; VI. 170, 265; VII. 550. — Steinkohlenflora von Wettin. II. b. 172. — Tertiäre Flora von Szakadat und Thalheim. III. d. 134, 135. Andree (Dir.). Gasausströmungen aus Steinkohlenschichten. III. b. 172. Andrian (F. Freih. v.). Brixlegg und Kitzbühel. IX. *V.* 69. — Bukowina und Kolomeaer Kreis. X. *V.* 129. — Dobschau. IX. *V.* 115; X. *V.* 79, 83. — Erzlagerstätten von Zips und Gömör. X. *V.* 39. — Göllnitz und Hamor. IX. *V.* 83. — Saroser Comitat. IX. *V.* 94. — Schiefergebirge der südlichen Zips. X. *V.* 20. — Tirol (geologische Aufnahme). VIII. 795. — Zips und Gömör. X. 535. Angelrodt (E. C.). Erzbezirk von Arkansas und Missouri. IX. *V.* 104. Apeller (P. W.). Höhenmessungen in Tirol. VI. 889.

Aquasi-Boachie (Neger). Niederländischer Berg-Ingenieur auf Java. IX. 278, 291, 292. Armindjan (J. und M.). Entdecker der Erzgänge von Nagyág. VIII. 127. Arneth (Dir. v.). Münzen aus einem römischen Eisenwerke. I. 206. Asiatischen Gesellschaft (Denkschriften der chinesischen Abtheilung der). X. *V.* 2. — — (Publication der) zu Calcutta. X. *V.* 42. Atzelt. Erzlagerstätte von Paak. VIII. 439. — Glanzkohle von Ober-Skallis. VIII. 448. Auer (R. v.). Druckarbeiten für die k. k. geologische Reichsanstalt. II. d. 150; X. *V.* 164. — Polygraphischer Apparat. III. d. 140. — Priorität des Naturselbstdruckes IV. 857. Auerbach (L.). Sammlung von Säugthierresten. X. *V.* 52. Augustin. Entsilberung des Kupfersteines. III. a. 201. Augustin (Freih.). Nekrolog. IV. *V.* 41, 42. — Petrefacte aus den Grundgrabungen des Wiener Arsenalgebäudes. I. 361.

Bach (Alex. Freih.). Besuch in der k. k. geologischen Reichsanstalt. VII. 837. — Verdienste um die k. k. geologische Reichsanstalt. X. *V.* 110. Bach (G.). „Geognostische Karte von Deutschland." VIII. 386. Bach (W.). Iserwiese im Riesengebirge. IV. 832. Bädeker (G. D.). „Berg- und Hütten-Kalender." VI. 887. — „Die gesammten Naturwissenschaften." IX. *V.* 154. Bär (Ferd.). Kalktuff von Scheibbs. I. 376, 377. Balás (P.). Neue Mineralvorkommen von Hodritsch. IV. 183, 835. Balling (Prof.). Techn. Probe der Kohle von Krikehaj. VII. 609. Banater Bergdirection (k. k.). Einsendungen an die k. k. geologische Reichsanstalt. IV. 402, 834. Barrande (Joachim). Colonien im böhmischen Silurbecken. X. 479, *V.* 175. — Graptolithen. I. 746; III. a. 195, b. 139. — Pteropoden (silur.). VI. 611. — Silurgebilde (böhmische). VI. 594, 609; VII. 99; X. *V.* 111, 112, 175. — Silur-Petrefacte von Rokitzan. VII. 162, 355, 372. — „Système Silurien du centre de la Bohême." IV. 430. — Wollaston-Medaille. VIII. 177. Baseler naturforschende Gesellschaft. Geschenk von Büchern an die k. k. geologische Reichsanstalt. IV. 839. Bauer (Dr. Alex.). Eisenerze (schwedische). VIII. *V.* 157. Bauer (Edm.). Steinkohle (vermeintliche) von Senosetz. X. *V.* 45. Baumert (Prof.). Hartit. VII. 93, 94. Bayerische Akademie der Wissenschaften (Vollständige Sammlung der Publicationen der). VII. 825. Becher (Dr.). Karlsbader Sprudel. VII. 204. Beche (Sir H. T. de la). „Geological Observer." IV. 840. Beer (Dr. R.). „Lehrbuch der Markscheidekunst." VII. 840. Beggiato (Fr.). Präsident der Akademie zu Vicenza. VIII. 774. Behm (Dr.). Petrefacte der Septarienthones. VIII. 780; IX. *V.* 88. Belcredi (Graf). Geognostische Reisen in Mähren. II. d. 153; III. a. 175. Beldi (G. Graf). Steinkohlen vom Vulcan-Pass. VI. 409. Bellardi. Tertiäre Cancellarien und Pleurotomen. VI. 180, 181. Benczur (J.). Cement-Fabrik. VII. 757. Benningsen (v.). Geschiebe mit Eindrücken. V. 897, 898. Berdan's Quetsch- und Amalgamirmaschine. V. 207. Bergbau-Gesellschaft im böhmischen Riesengebirge. Schürfungen. IX. 239. -Unternehmungen. Verordnungen über deren Collision mit Eisenbahnen. X. 143. Berg-Commissariate (kais. Verordnung über die). X. 143, 145. — -Hauptmannschaften (kais. Verordnung über die). IX. 700; X. 143. — und Hüttenmänner (Allgemeine Versammlung der österreichischen). IX. *V.* 46, 64, 80. — -Ingenieure in Niederländisch-Indien (Thätigkeit der). IX. 277. Berger (Alb.). Reinhaltung der Eisenbahn-Kantenschienen. III. d. 132. — Schacht-Tonnen (verbesserte). III. d. 132. Berliner geographische Gesellschaft. Druckschriften und Geschichte. III. a. 181. — — — Zeitschrift. IV. 841. Beroldingen (P. Graf). Württembergische Petrefacte. V. 194. Besnard (F. A.). Mineralogischer Jahresbericht. IV. 428. Bessemer's Stahlbereitung in Schweden eingeführt. IX. *V.* 134. Betta (Nob. de). Gründer des naturwissenschaftlichen Vereines zu Verona. VIII. 168. Beust (Freih.). Freiberger Berg- und Hüttenwesen und Eisenbahnen. VI. 197. — Gangsysteme. VII. 179, 180. — Gesetze der Erzvertheilung auf den Freiberger Gängen. VI. 197; IX. *V.* 39. Beyer. Magnetische Beobachtungen von 1735 bis 1736. I. 481. Beyrich (Prof. E.). Kreidepflanzen von Nieder-Schöna. III. d. 125. — Mährische Grauwacke. V. 662. — — Juraschichten. V. 680, 694, 699. — — Kreide. X. 230, 231. — Nordöstliches Böhmen. VII. 816. Bialloblotzky (Fr.). Geologie von Arabien. III. a. 204. Bianconi. Gebirgsarten und Mineralien der Central-Apenninen. V. 195. Bielz (M. und A.). Conchylien-Sammlung. X. *V.* 87. — Geologie von Kronstadt. X. *V.* 105, 106. Binkhorst (J. T. van den). „Terrains crétacés du Limbourg." X. *V.* 93. Binna. Atmosphärische Niederschläge am Haller Salzberg. I. 283. Bischoff (Al. v.). Schwefelbaryum gegen Fäulniss des Holzes. III. d. 131, 132. — (O.). Gediegen Kupfer von Hromitz. VII. 608. — (Prof.). Einwirkung des kohlensauren Wassers auf Eisenoxyd. X. *V.* 80. — — Magnetismus des Serpentins. VIII. 659. Blake (W. P.). Klinochlor. V. 863. Bloede. Gyps in Russisch-Polen. IX. 147, 159. Bodemann. Bestimmung der Heizkraft der Kohlen. III. a. 157 Anmerk. Böckstein (k. k. Bergamt). Aeltere magnetische Beobachtungen. I. 489. Böhm (Dr.). Seehöhe von Prag. VIII. 171, 235, 243 Anmerk. Boettger (R.). Sammlung krystallisirter chemischer Präparate. IV. 417. Born (I. v.). Entdecker der Nagyáger Erzgänge. VIII. 127, 128. Boubée (N.). Ackerbau-Geologie. I. 129. Boucher de Perthes. „Antiquités Celtiques et antédiluviennes. VI. 200. Boué (Dr. A.). Menilitschiefer (eocene). V. 897. — Sulzbacher Hochgebirge. VIII. 407, 408. — Vulcangebilde in Unter-Steiermark. VIII. 404, 448.

Boué (Dr. A.). Warmquellen der Alpen. I. 58. Boussingoult. Chemische Zusammensetzung des Bergtheeres. VII. 745, 746. Bradbury. Phytoglyphie. IV. 860. Braun (D. E F. W.). Kirchneria. V. 886. Brenze (Capl.). Alterthümer aus einem römischen Eisenwerke. I. 205. Breunner (A. Graf). Fisch (fossiler) von Helgoland. V. 832. — Geschenke an das Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 155; II. a. 143; IV. 832; IX. *V.* 40. — Skelet (vollständiges) des Riesen-Elenns aus Irland. IV. 859; VI. 198, 319. — Tertiäre Fossilien von Nieder-Kreuzstetten. II. d. 114. Bronn (Prof. H. G.). Fauna und Flora der Raibler bituminösen Schiefer. IX. *V.* 40. Brücke. Krystall-Sammlungen. V. 643; VIII. 835; IX. *V.* 134. Brugmans (A.). Magnetismus von Mineralien und Gebirgsarten. VIII. 653, 656, 807. Brunner (Jos.). Magnesit von St. Kathrein. VII. 610, 611. — Unterer Triasdolomit der Lombardie. IX. 463. — v. Wattenwyl (K.). Karte der Cantone Appenzell und St. Gallen. VI. 866. Buch (L. v.). Braunkohlen in Europa (Lagerung der). III. a. 178. — Denkmal. VIII. 179, 183, 768; IX. *V.* 107. — Nekrolog. IV. 189, 207. — Studierzimmers (Abbildung seines). V. 212. Burmeister (Prof. H). Nachrichten über Virgil von Helmreichen. IV. 180. Butler-King (M.). Californien. II. c. 121.

Callot (C. Freih.). Dachschiefer in k. k. Schlesien und Mähren. I. 436; II. a. 146. — — des Ziegenruckberges. VII. 466. Canaval (J. L.). Bleierzlager und Muschelmarmor in Kärnthen. V. 212, 213. Carl (Al.). Analyse des Wassers von Trentschin-Teplitz. X. 1. Carnall (v.). Geologische Uebersichtskarte von Deutschland. II. b. 89, 90. — Zeitschrift für preuss. Berg-, Hütten- und Salinenwesen. IV. 841. Carrara (Prof.). Asphalt in Dalmatien. I. 749. Catullo (Prof.). Crustaceen des Grobkalkes von Verona und Vincenza. V. 886. — Geologische Stellung des rothen Ammonitenkalkes. III. c. 126. — Neue Kreidepetrefacte der venetianischen Alpen. I. 190. — Phyllite (fossile Blätter) des Vicentinischen. IV. 113. — Schall-Phänomen am Monte Tomatico. IV. 563. — Schriften (Verzeichniss seiner). IX. *V.* 5. — Tertiäres im Vicentinischen. IV. 113, 180. Central-Baudirection (k. k.). Donaupläne für das Wiener Becken. II. b. 191. Charpentier (T. v.). Magnetische Gesteine. VIII. 659. Cherbourg (Gesellschaft der Naturwissenschaften zu). VII. 363. Chladek. Nivellements in Wien. VIII. 241, 243, 248. Clairmont (W. G.). Drainage. III. a. 73. Clement (Dr. R. S.). Nordsee-Inselkette. IX. *V.* 104. — Oceanische Erdbeben-Wogen in der Nordsee. IX. *V.* 123. Coronini (Graf). Meteorit von Kakova. IX. *V.* 110, 141. Cotta (B.). Verleihung des k. österr. Franz Joseph-Ordens. VII. 197. — Erzlagerstätten der südlichen Bukowina. VI. 103. Cramer (H.). „Steinkohlen-Bergbau des Saal-Kreises." VIII. 774. Craw. Analyse des Klinochlors. V. 856. Credner. Amphibolgneiss des Tauern. V. 784. Cristofoli (A.). Fabrik von künstlichem Marmor. VII. 757. Crivelli (Prof. B.). Esinokalk. IX. 469. — Raibler Schichten in der Lombardie. IX. 470. — „Vorlesungen über Geologie." VI. 170. Czikos (Major). Reste von Cetaceen. VIII. 780. Cumenge. Röstung der Hüttengeschicke mit Wasserdampf. V. 421. Curioni (G.). Lias und Trias der Lombardie. VI. 887, 888, 895; IX. 464, 467, 474. — Lombardische Alpen. IX. *V.* 33. Cybulz (J.). Galvanoplastische Reliefkarte. VIII. 815, 816. Czarnotta (Jos.). Reisebericht aus Persien. III. b. 105. Czerny (Alex.). Goldwäschen am Zollerbach. V. 284, 584. Čžjžek (Joh.). Amethyst von Meissau. I. 158. — Anthracit von Budweis. V. 224. — Aptychenschiefer in Nieder-Oesterreich. III. a. 199, c. 1. — Böhmen (geologische Aufnahmen in). IV. 843; V. 263. — Braunkohle von Zillingdorf und Neufeld. II. d. 47. — — im Tullner Tertiärbecken. III. a. 189, b. 40. — Buchberger Thal. II. a. 152, 153. — Erdbohrungen in Pirawart. IV. 425. — Eocenschichten in Oesterreich und Salzburg. IX. 104, 106, 107, 115, 124, 133, 134, 135, 136. — Gebirg zwischen Altenmark, Stadt Steyer und Weyer. IV. 421. — — — Mautern, St. Pölten und Mölk. IV. 164, 264. — — — Kirchberg an der Bielach und Guttenstein. IV. 164, 264. — Geologen der k. k. geologischen Reichsanstalt (Ernennung zum zweiten). I. 6. — Geologische Reisen. I. 176, 371; II. b. 193; III. a. 91, b. 165, d. 62; IV. 843. — Gräber (römische) bei Bruck an der Leitha. II. b. 192. — Guttensteiner Kalk. IX. 337. — Gyps in Nieder-Oesterreich. II. a. 27. — Hainburg, Leithagebirge und Ruster Berge. III. a. 177, d. 35. — Hallbachthal bei Klein-Zell. IV. 741. — Höhenmessungen in Böhmen. VII. 133. — — im Pilsener Kreise. V. 316, 317; VI. 503; VII. 237. — — in k. k. Schlesien. I. 77. — Holzschwemmcanal (fürstl. Schwarzenbergischer). V. 625. — Hydraulischer Kalk. III. a. 199. — Kalkalpen zwischen Wien und Guttenstein. IV. 741. — Kreidekohle von Grünbach. II. a. 144, b. 107. — Krems (Umgebung von). III. b. 165. — Marmor-Arten in Oesterreich. II. a. 89. — Miesbach'sche Ziegeleien. II. b. 80. — Nekrolog. VI. 665, 857. — Rosaliengebirge. IV. 173, 174; V. 467. — Tertiär-Becken von Budweis. V. 215. Czoernig (Freih.). Geschenke an das Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt. VIII. 177, 178, 764, 815. — Präsident der k. k. geographischen Gesellschaft. IX. *V.* 142.

Daffield (G.). Meteorologie von Detroit (Nd. Amer.). VII. 774, 775. Dana (Prof. J.). Ueber Marcou's „Geology of North-America." X. *V.* 1. — „Geology of the Pacific." IX. *V.* 145. — „System of Mineralogy." VI. 173. Darwin (Ch.). Wollaston-Medaille. X. *V.* 45. Daubeny. Vulcanische Gebilde von Gleichenberg. VI. 276 Anmerk. Daubrawa.

Petrefacte aus Rietzing. VI. 407. Davidson (Th.). „Classification der Brachiopoden.“ VII. 386. Dawson (Dr. J. W.). Devonische Pflanzen aus Canada. X. *V.* 35. Deák. Cement-Fabrik. VII. 757. Debréczényi. Erzlagerstätten von Nagyág. VIII. 114, 717. — Molasse von Nagyág. VIII. 111 Anmerk. — Trachyt von Nagyág. VIII. 101, 103, 105, 107, 713. Dechen (v.). Geognostische Karte von Deutschland. VII. 824. — — — von Rheinland-Westphalen. VII. 198. — Geschiebe mit Eindrücken vom Bodensee. V. 897, 898. Degenhart (C.). Werk über amerikanische Petrefacte. IV. 843. Delbos (Jos.). Faluns im südwestlichen Frankreich. I. 587. Delesse. Baumaterialien auf der Pariser Ausstellung. VII. 747; VIII. 160. — Magnetismus der Mineralien und Felsarten. VIII. 660. Demidoff (A. Fürst). Preisfrage. VI. 865; VII. 169; VIII. 779. — Reisewerk. VI. 864. Deschmann (R.). Barometrische Beobachtungen in Unter-Krain. IX. 258. Deshayes. Wollaston'scher Geldpreis. VII. 363. Deutsche geologische Gesellschaft. Uebersichtskarte von Deutschland. II. b. 89. Doderlein (P.). Subapennin-Petrefacte aus Mittel-Italien. IV. 638. — Tertiäre Fauna von Italien. VI. 182. Dohna. Lignit von Eggenberg. V. 192. Doms (Rob.). Ozokerit. VII. 610. Doppler (Prof. Chr.). Aeltere magnetische Declinations-Beobachtungen. I. 472. Doppler (T.). Salzburger Marmor und Serpentin auf der Pariser Ausstellung. VII. 749, 752. Dormitzer. Brachiopoden. II. d. 150. — Steinkohlenpflanzen (böhmische). III. d. 123. Drescher (Dr. J. E.). Geschenk an das Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt. IX. *V.* 34. Drexel (Fr.). Kreide-Petrefacte von Lemberg. II. a. 194. Drontheimer Akademie. Verbindung mit der k. k. geologischen Reichsanstalt. X. *V.* 93. Duchanoy und Rivot. Nagybányer Berg- und Hüttenwerke. IV. 568. — — Schemnitzer Gold- und Silbergeschicke (Behandlung der). IV. 785. Dufrénoy (A.). Dankschreiben für die geologischen Karten. VI. 904. Dumas (J. B.). Artesischer Brunnen von Paris. VII. 375. — Fundamentalzahlen der elementaren Stoffe. IX. *V.* 7. Dumont (A.). Geologische Karte von Belgien. IV. 173; VII. 375. — — — von Europa. VIII. 804. — Nekrolog. VIII. 173, 774. Duncker. „Palaeontographica.“ IX. *V.* 3, 4, 90. Dupoisat. Vermeintlicher Demant. IX. *V.* 108, 138, 139. Durocher. Silber, dessen Vorkommen und Gewinnung. I. 749.

Ebner (Freih.). Zündung mittelst Reibungs-Elektricität. VII. 828. Ecole des Mines (Reisen der Zöglinge der Pariser). IV. 569. Ehrlich (K.). Alpen (nordöstliche). I. 379; III. a. 191. — Cetaceen im Sande bei Linz. V. 879; VII. 163. — Denkmal für L. v. Buch. VIII. 179. — Enns (geognostische Karte von). II. b. 165. — Geognostische Reisen. I. 176, 628. — Petrefacte aus Ober-Oesterreich und Bayern. I. 162, 738. Eichwald (E. v.). Sammlung seiner Schriften für die k. k. geologische Reichsanstalt. VII. 852. Eisenbahn-Unternehmungen. Verordnung über deren Collision mit Bergbau-Unternehmungen. X. 143. Eitelberger (Dr.). Petrefacte aus dem Brünner Hornstein. II. c. 4. Ellenberger (Dr. J.). Nerineen. II. c. 47. Emmrich (Prof. A.). Alpen (österreichische und ostbayerische). II. a. 1, d. 161; IV. 80, 326, 774. — Alpenkalk von Lienz. VI. 444. Molasse im südlichen Bayern. VI. 433. — Rauschenberg. VI. 896. — Trient. VII. 836; VIII. 295. Engelmann (J. R.). Mastodon angustidens aus der Jauling. IV. 711, 836. Engelshofen (Freih.). Sammlungen. I. 666. Erich (Hofrath). Fossile Baumstämme von Schwadowitz. IX. *V.* 64. Esch. Steinbrüche des Freudenthaler Baubezirkes. V. 394. Escher v. d. Linth. Flysch in Vorarlberg. V. 881; VII. 17. — Kössener Schichten und Dachsteinkalk in Nord-Tirol. X. 106, 107. — Lechthal. VIII. 787, 796; X. 95, 109, 120. — Petrefacte der westlichen Alpen. VII. 19, 35, 379. — Schweiz (geologische Karte der). IV. 841. — Trias und Lias der Lombardie. IX. 465, 469, 477. — Vorarlberg. IV. 775, 776, 842. Eszterházy (Fürst P.). Subscription zum ungarischen geologischen Verein. I. 378. — überlässt der k. k. geologischen Reichsanstalt mehrere Räumlichkeiten. I. 746. Ettingshausen (Prof. C. v.). Anthracitpflanzen von Budweis. V. 197. — Apocyneen (fossile). IV. 192. — Asterophylliten und Calamiten. II. b. 192. — Credneriae. III. b. 171. — Dikotyledonen (tertiäre). II. b. 178. 179. — Euphorbiaceen (fossile). V. 214. — Flora der Braunkohle von Köflach. VIII. 738; IX. *V.* 3, 136. — — — von Oedenburg. IV. 638. — — (eocene) von Laab. IX. *V.* 178, 179. — — — von Monte Promina. IV. 419. — — (fossile) von Eperies. II. b. 146, 147, d. 135. — — — von Häring. I. 557; II. d. 159, 160; IV. 849. — — — von Radoboj. I. 364, 374. — — — von Sotzka. I. 175. — — — von Wittingau. III. d. 144. — — der Gosau-Schichten von Aigen. IV. 168. — — der Grestner Schichten. VIII. 218. — — der Kreide von Nieder-Schöna. III. d. 125. — — des Leithakalkes. III. d. 47, 48; VIII. 227. — — der Liaskohle von Steierdorf. III. a. 194. — — (miocene) von Erlau. V. 211. — — — von Tokaj. V. 202. — — des oberen Neocoms in Schlesien. III. c. 141. — — des Quaders von Hohenstadt. IV. 185. — — — von Moletein. V. 740. — — der Steinkohle in Böhmen. II. d. 165; III. d. 129, 130. — — — von Mährisch-Ostrau und Karwin. III. d. 119; IV. 434. — — — von Reschitza. III. b. 170. — — (tertiäre) von Bilin nnd Teplitz. II. a. 154. — — — von Elbogen-Falkenau. VIII. 494, 590. — — — von Feistritz. IX. 345. — — — des Kaiser Ferdinand-Erbstollens. III. d. 127, 128. — — — der Umgebung von Kremnitz.

III. c. 157; V. 229, 230. — — — des österreichischen Kaiserstaates. I. 679. — — — von Sagor. II. b. 185, 188. — — — von Seegraben. I. 735. — — — von Steinach. IV. 478. — — — von Trofajach. IV. 424. — — — des Wiener Beckens. I. 744; II. d. 39. — — der Trias bei Idria. IX. *V.* 18. — — des Wealden in Hannover. II. b. 156. — Palaeobromelia. III. a. 178. — Palaeoxyris. III. a. 178. — Palmen (tertiäre). II. d. 159. — Pandanus (fossiler). II. a. 157. — Proteaceen (fossile). III. a. 176. — Santalaceen (tertiäre). III. a. 176. — Saxifragaceen (tertiäre). II. b. 159. — Sigillaria cuspidata. III. a. 166. — Steinkohlenflötze (Mächtigkeit der böhmischen). III. a. 188. — Thinnfeldia. V. 886. — Verbindungsglieder zwischen der alpinen und der normalen Steinkohlen-Flora. V. 367. — Wealden-Formation. III. a. 180. — Wurzelstock (fossiler). III. a. 178, 179. Everwyn (R.). Geognostisch-bergmännische Arbeiten im niederländischen Indien. IX. 286, 293. Eyszelt. Braunkohle aus dem südlichen Mähren. IV. 45, 48.

Facen. Schall-Phänomen am Monte Tomatico. IV. 560. Faller (G.). Jahrbuch der k. k. Bergakademie zu Schemnitz. X. *V.* 135. Fangh (R. v.). Reste der Höhlenbären. VIII. 764, 815. Faraday (M.). Theorie der magnet. Erscheinungen. VIII. 652, 672. Favre (Prof. A.). Anthracitschiefer von Savoyen. IX. *V.* 48. Fedreghini. Kreide der Lombardie. IX. 491, 493. — Lias der Lombardie. IX. 485. — Petrefacte der Lombardie. IX. 461, 478, 486. Fellöker (S.). „Anfangsgründe der Mineralogie.“ II. d. 158. Ferdinand Maximilian (Erzh. K. H.). Correspondent der k. k. geol. Reichsanstalt. IX. *V.* 64. 141. Ferientsik (L.). Analyse von Bleikrätze. VIII. 154. X. *V.* Anh. 30. — — von Cement. VIII. 155, 371; X. *V.* Anh. 43. — — von Quecksilbergesteinen. VIII. 760, 761. — — von Werfener Eisenerzen und Zuschlägen. VI. 852. Fernezely (k. k. Hüttenamt). Silber-Schmelzarbeit. II. c. 157. Ferro (J. R.). Gold von Vöröspatak. II. d. 86. — Productionsausweis von Nagyág. III. a. 70. Ferstl (Dr. J. v.). Analyse von Alpenkalk. IV. 139. — — von Eisen und Gussstahl. V. 868. — — von Graphit. V. 868; X. *V.* Anh. 49. — — von Guano (sächsischem). V. 871; X. *V.* Anh. 48. — — von Lehm. IV. 159. — — von Mineralwässern. IV. 148, 194, 683; X. *V.* Anh. 71, 72. — — von Torf. III. a. 158; IV. 152; X. *V.* Anh. 66, 67. — — von Zinkweiss. V. 871. — Geologie von Luhatschowitz. IV. 193. — Mineralquelle (neue) bei Rohitsch. VI. 39. Feuerstein (Jos.). Trigonometrische Höhenbestimmungen an der tirolisch-bayerischen Grenze. IX. 309, *V.* 55. Fichtel (Chr. E. v.). Gebirge von Nagyág. VIII. 125. — Magnetisch-polarer Serpentin. VIII. 658. Fichtner. Brunnengrabung bei Berchtoldsdorf. X. *V.* 31. Ficker (Dr.). Reise in der Bukowina. V. 219. Fiedler (L.). Saugröhren beim Abteufen von Schächten. III. d. 132. Finanzministerium (k. k.). Verordnungen über das Montanwesen. VI. 205, 448, 657, 912; VIII 189, 391, 621, 623, 626, 635, 636, 818. 819; IX. 699; X. 143, 357, 469, 578. Fink (Fr.). Petrefacte aus Wien. II. d. 119, 154; III. a. 166. — Säugthiere (fossile) von Sebenstein. V. 227. Fischer (Dr. v.). Petrefacte aus dem Salzkammergut. V. 427. — (Frz.). Eisensteine von Tragöss. VII. 611; VIII. 365. — (Obrist). Karte von Klein-Asien. V. 435, 436. Fischer-Ooster (R. v.). „Die fossilen Fucoïden der Schweizer Alpen.“ IX. *V.* 135. Fladung (J. A.). Cetaceen-Rippen in Miocen-Sandstein. III. d. 120. — Quarzgeschiebe aus dem weissen Nil. IV. 156. Fligely (GM. v.). Karte von Siebenbürgen. X. *V.* 180. Florian. Magnetische Beobachtungen zu Bleiberg. I. 513. Flügel (Cons. J.). Beförderung von Sendungen aus Nord-Amerika. VIII. 782. Flurl (M. v.). Magnetisch-polarer Serpentin. VIII. 659. Foetterle (Frz.). Asphalt von Seefeld. VII. 196, 372. — Assistenten der k. k. geologischen Reichsanstalt (Ernennung zum). I. 6. — Bayern (geologische Aufnahme von). V. 888. — Bernstein von Krakau. VIII. 177. — Bösing. V. 204. — Brasilien (geognostische Karte von). V. 876. — Braunkohle von Cosina. VIII. 363, 814. — — vom Lubnitzer Graben. VIII. 815. — — von Rosenthal. VII. 371. — — von Voitsberg-Köflach. VI. 872. — — von Wies und Schwanberg. VIII. 386. — Braunkohlenflötze des Arvaër Comitates. II. d. 160. — — in Mittel-Steiermark. VI. 872. — Breunnerit-Fels. III. d. 145. — Conchylien (fossile) von Malomeritz. IV. 79. — Detailkarten (geologische) zur Pariser Ausstellung. VI. 192. — Dinotherium von Mariahilf. VIII. 185. — Einsendungen an das Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 350, 552, 734; II. a. 133, c. 163, d. 135; IV. 183. — Eisenstein-Lagerzüge im östlichen Galizien. VI. 182, 183. — Elephas primigenius. IV. 180; VIII. 177, 815. — Erdöl in West-Galizien. X. *V.* 183. — Gailthaler Schichten und Trias in Kärnthen. VII. 372. — Galmei-Gruben von Wiesloch. II. b. 175. — Geinitz's paläontologische Monographien. VI. 174. — Giebel's „Gaea excursoria Germaniae“. II. a. 169. — Höhenmessungen in Kärnthen. IX. 164. — — in Mähren. VII. 298, 301. — — im Pressburger Comitate. IX. 161. — — im Salzkammergut. V. 198. — — im Venetianischen. VIII. 249. — Jüngere Gebilde in Nordost-Steiermark. IV. 185. — Kärnthen (geologische Aufnahmen in). VI. 201; VII. 386. — — (geologische Karte von). VII. 386. — Kalktuff von Scheibbs. I. 376. — Kalomel-Krystalle (künstliche). III. b. 168. — Kohle von Mährisch-Trübau und Lettowitz. IV. 430. — Kohlenlager von Fünfkirchen. III. d. 142. — Krakau (geologische Aufnahmen in). X. *V.* 86, 100. — Kudernatsch's (Joh.) Ableben. VII. 375. — Küstenland (croatisches). VI. 416. — Längenprofil des Donaustromes. II. d. 164. — Lignit von

Neudegg. VII. 842. — Linarit von Rézbánya. III. a. 19. — Mähren (geologische Aufnahmen in). V. 883; VI. 413, 883; VII. 183, 840; VIII. 184; IX. 17, 38, *V.* 81. — Magnesit in Steiermark. VI. 68. — Meyer's (FML.) Legat an die k. k. geologische Reichsanstalt. IX. *V.* 39. — Mineralien aus Schemnitz. IV. 183. — Mittheilungen und Vorlagen in den Sitzungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. II. b. 177; III. a. 179, 183, 187, b. 162, 171; IV. 427; V. 217, 886; VI. 166, 173, 416, 876, 886, 887; VII. 169, 206, 375; VIII. 178, 815; IX. *V.* 35, 39, 112; X. *V.* 17, 117, 194, 195. — Muschelkalk der Südalpen. VIII. 167. — Museum der vergleichenden Anatomie zu Wien. III. a. 190. — Nieder-Oesterreich (geologische Karte von). VIII. 170. — Ost-Galizien (geologische Aufnahmen in). II. a. 84. — Publicationen der k. k. geologischen Reichsanstalt. II. d. 150. — Quenstedt's „Jura" und „Handbuch der Mineralogie." VIII. 168. — Riesenhirsch. VII. 161. — Rothliegendes in Mähren. VII. 840. — Salzlager (vermeintliche) in Arvaer Comitate. II. d. 156. — Schiefer (Eisenspath führende) von Lauerburg. VII. 369. — Schlesien (geologische Aufnahmen in k. k.). IV. 649. — Schmidburg's (Freih v.) „Grundzüge einer physicalisch-vergleichenden Terrainlehre". VII. 172. — Seelos' „Panorama der Rittner Hornes". IX. *V.* 15. — Schwarzen und Marmora-Meeres (geologische Aufnahme an den Küsten des). IX. *V.* 85, 137, 138. — Semmering (Eisenbahn über den). I. 576. — Silber in einem Hochofen sublimirt. III. a. 199. — Steiermark (geologische Aufnahmen in). IV. 185. — Steinkohlen von Jaworzno. VII. 385. — — von Rossitz. VI. 418, 419. — Steinkohlen-Formation in Brasilien. VI. 196. — — von Wottwowitz und Busstiehrad. X. *V.* 14. — — (angebliche) von Senosetz. X. *V.* 45. — v. Strombeck's „Karte des Herzogthums Braunschweig". VIII. 167. — Südalpen (geologische Aufnahmen in den). VI. 902. — Tatra (galizischer). X. *V.* 120. — Tertiäres auf der Landenge von Korinth. IX. *V.* 86. — Ungarn (geologische Aufnahmen in). IV. 850; IX. *V.* 96; X. *V.* 33, 55. — Venetianischen (geologische Aufnahmen im). VI. 741; VII. 850. — Wasserläufe (unterirdische) im croatischen Küstenlande. VI. 417. — Zerrenner's „Metallurgische Gasfeuerung". VII. 173. — Zeuglodon macrospondylus. I. 562. Foith (E.). Theorie der Steinsalzlager. III. d. 130. Forbes (Prof. Ed.). Britische Fauna und Flora in ihren Beziehungen zu geologischen Veränderungen. IX. 575, 577. — Vertheilung der Meer-Mollusken nach der Tiefe. II. a. 93. Forst-Lehranstalt (k. k.) zu Mariabrunn. Organisation. III. b. 175. Foster. Metallführendes Gebiet am Lake Superior (Nord-Amerika). VII. 776, 784, 786. Fournet. Alpiner Granit-Gneiss. VIII. 529, Anmerk. 2. Frantzius (Dr. A. v.). Grauwacke von Meran. II. c. 16. Franzenau (J.). Entdeckung der Nagyáger Erzgänge. VIII. 127 Anmerk. Frauenfeld (G.). Paludinae (neue) VIII. 449. — Ritter des k. k. Ordens der Eisernen Krone. X. *V.* 186. Freiberger Berg-Akademie. Gangstufen-Sammlung. VI. 162, 175. French (B. F.). „Geschichte des nordamerikanischen Eisenhandels." X. *V.* 136. Frenzel. Gasausströmungen aus Steinkohlenschichten. III. b. 171, 172. Freunden der Naturwissenschaften (Versammlung von). Haupt- und Schlussbericht. III. d. 1. Freyer (H.). Karte von Krain. II. b. 189. Friese (Frz.). Höhen der Rhätischen Alpen. I. 376. — „Die österreichische Bergwerks-Production." VIII. 846. Friesenhof (G. Freih.). Diluviale Säugthiere aus Ungarn. VI. 908; IX. *V.* 113. Fröhlich (Dr. E. H.). Krapiner Mineralquelle. VII. 841. — Rohitscher Mineralquelle. VI. 165. Fuchs (Joh.). Torfmoore. III. a. 195. — (W.). Caprina von Belgrad. V. 892.

Gärtner (Fr.). Bohrbrunnen zu Pirawart. IV. 425. Gaitschnigg (M.). Gründer des Neuhauser Mineralbades. VIII. 461. Gastaldi (B.). Tertiäre Pflanzen aus Piemont. IX. *V.* 135. — „Vertebrati fossili del Piemonte." X. *V.* 18. Gaudin (Th.). Tertiäre Floren. IX. *V.* 135. Geinitz (Prof. H. B.). „Leitpflanzen des Rothliegenden." IX. *V.* 106. — Mineralogisches Museum (k.) zu Dresden. IX. *V.* 106. — Petrefacte des sächsischen Quaders und der Kreide. X. *V.* 178. — Pläner-Petrefacte. III. d. 122. — Rhinoceros Schleiermacheri X. *V.* 178. — Schriften über die sächsische Steinkohlenflora. VI. 174. — Sendungen an die k. k. geolog. Reichsanstalt. VI. 407. — „Steinkohlen-Formation in Sachsen." VII. 829. — Steinkohlen-Flora in Baden. VIII. 350. General-Bau-Direction (k. k.). Profil des Donaustromes bei Wien. II. d. 164. Generalstab (französischer). Methode der Terrain-Aufnahme. IV. 305. Geographische Commission für den österreichischen Kaiserstaat. I. 380; II. b. 161. Geographische Gesellschaften. IV. 285. Geographische Gesellschaft zu Bombay. Publicationen. VIII. 780. — — zu St. Petersburg. IV. 294. — — zu Wien. IX. *V.* 142; X. *V.* 149, 167. Geological Survey of Great-Britain. Geschenk an die k. k. geologische Reichsanstalt. IV. 849; VIII. 186. Geologische Gesellschaft zu Mailand. VIII. 783; IX. *V.* 153. Geologisches Institut der Niederlande. IV. 187. Geologische Reichsanstalt (k. k.). Abhandlungen. III. a. 10, 134, d. 10; VI. 861; VII. *V.* 139; X. *V.* 164. — — Auerbach'sche Fossilien-Sammlung. X. *V.* 52. — — Besuch Sr. kais. Hoheit des Erzherzogs Johann. IX. *V.* 53, 137; X. *V.* 168. — — — Sr. kais. Hoheit des Erzherzogs Stephan und Sr. Durchl. des Prinzen Wilhelm von Schaumburg-Lippe. IX. *V.* 125, 126; X. *V.* 168. — — Bibliothek. III. d. 178; X. *V.* 166, 167. — — Bücher, Karten u. s. w. Acquisitionen. II. d. 163, 184; III. a. 218, b. 192, c. 173, d. 178; IV. 201, 445, 658, 832, 839, 843, 849, 877;

V. 209, 228, 246, 457, 653, 909; VI. 211, 417, 428, 659, 864, 917; VII. 212, 396, 620, 852, 859; VIII. 195, 395, 639, 821; IX. 179, 303, 513, 706, *V.* 90, 106, 124, 140, 141, 145; X. 148, 360, 473, 581, *V.* 1, 2, 54, 81, 92, 93, 135, 136, 166, 189. Geol. Reichsanstalt (k. k.) Chemische Analysen, von 1850—1859, im Laboratorium der k. k. geol. Reichsanstalt ausgeführt. X. *V.* Anhang 1. — — Correspondenten. V. Vorwort IV; VI. I (nach dem Inhalts-Verzeichnisse), 863; VII. Vorwort XX, 161, 198; VIII. Vorwort III; IX. III, *V.* 64, 80, 90, 122, 141, 142, 153; X. *V.* 65, 66, 74, 147, 170. — — Decennal-Bericht. X. *V.* 137. — — Einsendungen an das Museum. I. 154, 350, 552, 734; II. a. 133, b. 144, c. 163, d. 135; III. a. 166, b. 157, c. 156, d. 119; IV. 155, 167, 402, 636, 832, 844; V. 193, 194, 427, 642, 872, 898; VI. 161, 405, 651, 855; VII. 159, 607, 810; VIII. 156, 167, 368, 618, 762, 810, 811; IX. 174, 299, 508, 697, *V.* 34, 40, 49, 54, 55, 64, 88, 105, 109, 110, 122, 134, 141, 147; X. 141, 353, 467, 575, *V.* 1, 16, 42, 43, 69, 166, 178. — — Fremdenbesuch. IV. 844, 845; VIII. 768, 791; IX. *V.* 140; X. *V.* 168. — — Gebäude und Räumlichkeiten. V. Vorwort XVIII; IX. *V.* 66; X. *V.* 145, 146, 187. — — Gedenkbuch. II. d. 151; X. *V.* 168. — — „Geologische Uebersicht der Bergbaue in der österreichischen Monarchie.“ VI. 862; VIII. 364, 846. — — Geschichte. V. Vorwort; X. *V.* 137, 138, 143. — — Glückwunsch-Schreiben zur Decennalfeier. X. *V.* 187. — — Gründung und Organisation. I. 1; V. Vorwort; X. *V.* 143. — — Hauer'sche Petrefacten-Sammlung. II. a. 142. — — Höhenmessungen. III. c. 94, d. 128; X. 29, 555. — — Humboldt's (A. v.) Schreiben. VII. 834. — — Humboldt-Stiftung (Subscription zur). X. *V.* 188. — — Jahrbuch. I. v, VIII; II. a. 145, d. 156, 165; III. d. 128; IX. *V.* 139; X. *V.* 3, 74, 83, 164. — — Karten. VI. 164, 861, 904; VII. 386; VIII. 178, 769; IX. *V.* 60, 61, 62, 74, 79, 109, 143; IX. *V.* 81, 109; X. *V.* 73, 110, 151, 180. — — Laboratorium (chemisches). I. 136, 376; III. a. 156, b. 156, c. 154, d. 166; IV. 147, 397, 630, 868; V. 190, 640, 868; VI. 154, 650, 850; VII. 152, 360, 603, 805; VIII. 151, 361, 612, 757; IX. 172, 294, 503, 695, *V.* 193, 351; X. 137, 351, 466, 572, *V.* 153, Anhang. — — Leistungsberichte und Programme. I. v, 179, 617, 740; II. a. 137, 138, 141, b. 165, 168, 193, d. 154, 163; III. a. 90, d. 56, 128, 134; IV. 436, 649, 882, 892; V. 253, 444, 882, 892; VI. 417, 874; VII. 316; VIII. 184, 205, 387, 766, 770, 775, 784, 800; IX. *V.* 63, 79, 90, 112, 137, 138; X. *V.* 74, 84, 95, 110, 144, 152. — — Museum. I. 153; II. d. 149; VI. 859; IX. *V.* 138, 149, 153; X. *V.* 52, 154. — — Paläontologische Sammlungen. IX. *V.* 138; X. *V.* 161. — — Pariser Ausstellung (Betheilung an der). VI. 192, 904; VII. 182. — — Personal. I. 6; V. Vorwort III; X. *V.* 143, 168. — — Publicationen. I. 373; III. d. 10, 12, 128, 134, 135; IX. *V.* 62, 109, 137, 139; X. *V.* 163, 164, 165. — — Ramsauer'schen Sammlung (Ankauf der). II. b. 149. — — Reisen der Geologen. I. 6, 176, 368, 371, 377, 379, 560, 617, 747, 749; II. b. 168, 172, 193; III. a. 90, d. 56, 128, 129, 134; IV. 882, 883, 892; V. 230, 253, 444, 883, 892; VI. 167, 172, 189, 201, 417, 874, 883, 897, 900, 906; VII. 167, 183, 316, 382, 836, 841, 843; VIII. 184, 205, 770, 775, 784, 800, 809, 812; IX. *V.* 51, 81, 85, 87, 112, 149; X. *V.* 74, 84, 95, 111, 152. — — Sitzungen. I. 169, 194, 364, 560, 740; II. a. 136, b. 158, d. 148; III. a. 169, b. 160, d. 127; IV. 164, 420, 838; V. 196, 430, 874; VI. 164, 409, 857; VII. 161, 362, 814; VIII. 158, 368, 765; IX. *V.* 136; IX. und X. am Schlusse jedes der vier Quartalshefte, dann X. *V.* 163. — — Stellung unter das k. k. Ministerium der Finanzen. IV. 172. — — — unter das k. k. Ministerium des Innern. IV. 181; X. *V.* 146, 154, 171. — — Uebertragung in das Fürst Liechtenstein'sche Palais. I. b. 158, 161, d. 149. — — Verbindungen (wissenschaftliche). I. 170, 377, 378; IX. *V.* 140; X. *V.* 92, 93. — — — — ausser Europa. IX. *V.* 23, 137, 145; X. *V.* 2, 42, 90, 92, 93. — — Verhandlungen. Am Schlusse jeden Heftes der Jahrgänge IX und X. — — Vermächtniss des Herrn FML. Mayer. IX. *V.* 39. — — Versammlung österreichischer Berg- und Hüttenmänner. IX. *V.* 46, 80. — — Werner-Säcularfeier. I. 560; II. d. 1. Gergens (Dr.). Petrefacte des Mainzer Beckens. IV. 416, 646. Germar (Prof.). Trematosaurus Brauni. III. b. 159. Gibbs (Obr.). Magnetismus des Magnet-Eisenerzes. VIII. 679. Giebel (Prof. C. G.). „Gaea excursoria Germaniae.“ II. d. 169. — „Insecten und Spinnen der Vorwelt.“ VII. 821. Giertler (Dr.). Steinkohle von Hrastowetz, Anal. VII. 152. Ginanni-Fantuzzi (Graf). Sendungen aus dem Kirchenstaate. IX. 176, *V.* 54, 105. Girard (H.). Ebene zwischen Elbe und Weichsel. IV. 420. — Kurhessische geologische Landesanstalt. IV. 421. Glocker (Prof. E. F.). Bernstein aus Mähren. V. 198. — Bituminöses Holz aus Mähren. V. 197. — Bradlstein. IV. 69. — Braunkohle von Lettowitz. IV. 62. — Kohle des Quadersandsteines. V. 730, 731. — Notizen (mineralogische und geognostische) aus Mähren. III. c. 130; V. 725, 735; VI. 95. — Ober-Lausitz (preussische). IX. *V.* 106. Glós (A. v.). Aufnahmen in Nordost-Ungarn. IX. *V.* 130, 143; X. 406, 418, 423, *V.* 67. Glückselig (A. M.). Fossile Fische und Pflanzen aus Böhmen. III. d. 126; IV. 427. Gmundner Direction (k. k.). Höhenmessungen im Salzkammergute. V. 198. Goeppert (Prof. R.). Fucoïden (vorweltliche). IX. *V.* 77. — Steinkohlen-Formation (künstliche Darstellung der). VII. 832. — Stigmaria ficoides. VIII. 167. — Versteinerter Wald von Radowenz. VIII. 725. Göttl. Karlsbader Sprudel, Anal. VII. 202, 203. — — Sprudel-Ausbrüche. VII. 203. — — Sinterbilder. IV. 894; VI. 195. Göttmann (B. R.). Süd-Slavonien. IV. 493. — Ungarn

(nordöstliches). X. 414, 418. Götsch (G.). Fender und Schnalser Gletscher. VI. 90. Gould. Invertebraten-Fauna der nordamerikanischen Küsten. IX. 605, 613, 617. Grailich (Prof. J.). Humboldt (A. v.) über dessen Arbeiten. IX. *V.* 19. — Krystallbestimmungen mittelst der Naumann-Miller'schen Projection. VII. 378. — Krystallographie des Glimmers. VI. 410. Granofsky. Schädel von Dinotherium. VII. 612. Graswander (Kasp.). Knochenhöhle bei Fuschl. VIII. 789. — Petrefacte von St. Gilgen. IX. 175. Gratzer geognostischer-montanistischer Verein. I. 170; II. a. 138; IV. 428; V. 228, 428. Grave (Dr. H.). Zahn von Hyracotherium. VIII. 365. Gray (Fr. C.). Herausgeber von Agassiz's „Contributions". IX. *V.* 65. Greg (R. P.). „Manual of the Mineralogy of Great-Britain and Ireland." IX. *V.* 66. Grewinck. Werk über das nördliche Persien. IV. 842. Grey (Sir George). Gouverneur der Cap-Colonie. IX. *V.* 12, 13, 28. Grimm (J.). Eisen-Pisolith. VII. 160, 193, 194, 606. — Gediegen Quecksilber in Siebenbürgen. VI. 813. — Goldführung des Diluviums und Alluviums. V. 230, 231. — „Grundzüge der Geognosie für Bergmänner." VII. 362. — Höhenmessungen im Pilsener Kreise. VII. 163. — Nagyág (geognostisch-bergmännische Verhältnisse von). VIII. 98, 105, 107, 115 Anmerk., 120, 121 Anmerk., 139 Anmerk., 709, 721; IX. 2, 3, 15. — Urkalk (säulenförmig abgesonderter). V. 399. — Vöröspatak. III. c. 54. Groot (Corn. de). Niederländisch-Indien (geologisch-bergmännische Nachrichten über). IX. 277, 282, 287, 290, *V.* 103, 104. — Sendungen aus Borneo und Java. IX. 175. Gümbel (C. W.). Bayerische Alpen zwischen Isar und Salzach. VIII. 146. — Geognostische Aufnahme von Bayern. II. d. 163; IV. 863; V. 888; VIII. 777. — Geognostische Karte des Königreiches Bayern. X. *V.* 190. — Granit des Böhmerwaldes. VI. 15, 21. — Molasse in Bayern. IX. 107 Anmerk. — Quarzlager („Pfahl") des böhmisch-bayerischen Gebirges. VI. 768. — Raibler Schichten im Bayreuth'schen. IX. *V.* 160. — St. Cassian-Schichten (Aequivalente der) im Keuper Franken's. X. 22. — Tirol (Aufnahmen in). VIII. 785, 787, 795. — Vorarlberg und Nordwest-Tirol. VII. 1. — Zugspitz-Berg. VI. 900. Günther (Dr. A.). Pläner und Quader-Petrefacte aus Sachsen und Böhmen. VIII. 618, 810, 811. Guggenberger (J. M.). Höhen- und Tiefendarstellungen (graphische). IX. 234, *V.* 59. — Sparende Gasbrenner. VII. 169. Gurney's Löschmethode bei einem Grubenbrande angewandt. III. d. 143.

Hacquet (B.). Geologie von Ober-Steiermark. V. 322, 329, 349. — Naphtha in West-Galizien. X. *V.* 183. Hähner (W.). Metallgewinnung aus Erzen. VII. 827. Hafner (K.). Seilrollen mit Windflügel-Bremsung. III. d. 133. Hahn. Lignit-Cokes. IV. 646. Haidinger (Karl). Diceras. II. d. 167. — Säcular-Gedächtniss. VII. 833. Haidinger (W.). „Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt." III. d. 10, 134; X. *V.* 164. — Agassiz's „Contributions to the Natural History of the United States of America". IX. *V.* 65. — Album. VIII. VI. — Alth's „Gyps-Formation der Nordkarpathen-Länder". IX. *V.* 14. — Amethystes (optisches Verhalten des). I. 158. — „Asiatic Society of Bengal" (Sendung der). X. *V.* 42. — Augustin's (Freih.) Nekrolog. X. *V.* 41. — Auszeichnung der Herren Cotta, Deshayes, J. Hall, H. v. Meyer, Sir E. W. Logan und Senoner. VII. 197, 363; VIII. 160; IX. *V.* 54. — Auswärtiges Mitglied der „London Royal Society". VII. 829. — Bach (Dank an Freih. v.). X. *V.* 110. — Barrande's Denkschrift in das „Bulletin de la Société géologique de France" aufgenommen. VIII. 372. — Barrande's Schreiben über die Silur-Formation in Central-Böhmen. X. 479. — Baryt (himmelblauer) von Naurod. III. d. 28, 127. — Baryt-Krystalle als Absatz aus Thermalquellen. IV. 864; V. 142. — Bayern (Gümbel's Schreiben über die geognostische Aufnahme von). IV. 863. — Bericht an Freih. v. Bach. IX. *V.* 153. — Beust'sche Gangzonen. VI. 197; IX. *V.* 39. — Binkhorst's „Couches crétacées du Limbourg." X. *V.* 93. — Bollmann's optische Untersuchungen an Belemniten. VII. 830. — Borsäure und borsäurehältige Mineralien (geographische Vertheilung der). VII. 181. — Brauneisenstein mit Kernen von Spatheisenstein. V. 183. — Brücke's Gypsabgüsse von Feldspath-Krystallen. VII. 835. — Buch's (L. v.). Nekrolog. IV. 189, 207. — Buchner's (Dr. O.). „Feuermeteore." X. *V.* 81. — „Chinese Repository." X. *V.* 2. — Correspondent der Pariser Akademie. VI. 904. — Correspondenten der k. k. geol. Reichsanstalt. VII. 161, 198; IX. *V.* 64, 80, 90, 153; X. *V.* 65, 66, 74, 147, 170. — Czjžek's Ehrengedächtniss. VI. 665, 857. — Dana's geologische Mittheilungen aus Nord-Amerika. VII. 199. — — „Geology of the Pacific. IX. *V.* 145. — — „System of Mineralogy." VI. 173. — Dank an die, die k. k. geol. Reichsanstalt fördernden Personen und Behörden. I. 174; VIII. 387, 811; X. *V.* 81, 110, 162, 171. — Dankschreiben an Franz Ritter v. Hauer auf Anlass der Haidinger-Denkmünze. VII. XVIII. — Decennal-Bericht über die k. k. geologische Reichsanstalt. X. *V.* 137. — v. Dechen'sche Karte von Deutschland. VII 824. — — — von Rheinland-Westphalen. VII. 198. — Denkmünze. VII. v; VIII. 783. — Director der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 6. — Druckschriften der k. k. geologischen Reichsanstalt. III. d. 12. — Dufrenoy's Dankschreiben für die geologischen Karten. VI. 904. — Dumont's Nekrolog. VIII. 173. — Dupoisat'schen Stein (Gutachten über den). IX. *V.* 108. — Ehren-Doctor der Universität Jena. IX. *V.* 135. — Ehrenmitglied des „Philos. Institute of Victoria." X. *V.* 90. — Ehrenmitglied des k. Ungarischen naturwissenschaftlichen Vereines. IX. *V.* 91. — Eisenpisolith.

VII. 193, 194. — Eisernen Krone (k. k. Orden der) an Hochstetter und Frauenfeld verliehen. X. *V.* 186. — Eliasit. III. d. 128. — Erdbeben vom 15. Jänner 1858. IX. *V.* 29. — Eröffnungs-Anreden in den Sitzungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. II. d. 148; III. d. 127; IV. 838; V. 874; VI. 857; VII. 814; VIII. 765; IX. *V.* 125. — v. Ettingshausen's „Tertiär-Floren der österreichischen Monarchie". II. d. 150. — — — von Köflach. IX. *V.* 3. — Fremdenbesuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. IV. 845; IX. *V.* 53. — Gedenkbuch der k. k. geologischen Reichanstalt. II. d. 151. — Geoden von Hüttenberg. VI. 646. — Geographische Commission für den österreichischen Kaiserstaat. I. 380; II. b. 161. — Geschenke für das Museum und die Bibliothek der k. k. geologischen Reichsanstalt. IX. *V.* 54, 55, 64, 105, 106, 109, 110, 155; X. *V.* 1, 34, 42, 81, 92, 93, 135, 136, 162, 178, 189. — Geschiebe mit Eindrücken. IV. 670, 679, 680; V. 897. — Gesellschaft der naturforschenden Freunde zu Moskau. VII. 152. — — der Naturwissenschaft zu Cherbourg. VII. 363. — Glückwünschungs-Schreiben an die k. k. geologische Reichsanstalt. X. *V.* 187, 188. — Göppert's künstliches Profil der Steinkohlen-Formation. VII. 832. — — versteinerter Wald von Radowenz. IX. *V.* 1. — Götsch's „Gletscher-Beobachtungen". VI. 190. — Grey's und Lettsom's „Manual of the Mineralogy of Great-Britain and Ireland". IX. A. 66. — Grimm's „Grundzüge der Geognosie für Bergmänner". VII. 362. — — „Nagyág." IX. *V.* 2. — Gymnit von Fleims. I. 607, 747. — Hauer's (Franz Ritter v.) „Beiträge zur Paläontographie von Oesterreich". IX. *V.* 76. — — Bildniss. X. *V.* 34. — Hausmann „Verkohltes Holz von Wieliczka". VI. 869, 870. — Heckel's Nekrolog. VIII. 173. — Heer's „Insecten von Radoboj". VII. 841. — Hirtenfeld's (Dr.) „Mil. Maria-Theresien-Orden". X. *V.* 2. — Hitchcock's „Ichnology of New England". X. *V.* 189. — Hochstetter's (Dr.) Briefe über die Ausrüstung der „Novara". VIII. 368. — — — aus Batavia. IX. *V.* 102, 137. — — — aus Berlin. VIII. 159. — — — aus Ceylon. IX. *V.* 22. — — — vom Cap. IX. *V.* 22, 137. — — — aus London. VIII. 175. — — — aus Singapore. IX. A. 89, 137. — Hörnes' „Fossile Mollusken des Wiener Tertiär-Beckens". II. d. 151; VII. 833. — Hofrath (Ernennung zum k. k.). X. 468, *V.* 94. — Humboldt's (A. v.) „Erinnerungen für die Novara-Expedition". VIII. 868. — — „Kosmos." IX. *V.* 19. — — Schreiben. VII. 834; VIII. 168, 783, 784; X. *V.* 3, 171, 172. — Humboldt-Stiftung (Subscription zur). X. *V.* 188. — Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Programm. I. v; IX. *V.* 62, 79, 81, 109; X. *V.* 3, 74. 93. — — — — Vorwort. I. III; VII. III. — Joachimsthaler montanistischer Verein. VII. 187, 188. — Johann (Besuch Sr. k. Hoheit Erzherzog) in der k. k. k. geologischen Reichsanstalt. IX. *V.* 53. — Jones' (R.) Zeitschrift „the Geologist". IX. *V.* 55. — Kalkspath-Krystalle von Moldowa. IV. 680. — Kind's Erdbohr-Arbeiten. I. 368. — Klinochlor. V. 853. — Kulczycki's „Taïti und Taiarapu". X. *V.* 188. — Kupfer (gediegenes) von Récsk. I. 145, 175. — Lallemant's (Dr.) Schreiben. VIII. 369. — Lamont's (Prof.) „Erdmagnetismus". X. *V.* 34. — Lazulit von Werfen. I. 167. — Leistungs-Berichte und Programme der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 6, 169, 176, 368, 379, 740. — Leopold.-Carolinische Akademie (kaiserliche Subvention für die). IX. *V.* 156. — Linarit und Caledonit von Rézbánya. II. b. 78. — Lindackerit. IV. 555. — v. Littrow „über Pick's barometrische Höhemessungen". VI. 878, 880. — Magnet-Eisenstein pseudomorph nach Glimmer. III. d. 31, 134. — Mailänder geologische Gesellschaft. IX. *V.* 153. — Marcou's (Dr.) „Geology of America". X. *V.* 1, 18. — Mandelstein und Linsen-Eisenstein von Brzezina. VI. 615. — Mineralien aus den krystallinischen Schiefern von Gastein. V. 429. — — (neue). IV. 167. — Murchison's (Sir R. I.) Schreiben. X. *V.* 3. — — „Siluria." X. *V.* 44, 45. — Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 153; X. *V.* 52, 154. — Naturforscher-Versammlung (32.) in Wien. X. *V.* 91, 148. — Naturselbstdruck (Herrn R. v. Auer's Prioritäts-Anspruch auf den). IV. 857. — Naturwissenschaftliche Institute zu Wien. IV. 181. — Naumann's „sächsischer Granulit". VII. 834. — Neubau für die k. k. geologische Reichsanstalt. IX. *V.* 66; X. *V.* 187. — Nieder- und Ober-Oesterreich (geologische Karte von). IV. 845. — Noeggerath's und Bädeker's „Naturwissenschaften". IX. A. 155. — Novara-Expedition. VIII. 368, 369, 765; IX. *V.* 11, 22, 26, 89, 102; X. *V.* 3, 4, 48, 50, 64, 74, 109, 136, 149, 186. — Novara-Museum. VIII. 765; X. *V.* 167. — Nulliporen-Kalk. VII. 582. — Opalgruben von Czerwenitza. VIII. 176. — Pariser Austellung. VII. 376; IX. *V.* 9. — — Preis-Medaille für die k. k. geologische Reichsanstalt. VII. 182. — Parolini's (A.) „Quellen von Oliero." IX. *V.* 66. — Patera's metallurgisch-chemische Leistungen. VI. 871. — Paterait. VII. 196. — Phönicische Alterthümer in den Bergwerken von Wales. I. 368. — Piauzit und Hartit. VII. 92, 94. — Pichler's (V.) „Turrach". IX. *V.* 56. — Pick's „Sicherheit der barometrischen Höhemessungen". VI. 450, 877. — Polarisations-Erscheinungen am vesuvischen Glimmer. VII. 822. — Pollak (O.) „Schürfungen in Nord-Böhmen". IX. *V.* 57. — Porträt. IX. *V.* 11. — Pressburger naturwissenschaftlicher Verein. VII. 183, 187, 364. — Pseudomorphosen von Steatit nach Fassaït. IV. 183. — — nach Steinsalz. IV. 101. — — (neue) aus Tirol. IV. 160. — Publicationen der „Wiener Freunde der Naturwissenschaften". II. d. 170; III. d. 1, 127; X. *V.* 167. — Reden's (Freih.) Nekrolog. VIII. 811. — Reisen der Reichsanstalts-Geologen. I. 6, 176, 308, 379, 560; IX. *V.* 63; X. *V.* 74, 84, 95, 144, 152. — Riesenhirsches (vollständiges Skelet des) in

der k. k. geologischen Reichsanstalt. IV. 861. Haidinger (W.). Ritter der Friedens-Classe des k. preussischen Ordens „pour le mérite“. VIII. 159, 160, 770. — Rivot's und Duchanoy's „Notizen über den Nagybányaër Bergbau“ (Vorwort zu). IV. 568. — Rösler's Nekrolog. VIII. 158. — „Royal Institution of Great-Britain.“ X. *V.* 92. — Ruinen-Marmor in Nieder-Oesterreich. I. 47. — Schall-Phänomen am Monte Tomatico. IV. 559. — Scherzer's (Dr.) Schreiben aus Ceylon. IX. *V.* 26. — Schichtung des Alpenkalkes. I. 35. — Schübler's „Versuche in Bohrlöchern“. VII. 830. — Schwefel von Kalinka. I. 157. — Schwefelblei (überschwefeltes). V. 888, 889; VI. 1, 5, 876. — Serpentin (polar-magnetischer). VIII. 806. — Sitzungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 169; III. d. 127; X. *V.* 163. — Strontianit von Radoboj. I. 606, 747. — Suess' (Prof.) Schreiben über die Silur-Formation in Central-Böhmen. X. 481. — Tchihatchefs (P. v.) „Arbeiten über Klein-Asien“. V. 233; IX. *V.* 89, 123. — Tunner's „Bericht über die Pariser Ausstellung“. VII. 198, 364, 376. — „Uebersichts-Karte von Deutschland“. II. b. 89, 185. — Uebersichts-Reise im Sommer 1851. I. 560. — Verbindungen (wissenschaftliche) der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 170, 377, 378; IX. *V.* 23, 137, 140, 145; X. *V.* 90, 92, 93, 170. — Verkieselung von Baumstämmen. VIII. 735, 736. — Versammlung der österreichischen Berg- und Hüttenmänner. VIII. 803; IX. *V.* 46, 80; X. *V.* 150. — „Victoria Philosophical Institute.“ X. *V.* 90. — Visiani's (R. de) „Piante fossili della Dalmazia“. X. *V.* 109. — Vogl's „Gänge von Joachimsthal“. VIII. 369. — Voglit. V. 223. — Wagner's wissenschaftliche Stiftung zu Philadelphia. VII. 199, 200. — Werner-Säcularfeier. I. 560; II. d. 1. — Wiener k. k. geographische Gesellschaft. X. *V.* 149, 167. — v. Wurzbach's „Uebersicht der Literatur des österreichischen Kaiserstaates“. VII. 183. — v. Zepharovich's Berufung zur Professur nach Krakau. VIII. 183. — — „Braunkohlen und Bergtheer in Croatien.“ VIII. 161. — — Schreiben aus Schloss Schaumburg. VIII. 607. — Zigno's (A. Freih. de) „Flora fossilis formationis oolithicae“. X. *V.* 1. — v. Zollikofer's „Geologie der Lombardie“. VII. 830. Haidinger-Medaille (Schlussbericht des Subscriptions-Ausschusses für die). VII. v. Hall (k. k. Berg- und Salinen-Direction). Petrefacten-Einsendung. I. 165. Hall (James). „Palaeontology of New-York.“ IV. 843. Halter. Warasdin-Teplitzer Schwefelquelle, Anal. III. d. 16. Hammer (Matth.). Entdecker der Steierdorfer Steinkohlen. II. b. 168. Hancock. Trilobiten-Fährten. X. *V.* 35, 36. Handelsministerium (k. k.). Industrial-Privilegien. I. 382, 565, 751; II. a. 166, b. 195, c. 169, d. 174; III. a. 209, b. 184, c. 166, d. 173; IV. 198, 439, 651, 869; V. 237, 648, 905; VI. 208, 421, 658, 914; VII. 209, 392, 616, 856; VIII. 193, 393, 637, 820; IX. 178, 300, 512, 704; X. 145. 359, 471, 579. — Mittheilungen an die k. k. geologische Reichsanstalt. IX. *V.* 123. Hantken (M. v.). Ammoniten von Swinitza. VII. 607. — Braunkohlen-Schichten um Gran. IV. 403. — Tertiäres von Tinnye. X. 567. Haring (Fr.). Kupferbau in Krain. III. b. 161. Harley (J.). Cephalaspis (neue). X. *V.* 35. Hartnigg (P.). Petrefacte der venetianischen Alpen. VIII. 157; IX. *V.* 89, 121. Haszlinszky (Prof. Fr.). Gebirgsarten von Eperies. II. b. 145, d. 135; III. a. 169. — Schwinka-Thal. III. b. 87. Hauch (A.). Mineralquellen von Szliács. VI. 314; X. *V.* Anh. 73. — Silber-Extraction mit unter-schwefelig-saurem Natron. V. 544. — Steinsalzlager von Bochnia. II. c. 30. — Zinnober von Schemnitz. V. 223. Hauer (Vicepräs. Ritter v.). Foraminiferen-Lager. II. d. 107. — Petrefacten-Sammlung. II. a. 142. Hauer (Franz Ritter v.). Aichhorn's „Mineralien-Sammlung des Gratzer Joanneums“. VII. 185. — Alpen-Durchschnitt von der Donau bis zum adriatischen Meer. VI. 741, 881. — Alth's (Dr. v.) „Geologie der Bukowina“. II. a. 139. — Ammoniten (jurassische) der Süd-Alpen. IX. *V.* 47. — Ammoniten (unsymmetrische) der Hierlatz-Schichten. V. 881, 882. — Andrae's „Geologie von Gratz und Hartberg. V. 437. — Anrede bei Ueberreichung der Haidinger-Medaille. VIII. XVI. — Arbeiten der Geologen der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 174, 646, 740, 746; II. a. 137, 142, b. 168, 193; III. d. 56, 128; IV. 436; V. 445; VI. 741. — Asphaltstein von Mossor. I. 749. — Barrande's „Fossilien von Rokitzan“. VII. 162. — — „Graptolithen aus Böhmen“. I. 746; III. a. 195. — — „Système Silurien du centre de la Bohême“. IV. 430. — „Beiträge zur Paläontographie von Oesterreich“. IX. *V.* 75, 76, 137; X. *V.* 46. — Bildniss. X. *V.* 34. — Boucher de Perthes' „Antiquités Celtiques et diluviennes“. VI. 200. — Buch-Denkmal. VIII. 179, 183. — Bücher, an die k. k. geologische Reichsanstalt gesendet. II. d. 163. — Callot's (Freih.) „Dachschiefer-Production“. II. a. 144. — Canaval's „Bleilager und Muschelmarmor von Kärnthen“. V. 212, 213. — Cephalopoden (neue Hallstätter). V. 204. — — des rothen Lias der Karpathen. VI. 183. — — von Tratzberg. VII. 729. — Cetaceum von Linz. V. 879. — Clymenia laevigata. VII. 241. — Crivelli's „Geologische Lehrbücher“. VI. 170. — Curioni's „Lombardische Trias“. VI. 887. — — „Notizen (geologische)“. IX. *V.* 34. — Dalmatinische Gebirgsarten und Petrefacte. III. a. 192. — Delesse's „Baumaterialien auf der Pariser Ausstellung“. VIII. 162. — „Dublin Natural History Review.“ VII. 852. — Dürre- und Klaus-Alpen, Petrefacte. III. a. 184. — Dumont's „Geologische Karte von Belgien“. IV. 173. — — Geologische Karte von Europa. VIII. 804. — Ehrlich's Publicationen über die Geologie von Ober-Oesterreich und Salzburg. II. b. 165; III. a. 191; VII. 160. — Eichwald's (Prof. v.) Gesammtwerke. VII. 853. — Einsendungen an

das Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 154; II. b. 144; III. a. 166; IV. 167, 177. Hauer (Franz Ritter v.). Elephanten-Schädel aus Galizien. II. d. 158. — Emmrich's (Dr.) „Rauschenberg". VI. 896. — — „Schichtenfolge des bayerischen Vorgebirges". II. d. 161. — — Südbayerische Molasse." VI. 417. — Eocenes im Erzherzogthum Oesterreich. V. 879, 897; IX. 103. — Erratische Blöcke in Oesterreich. IX. 109. — Erster Geologe der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 6. — Erze und Bergbau in Serbien. II. a. 150, b. 174, 175. — und Foetterle. „Geologische Uebersicht der Bergbaue der österreichischen Monarchie." VII. 364. — Foith's „Bildungsweise und Metamorphose des Steinsalzes". III. d. 130. — Freyer's „Geologische Karte des östlichen Krains". II. b. 189. — Fuchs' „Torfmoore". III. a. 195. — Geognostische Aufnahmen in Bayern. I. 747; II. d. 163. — Geographische Commission. II. b. 161. — Gold-Bergbau in Vöröspatak, II. d. 64, 164. — Goldgebiete in Australien. III. a. 148. — Gosau-Cephalopoden. IX. *V.* 75. — Gratzer geognostisch-montanistischer Verein. II. a. 138; IV. 428; V. 228. — Gümbel's „Geognostische Karte von Bayern". X. *V.* 190. — — „Zugspitz." VI. 900. — Heer's (Prof. O.) Schreiben. III. a. 186. — — „Tertiäre Flora der Schweiz." V. 232. — Helmreichen (Virgil von). III. a. 207. — Hingenau (Freih.). Braunkohlen-Lager des Hausruck-Waldes. VII. 174. — Höhle bei Brunn im Steinfeld. VI. 872. — — bei Einöd. III. d. 139. — Höhenmessungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. X. 29. — Höhlenbär von Slaup. I. 746; II. a. 136. — Hohenegger's „Adnether Schichten der Karpathen". VIII. 180. — — „Nord-Karpathen von Schlesien." III. d. 128. — Jan's „Museo civico di Milano". VIII. 172. — Juhosz's „Gold- und Silbergewinnung in Californien". II. b. 172. — Karpathen-Sandstein in Nordost-Ungarn. X. *V.* 67. — v. Klipstein's „Geognosie des Grossherzogthums Hessen". III. a. 187, d. 131. — — „Marienbad." II. b. 164. — Körös-Thal. II. d. 142; III. a. 15. — de Koninck's „Faunen der Kohlen-Formation". VII. 184. — Kopetzky (Dr.). „Kohle und Eisenstein von Görz". II. a. 140. — Kořistka's (Prof.) Hypsometrische Arbeiten. II. b. 187, d. 156; III. d. 128. — Kotz (Freiin). Handzeichnungen. VIII. 173. — v. Kraynag's „Anthracit von Pennsylvanien". III. a. 179. — Kreil's (Dir.) Bereisung des österreichischen Kaiserstaates. III. d. 128. — La Marmora „Voyage en Sardaigne". IX. *V.* 4. — Lias in Nordost-Ungarn. X. *V.* 21. — Lias-Cephalopoden der Nordwest-Alpen. VII. 826. — Linarit von Rézbánya. II. b. 167. — Lombardie. VII. 842; VIII. 183; IX. 445. — — (Abb. Stoppani's Kritik seiner Karte der). X. *V.* 191. — Londoner geologische Gesellschaft (Sitzungsberichte der). X. *V.* 35. — Luhatschowitz. IV. 193. — Malaguti's und Durocher's „Vorkommen und Gewinnung des Silbers". I. 749. — Markus' Abdrücke angeschliffener Silberstufen. VI. 168. — Massalongo's „Bärenreste von Verona". II. a. 137. — Meneghini's „Petrefacte von Toscana". V. 228. — Meyer's (H. v.) „Anthracotherium Dalmatinum". IV. 165. — — „Zur Fauna der Vorwelt." VII. 852; X. *V.* 54. — Mineralien für die k. k. geologische Reichsanstalt (Geschenk von). I. 164. — Muschelkalk-Petrefacte der Süd-Alpen. VIII. 166. — Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt. II. b. 158, d. 149. — Nautilus (neuer). VII. 733. — Nord-Abhang der Alpen von Wien bis Salzburg. I. 17, 175. — Patera's Versuche über Verdichtung der metallischen Röstungs-Producte. V. 430, 431. — Petrefacte (Banater). VII. 844. — — (Kössener) von Enzesfeld. VI. 176. — — der nordöstl. Kalkalpen von Tirol. VIII. 851. — — von Reps. X. *V.* 191. — — von Sternberg (Mecklenburg). VIII. 839. — — der Süd-Alpen. V. 216. — — von Weimar. IX. *V.* 17. — — (tertiäre) aus Unter-Steiermark. VIII. 448, 450. — Publicationen der k. k. geologischen Reichsanstalt. II. a. 145, d. 150; III. d. 128. — — der „Versammlung von Freunden der Naturwissenschaften". II. d. 170. — Quarz-Krystalle aus dem Bitizer Walde. II. d. 170. — Quecksilber von Gagliano. VI. 810. — Raibler Petrefacte von Gümbel bei Bayreuth entdeckt. IX. *V.* 160. — Reisen. I. 176, 377, 646; III. d. 56; VII. 382, 843; IX. *V.* 83, 97, 115, 143; X. 399, *V.* 87, 105, 107, 130, 132. — Reuss' (Prof.) „Entomostraceen, Foraminiferen und Polyparien der Gosau". II. a. 160, d. 150, 169. — Reutte. IX. *V.* 16. — Roman-banater Militärgrenze. VII. 382. — Säugethiere (fossile) von Schemnitz. II. b. 160. — Saroser Comitat. IX. *V.* 96, 97. — Schafhäutl's (Prof.) „Geologische Karte der südbayerischen und Tiroler Alpen". II. a. 138. — Schlagintweit's (A. und G.) „Physische Geographie und Geologie der Alpen". V. 888. — Schlangeneier von Offenbach. IX. *V.* 34. — Schmidt's (Jul.) „Erloschene Vulcane in Mähren". IX. *V.* 34. — Siebenbürgen. X. *V.* 87, 105, 107, 130, 132, 180. — Slauper Höhle. II. a. 146. — Steinkohlen (Untersuchung der österreichischen). I. 610. — Stockheim's (Freih.) „Geologische Karte und Petrefacte von Passau. II. b. 189. — Stoppani's „Studii geologici". IX. *V.* 31. — — Kritik der Karte der Lombardie. X. *V.* 191. — Taylor's „Statistics of Coal". III. a. 104. — Tirol (geologische Aufnahmen in). VIII. 785, 787, 795, 801. — — (reducirte Karte von). VI. 185; IX. *V.* 74. — Trachyte des westlichen Mährens. IX. 58, 77. — Trias, Lias und Jura der Alpen. IV. 715. — Turiner Akademie „Denkschriften". III. d. 130. — Ungarn (nördliches und nordöstliches). IX. *V.* 83, 96, 125, 130, 143; X. 399, *V.* 21. — Verrucano der lombardischen Alpen. VIII. 183. — Vukotinovic's (F. v.) „Moslaviner Gebirg". III. a. 171. — Vulcan (erloschener von Banow. IX. 2. — Wetherill's „Reise nach dem Lake Superior. VIII. 180. — Zeller. „Mineralquelle in Windisch-Garsten. I. 745. — Zeuschner's „Salz-

Ablagerungen in den Alpen und Karpathen". I. 367. — Zigno's (Freiherrn A. de) „Geschichtete Gebilde der venetianischen Alpen". I. 367. — — Schreiben. VI. 200. Hauer (Karl Ritter v.). Ackererden, Anal. III. a. 160, 161, d. 81, 117, 118; X. V. Anh. 45, 46, 47, 48. Allomorphit, Anal. IV. 152; X. V. Anh. 2. — Alstonit, Anal. IV. 832; X. V. Anh. 2. — Anauxit, Anal. V. 83; X. V. Anh. 2. — Ankerit, Anal. IV. 827; X. V. Anh. 22. — Andalusit, Anal. VI. 158; X. V. Anh. 3. — Aphrosiderit, Anal. V. 81, 337; X. V. Anh. 3. — Arsenikkies, Anal. IV. 400, 828; X. V. Anh. 15. — Asphalt, Proben. IX. 507; X. V. Anh. 32, 42. — Augit, Anal. V. 86, 154; X. V. Anh. 3, 9. — Baltimorit, Anal. IV. 154; X. V. Anh. 3. — Baryt der Karlsbader Thermen, Anal. V. 142; X. V. Anh. 3. — Bergholz, Anal. IV. 630; X. V. Anh. 4. — Berthierit, Anal. IV. 635; X. V. Anh. 4. — Bindemittel der Wiener Sandsteine. VI. 42. — Biotit, Anal. X. V. Anh. 4. — Bleierze, Probe. VII. 605; IX. 295; X. V. Anh. 15, 16. — Blödit, Anal. VII. 506; X. V. Anh. 5. — Boltonit, Anal. X. V. Anh. 5. — Bolus, Anal. IV. 634; X. V. Anh. 5. — Bouteillenstein, Anal. V. 868; X. V. Anh. 5. — Braunkohlen, Proben. III. a. 163, 164, b. 156; IV. 147, 150, 151; VII. 739, 740; X. V. Anh. 50—66. — Cemente. II. 155; VII. 371; X. V. Anh. 42, 43. — Chalilit, Anal. IV. 150; X. V. Anh. 5. — Chlorit, Anal. IV. 636; X. V. Anh. 5. — Cölestin, Anal. IV. 397; X. V. Anh. 6. — Covellin, Anal. X. V. Anh. 6. — Delanovit, Anal. IV. 633; X. V. Anh. 6. — Delvauxit, Anal. X. V. Anh. 6. — Diallag, Anal. VI. 784 Anmerk.; X. V. Anh. 6. — Dumas' „Numerische Relationen der Fundamentalzahlen der elementaren Stoffe". IX. V. 7. — Enstatit, Anal. X. V. Anh. 7. — Episomorphismus der Krystalle. X. V. 184. — Essigsaure Magnesia (krystal.). VI. 136. — Essigsaure Salze des Kadmiums, Mangans und Nickels. VI. 189. — Eisenerze, Proben. X. V. Anh. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. — Fahlerze (quecksilberhältige), Anal. III. d. 98. — Felsőbanyit, Anal. X. V. Anh. 7. — Fluolith, Anal. X. V. Anh. 7. — Funkit, Anal. X. V. Anh. 7, 8. — Galaktit, Anal. X. V. Anh. 8. — Giesekit. Anal. X. V. Anh. 8. — Glauberit. Anal. X. V. Anh. 8. — Grossular, Anal. X. V. Anh. 8. — Grünerde, Anal. VII. 845; X. V. Anh. 8. — Gymnit, Anal. X. V. Anh. 8, 9. — Gyps von Längenfeld. VII. 181, 652; X. V. Anh. 33. — Harringtonit, Anal. X. V. Anh. 9. — Heteromerit, Anal. IV. 155; X. V. Anh. 9. — Hornig's Zeitschrift „Die Realschule". VIII. 372. — Hydrargyllit, Anal. IV. 397; X. V. Anh. 9. — Iserin, Anal. VII. 154; X. V. Anh. 10. — Kakoxen, Anal. X. V. Anh. 10. — Kalkbrüche am Hundskogel. VI. 201. — Kalkmergel, Anal. V. 193; X. V. Anh. 35. — Kalkmilch, Anal. III. c. 144, 145. — Kalksteine und Dolomit, Anal. III. a. 163; IV. 830, 831; VI. 201; X. V. Anh. 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43. — Karpholith, Anal. X. V. Anh. 10. — Kenngottit, Anal. X. V. Anh. 10. — Kerl's „Probirkunst". VIII. 372. — Kohlen-Eisenstein, Anal. IV. 398. — Kohlensaures Lithion, Darstellung im Grossen. VI. 882. — Kupfererze, Probe. X. V. Anh. 27. — Kyanit-Pseudomorphosen, Anal. I. 350, 358; X. V. Anh. 10, 11. — Laboratorium der k. k. geol. Reichsanstalt. VI. 154, 650, 850; VII. 152, 360, 603, 805; VIII. 151, 361, 612, 757; IX. 172, 293, 503, 695, V. 139; X. 137, 351, 466, 572. — Laubstreu, Anal. V. 870; X. V. Anh. 48. — Lava vom Aetna, Anal. X. V. Anh. 11. — Lenzin, Anal. IV. 826. — Liebenerit, Anal. IV. 147; X. V. Anh. 11. — Lignit, Anal. VII. 743. — Löslichkeit der Salze in höherer Temperatur. VII. 186. — Löss, Anal. III. d. 118. — Löweït, Anal. VII. 605; X. V. Anh. 11. — Magnesia (Trennung der) von fixen Alkalien. IV. 863. — Magnesit, Anal. III. a. 160; IV. 830; V. 871; VI. 68; X. V. Anh. 11. — Magnesit-Spath, Anal. III. c. 154. — Mangan-Erze, Probe. X. V. Anh. 27. — Markus'sche Gas-Regulirung. VI. 64, 411. — Meerschaum, Anal. VII. 158; X. V. Anh. 11. — Menilit, Anal. IV. 828; X. V. Anh. 11. — Mergel, Anal. III. b. 156; IV. 830; X. V. Anh. 37, 42. — Metallisches Eisen (Wirkung des mit Kohlensäure geschwängerten Wassers auf). X. V. 80. — Milch-Opal, Anal. IV. 397; X. V. Anh. 12. — Mineralien (Zusammensetzung und Wassergehalt der). V. 67. — Mineralquellen von Bartfeld. IX. V. 144. — — von Krapina-Teplitz. VIII. 805; IX. 229, 276; X. V. Anh. 70. 71. — — von Mauer bei Wien. X. V. Anh. 72. — — von Monfalcone. IX. 497. V. 99, 121. — — im nördlichen Ungarn. IX. V. 132, 139. — — von Roggendorf. IV. 154; X. V. Anh. 73. — — von Rohitsch. X. V. Anh. 72. — — von San Stefano. IX. 689, V, 100, 121, 139; X. V. Anh. 71. — — von Stubitza. VII. 838; X. V. Anh. 70. — — von Warasdin-Teplitz. IX. 165, V. 68, 139; X. 1. — Nickel (Patera'sches), Anal. VI. 851, 875; X. V. Anh. 31. — Nickelspeise, Anal. IV. 400; X. V. Anh. 31. — Nordenskjoldit, Anal. X. V. Anh. 12. — Obsidian, Anal. V. 868, 869; X. V. Anh. 5. — Okenit, Anal. V. 190, 191; X. V. Anh. 12. — Oligoklas, Anal. IV. 830; X. V. Anh. 12. — Organische Reste (kieselige) aus dem rothen Thone der Alpen. V. 439. — Partschin, Anal. X. V. Anh. 12. — Paterait, Anal. VII. 195, 196. — Pikrolith, Anal. VI. 100; X. V. Anh. 12. — Plumbocalcit, Anal. X. V. Anh. 12. — Polyhalit, Anh. IV. 632; X. V. Anh. 12, 13. — Porzellanerde, Anal. VII. 162; X. V. Anh. 44, 45. — Pseudophit, Anal. X. V. Anh. 13, 14. — Rossitzer Steinkohle. VI. 138. — Schiefer (grüne), Anal. V. 869; X. V. Anh. 35. — — (krystallinische), Anal. V. 871, 872. — — (rothe), Anal. V. 361; X. V. Anh. 40. — Schlacken, Anal. VI. 854; X. V. Anh. 29. — Schleif-Sandstein, Anal. VIII. 790. — Schwarzkohle, Proben. III. c. 155; IV. 154, 401; X. V. Anh. 50—66. — Schwefel-Arsen in Braunkohle. IV. 109; X. V. Anh. 14. — Schwefel-Blei (überschwefeltes). Anal. V. 889; VI. 3, 7; X. V.

Anh. 5. Hauer (Karl Ritter v.). Severit, Anal. IV. 826; X. V. Anh. 14. — Steinkohle, Proben. III. a. 162; V. 869, 870; VI. 138; X. V. Anh. 50—66. — Steinmark, Anal. VIII. 362; X. V. Anh. 14. — Strakonitzit, Anal. IV. 635, 639; X. V. Anh. 14. — Talkschiefer, Anal. V. 642; X. V. Anh. 35. — Tellur (Aequivalentzahl). VIII. 372. — Thon (feuerfester), Anal. III. a. 27, 160; X. V. Anh. 44, 45. — Thonerde-Präparate. VII. 166. — Unghvarit, Anal. X. V. Anh. 14. — Torf, Proben. III. c. 154; VII. 156; IX. 298; X. V. Anh. 68. — Uranoxyd-Oxyduls (Darstellung des). IV. 557. — Uran-Pecherz. IV. 105; X. V. Anh. 28. — Verzinnungs-Legirung, Anal. II. 158; X. V. Anh. 31. — Walderde, Anal. III. a. 160; X. V. Anh. 41. — Wiener Sandstein, Anal. III. d. 118; V. 880; VI. 43; IX. 105; X. V. Anh. 36, 37, 138. — Zinkerze und Schliche, Probe. X. V. Anh. 28, 29, 31. Hausmann (Prof.). Magnetische Gesteine im Harzgebirge. VIII. 656, 657, 797, 798. — „Molecular-Bewegung in starren leblosen Körpern." VII. 825. — Verkohltes Holz im Steinsalz von Wieliczka. VI. 869, 870. Hawel (F.). Analcim von Moldowa. IV. 837. — Anatas von Schemnitz. I. 155. — Banater Mineralien. VI. 163. — Fossile Flora von Libowitz. X. V. 69. — Kalkspath von Moldowa. IV. 681. — Kohlenbecken von Busstěhrad und Wottwowitz. IX. V. 88, 123, 145; X. 141, 353, V. 14, 192. — Schwefelkies-Drusen aus Kohlenflötzen. VIII. 815; IX. V. 64. Hawliczek (Obristlieutn. v.). Trigonometrische Höhenmessungen in k. k. Schlesien. I. 77. Heckel (J.). Caranx carangopsis. III. b. 160. — Carcharodon aus Steiermark. II. a. 149. — Fische (fossile) der Eocen-Schichten. IX. 104, 120, 128, 129. — — — der Gosau-Schichten. II. d. 143, 166. — — — von Monte Bolca. I. 747. — — — aus Schottland. II. a. 143. — — — von Seefeld. I. 749; VIII. 178. — — — aus Tirol und dem Venetianischen. I. 696. — — (akademische Abhandlungen über). VII. 827. — — (lebende) aus dem Dillner Erbstollen. II. b. 185. — Ganoïd (fossiler) von Inzersdorf. II. a. 157. — Labroïd aus dem Tegel. III. a. 176, 177. — Leuciscus Coleï. III. d. 126. — Nekrolog. VIII. 173. — Reisen für die k. k. geologische Reichsanstalt. I. 696. — Scombroïd aus dem Tegel. III. b. 160. — Wirbel (fossile) von Delphinen. III. b. 161. Heer (Prof. O.). Insecten (fossile) aus dem Gyps von Aix. III. a. 186. — — — von Radoboj. II. a. 142; IV. 684; VII. 831. — Schnecken (diluviale) von Madeira. III. a. 187. — Tertiäre Flora der Schweiz. V. 232; IX. V. 134. — Typus der Flora der Atlantischen Inseln. IX. 588. Heinrich (Alb.). Basalt bei Friedland. V. 390. — Bildniss. IX. V. 10. — Gesenk (mährisches) der Sudeten. V. 390. — Höhenmessungen in k. k. Schlesien. I. 314. Heinrich (A.). Gewinnung von Metallen aus Erzen. VII. 827. Heldreich (Th. v.). Subfossile Reste von Kalamaki. VII. 173. Hell (Dr. A.). Kressenberg. II. a. 12. Hellvig (Ferdinand). Eisenbahn-Schienen. III. d. 132. — Stopfbüchsen-Liederung mit autoclavem Lederring. III. d. 132. Helmersen (GM. G. v.). Fortschritte der Geologie und Geodäsie in Russland. I. 307; VII. 822. — Hebung der Küsten des Baltischen Meeres. VII. 821. Helmreichen (S. v.). Datolithe aus Modena und Toscana. IV. 180. — Eocenes und Grestener Schichten bei Idria. IX. V. 18. — Nummuliten-Kalk von Idria. VIII. 236, 271. Helmreichen (Virgil v.). Nekrolog. III. a. 207, b. 163. Henry (Alex.). Kupfer-Bergbau am Lake Superior. VII. 785. Hering (K.). Brandauer Steinkohlen-Becken. VIII. 601. Hermann (W.). Stein- und Braunkohlen-Karte Deutschlands. VIII. 168, 169. Herter (J.). Rochlitzer Erzvorkommen. X. 10. Hervey. Tange des Golfstromes. IX. 587 Anmerk. Hess (FZM. Freih. v.). Vorsitzender der k. k. geographischen Commission. I. 380. Heufler (L. R. v.). Lava und Schwefel vom Aetna. IV. 158, 159, 177. Heyden (A. v.). Carpano. IV. 423, 546. Heyrowsky (C.). Bergmännische Bereisung Serbiens. II. b. 61. Hillebrand. Asphaltsteine aus Dalmatien. I. 749. — Widmanstätten'sche Figuren an gediegenem Kupfer. I. 152. Hingenau (Freih. Otto). „Bergrechtskunde (Handbuch der)". III. a. 170; VI. 164. — Braunkohlen-Lager des Hausruck-Waldes. VII. 164, 174. — Grimm's „Ueber Goldführung des Alluviums und Diluviums". V. 231. — Luhatschowitz. VII. 377. — Mähren und Schlesien (Aufnahmen in). III. a. 175. — — — (geologische Karte von). III. a. 206. — — — (Werner-Verein für). II. a. 158, d. 33, 151; III. b. 167; IV. 424; V. 217; VI. 184; VII. 200. — Nagyág (Geognosie und Bergbau von). VIII. 82, 183, 709, 712, 715, 717, 721; IX. V. 15. — Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. IV. 171. — „Schlesische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen." X. V. 6. — Steinbruch-Karte von Mähren. IV. 431. — Tasche's „Magnetismus einfacher Gesteine und Felsarten". VIII. 807. — Ungarn (geologische Untersuchungen in). IX. V. 96, 115, 130, 156. — Versammlung österreichischer Berg- und Hüttenmänner. VIII. 803, 804; IX. V. 46, 80. — Vogl's „Secundäre Gebilde in den Joachimsthaler Euganaen". V. 837. — Werner-Säcularfeier. II. d. 30. Hirtenfeld (Dr.). „Militär. Maria Theresien-Orden." X. V. 2. Hitchcock (E.). „Ichnologie of New-England." X. V. 189. Hlasiwetz (Prof. H.). Erdharz im Gosau-Thone. VII. 736 Anmerk. Hochstetter (Dr. Ferd.). Aragonit und Silberanbrüche von Joachimsthal. VII. 160. — Basalt von Duppau. VII. 194, 195. — Beust'sche Gangsysteme. VII. 179, 180. — Böhmen (geologische Aufnahmen in). V. 263, 264; VII. 316. — Böhmerwaldes (geologische Aufnahme des). IV. 858; V. 1, 567, 892; VI. 10, 749, 874. — — (alte Goldwäschen des). V. 210, 567. — — (Höhenverhältnisse des). VIII. 135, 368. — — (Literatur des). VII. 150. — — (Urwälder

und Torfmoore des). VI. 170. Hochstetter (Dr. Ferd.). Böhmerwaldes (Vegetationsverhältnisse des). VII. 149. — Braunkohlen-Becken (Falkenau-Elbogener). VII. 185. — Dachsteinschiefer im Egerer Kreis. VII. 466. — Edelény. VI. 407; VII. 692. — Eisenglanz (künstlicher). V. 894. — Granulit. VII. 766, 834. — Grünsteine von Teschen. IV. 173, 311. — Humboldt (Nachrichten über A. v.). VIII. 160. — Jura-Petrefacte um Brünn. V. 696. — Karlsbad. VI. 906, 907; VII. 202, 203, 825. — Karlsbader Sinterbilder. V. 894; VI. 195. — Kreide und Baculiten der Karpathen bei Friedek. III. c. 142, d. 33. — Mähren (nordwestliches). VIII. 184; IX. 18, 39, 48. — Marienbad. VII. 382. — Niederländisch-Indischer Bergbau. IX. 277, *V.* 122, 139. — Novara-Expedition. VIII. 368, 372, 799. — Pyropführende Ablagerungen des böhmischen Mittelgebirges. VII. 844. — Ritter des österr. kais. Ordens der Eisernen Krone. X. *V.* 186. — Ronsperg. VI. 177. — Schreiben aus Batavia. IX. *V.* 102, 137; X. *V.* 92, 93. — — vom Cap. IX. *V.* 22, 137. — — aus London. VIII. 175, 186. — — von Point de Galle. IX. *V.* 22. — — aus Neuseeland. X. *V.* 50, 64, 74, 178. — — von Singapore. IX. *V.* 89, 137. — — aus Triest. VIII. 368, 372. — Dr. Stolz's Nachlass an Manuscripten und Sammlungen. VII. 842. Höniger (J.). Bergbau auf Gold zu Obergrund. II. c. 91. Hörnes (Dr. M.). Braunkohlen-Petrefacte von Gran. IV. 403. — Eocen-Schnecken von Liescha. VIII. 451. — Faluns des südwestlichen Frankreichs. I. 587. — Fellöcker's „Anfangsgründe der Mineralogie." II. d. 158. — Gasteropoden der Hirlatz-Schichten. IV. 757. — v. Hauer'sche Petrefacten-Sammlung. II. a. 142. — Kreide-Petrefacte aus dem Nordost-Böhmen. VI. 187. — Mastodon. II. b. 187. — Petrefacte von Nemesey. IV. 192. — — von Ofen. VIII. 320. — — (tertiäre Meeres-) aus Steiermark. VII. 571, 577, 578. — Reisen für die k. k. geologische Reichsanstalt. I. 662. — Rhinoceros tichorhinus. II. d. 154, *V.* 527. — Sandberger's (Fr.) „Mainzer Becken". VIII. 370. — Seethiere (subfossile) von Kalamaki. VII. 173. — Tegel (brackischer) von Al-Csut. VIII. 320. — Tertiäre Becken von Ungarn und Siebenbürgen. V. 886, 887. — Tertiäre Bivalven des Wiener Beckens. IX. *V.* 139; X. *V.* 174. — Tertiär-Fauna (Charakteristik der Wiener). X *V.* 175. — Tertiär-Mollusken von Imola. IV. 181, 182. — — des Lavant-Thales. V. 890. — — von Ottnang nnd Wolfsegg. IV. 190. — — von Porstendorf. IV. 188; V. 747. — — von Raussnitz. V. 209. — — des Wiener Beckens (Werk über die). I. 373; II. a. 150, d. 151; III. a. 203, b. 166, d. 135; IV. 165, 851; VI. 178, 864; VII. 188, 834; VIII. 373; IX. *V.* 139; X. *V.* 174. — Tertiär-Muscheln von Malomeřitz. III. d. 77. — Tertiär-Petrefacte von Belgrad. V. 891. — — von Esino. IX. 141. — — von Feldsperg. IX. *V.* 67. — — von Girgenti. V. 218. — — aus Russisch-Polen. IV. 857. — — von Steinabrunn. IX. *V.* 67. — — des Wiener Beckens. I. 559, 662; VII. 188, 353. — — — — (Sammlung der). III. d. 221; VII. 553, 365. — Tertiär-Univalven des Wiener Beckens. II. d. 93, 163, 165; III. a. 177, 178, 203, b. 166, d. 135—139. — Ungarischer geologischer Verein. I. 378, Hof-Mineralien-Cabinet (k. k.). Bibliotheks-Katalog. II. a. 157, d. 150. Hofer (Ign.). Mineralien aus Süd-Tirol. III. d. 158. Hoffmann (A.). Kohlenlager von Padochau. V. 226. Hoffmann (Fr.). Kupfer von Swinitza. IX. *V.* 46. Hoffmann (R.). Pflanzen (fossile) von Ruszkberg. VIII. 157, 618. — Ueberschwefeltes Schwefelblei. V. 888; VI. 1. Hohenegger (L.). Adnether Schichten in den Karpathen. VIII. 143, 180. — Basalte und Diorite aus Mähren. I, 554. — Eisen in gestrickten Gestalten aus einem Hochofen. I. 151. — Eisen-Pisolith. VII. 194. — Eisenstein-Gebietes (geognostische Karte des schlesisch-galizischen). II. b. 158. — Grünsteine des neocomen Kalkes von Teschen. IV. 170. — Höhenmessungen in den Bieskiden und Sudeten. VII. 279. — Mähren (westliches). IX. 39, 41, 45, 49, 52. — Nord-Karpathen (schlesische). III. c. 135; VI. 304; X. *V.* 102, 103. Holzer (Fr.). Strassen-Nivellements in den Sudeten. VII. 295. Hornig (E.). Düngers (Controlle des künstlichen). VII. 378. — Oker, Anal. VI. 880. — Photographische Verwendung des salpetersauren Uran-Oxydes. IX. *V.* 47. — Zeitschrift „die Realschule". VIII. 373. Horváth (Fr.). Linarit von Rézbanya. III. a. 191. Houghton (Dr.). Kupfergebiet von Michigan. VII. 786. Hoyos (Graf). Eisen-Bergbau zu Göstritz und Pitten. V. 515, 518. Hruschauer (Prof.). Neuhauser Mineralquelle, Anal. VIII. Hubert (v.). Andalusit in Kyanit verwandelt, Anal. I. 350, 358. — Kalksteine, Anal. I. 729, 745; X. *V.* Anh. 41. — Kupferprobe (colorimetrische). I. 415, 562. — Petrefacte von Agordo. I. 168. Humboldt (A. v.). „Erinnerungen für die Novara-Expedition." VIII. 368. — Grailich's und v. Lang's optische Arbeiten. IX. *V.* 19. — (Dr. Hochstetter's Nachricht über). VIII. 160. — „Kosmos." 4. Band. IX. *V.* 19, 137. — Magnetisch-polarer Serpentin. VIII. 658, 806. — Reisen der Brüder A. und H. Schlagintweit. VIII. 775. — Schreiben, die k. k. geologische Reichsanstalt betreffend. VII. 834; X. *V.* 171, 172. — — an Haidinger. VIII. 160, 783, 784. — — an Dr. Kotschy. X. *V.* 3. — — an Baronin Kotz. VIII. 790. — Werk über amerikanische Petrefacte. IV. 843. Humboldt-Stiftung. X. *V.* 188. Hutzelmann. Aufbereitung der Přibramer Silbererze. VII. 178. Hyrtl (Prof.). Gebeine aus den keltischen Gräbern bei Hallstatt. I. 352. — Museum für vergleichende Anatomie zu Wien. III. a. 190. — Naturforscher-Versammlung in Wien (Bericht über die 32.). X. *V.* 91.

Jacquelain. Kupferprobe (colorimetrische). I. 415. Jäger (C.). Tagblatt der Naturforscher-Versammlung zu Tübingen. IV. 843. Jahn. Alterthümer aus der Torfmoore von Moosseedorf. VIII. 780. Jan (G.). Beschreibung des Mailänder „Museo civico". VIII. 172. Janosch (Prof.). Schall-Phänomen am Monte Tomatico. IV. 563, 564. Jantsch. Zinn in Böhmen. IV. 190, 191. Ibis. (Naturwissenschaftlicher Verein zu Verona.) VIII. 168. Jeitteles (Prof. L. H.). Erdbeben vom 15. Jänner 1858. IX. *V.* 35. — Veränderung der Lomnitzer Spitze in historischer Zeit. X. *V.* 179. — Vulcane (erloschene) in Mähren. IX. *V.* 35. Jenkins (H.). Separations-Sieb für Anthracit. III. c. 27. Jenzsch (Dr. G.). Amygdalophyr (Weissigit). IV. 647. Jessernig (Frz.). Triassische Gasteropoden. VIII. 157, 179. Innern (k. k. Ministerium des). Uebernimmt die Oberleitung des k. k. geologischen Reichsanstalt. IV. 181. — Verordnungen und Erlässe. VI. 206; VIII. 623, 808, 809; X. 143, 359, 579. Inner-österreichischer geognostisch-montanistischer Verein. Arbeiten. II. a. 138; V. 228. — Verkehr mit der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 170; V. 223. Joachimsthaler k. k. Berg-Oberamt. Sammlung von Anbrüchen. VI. 163. Johann (Erzherzog K. H.). Alpenhütte bei Pregartten. IX. *V.* 53. — Besuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. IX. *V.* 53, 168. — Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. VIII. 738, 811; IX. *V.* 3, 109, 136, 140. John (Forstmeister). Vegetations-Grenzen im Böhmerwalde. VII. 149. Johnson (Prof.). Asche und Heizkraft nordamerikanischer Steinkohlen. III. c. 10, 17. Johnston (W. R.). Zähigkeit von Eisensorten. VII. 780. Jokély (Johann). Böhmen (geognostische Aufnahmen in). V. 263, 264; VII. 317; VIII. 792, 793, 800; IX. 519, 549, *V.* 15, 41, 72, 81, 91, 126; X. 365, *V.* 15, 60, 96, 112, 113, 116. — Egerer Kreis. VII. 167, 479; VIII. 1, 446. — Erlau (Umgebung von). V. 221. — Erz-Lagerstätten von Adamsthal und Rudolphstadt. V. 107. — — und Bergbaue im böhmischen Erzgebirge. VII. 317; VIII. 165, 181, 516; IX. 549, *V.* 41, 42. — Granit und Granitit. IX. *V.* 110, 111; X. 471, *V.* 15, 16. — Grünerde von Kaaden. VII. 845. — Höhenmessungen. X. 40. — Isergebirge. X. 367, 370, *V.* 15. — Kalk (krystallinischer) im südlichen Böhmen. V. 227. — Kreide in Böhmen. VIII. 776, 800; IX. *V.* 72, 81, 91, 92, 126; X. *V.* 60, 61, 84, 96, 112, 113. — Leitmeritzer Kreis. IX. 398, 549, *V.* 41, 42, 61, 72, 91; X. 40, *V.* 60. — Mittel-Böhmen. VI. 167, 355, 682. — Mittelgebirge (vulcanisches). VIII. 812; IX. 398. — Riesengebirge (böhmisches). X. 365, *V.* 15. — Schneekoppe. X. *V.* 116. — Tertiär-Becken von Eger und Falkenau. VII. 380; VIII. 466. — — von Saaz und Teplitz. IX. 519. — Triton im Basalt-Tuff. X. *V.* 51. — Ur-Thonschiefer und Granit im mittleren Böhmen. VII. 106, 107. Jones (T. R.). Geologische Thätigkeit in England. IX. *V.* 55; X. *V.* 35, 45. — Posidonomya. VII. 852. — Zeitschrift „The Geologist". IX. *V.* 55. Jordan (Dr.). Sendungen an das Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt. IV. 167, 647. Ischl (k. k. Salinen-Verwaltung). Magnetische Beobachtungen. I. 510. Jugler (O. B. R.). Sendungen aus Nordwest-Deutschland, II. b. 156, d. 143; III. a. 178; V. 642, 643; VI. 165. — Wealden-Pflanzen. III. a. 178. Jugovitz (A.). Braunkohlen-Schürfungen bei Grosswardein. X. *V.* 90. Juhoss (J. J.). Reisebericht aus England und Californien. I. 718. Junghuhn (Dr.). Tertiäres des indischen Archipels. IX. 293. — Wissenschaftliche Erforschung der Insel Java. IX. *V.* 102, 103. Jungmann (Fr.). Serpentin von Smolinowes. VI. 408; VII. 110. Jurenak (B. V.). Braunkohlen-Ablagerungen in Mittel-Ungarn. X. *V.* 64. Justiz-Ministerium (k. k.). Erlässe und Verordnungen. VII. 616; VIII. 190, 390, 621, 625, 626, 635, 818; X. 459.

Kainzbauer (Dr.). Pirawarter Mineralquelle, Anal. IV. 425. Kanitz (K.). Kupferbaue in Kärnthen. VIII. 385. Karrer (F.). Eichkogel. IX. *V.* 160; X. 25. Karsten (Dr. H.). Neu-Granada. IX. 106. Keil (F.). Höhenmessungen im oberen Gebiete der Drave, der Piave und des Tagliamento. VII. 459. Kenngott (Prof.). Achat-Mandeln von Theiss. I. 747. — Bergholz. IV. 630, 631. — Berthierit. IV. 635. — Bolus (chemische Formel des). VI. 633. — Chlorit-Glimmer (neuer) aus dem Granit bei Pressburg. IV. 636. — Delanovit. IV. 633. — Dopplerit. I. 303. — Granit bei Pressburg. II. c. 42. — Klinochlor. V. 855. — Piauzit und Hartit. VII. 91. — „Resultate der mineralogischen Forschungen". III. a. 179; VI. 409; VII. 162. — Schlesien (nordwestlicher Theil von k. k.). IV. 3. — Verhältniss zwischen den Atomgewichten, Härten und specifischen Gewichten isomorpher Mineralien. III. d. 104. — Vorhauserit. VIII. 358. Kerl (Br.). „Lehrbuch der Probirkunst." VIII. 372. Keszt. Eisenstein von Morawitza. II. b. 15. Kiepert (Dr.). Karte von Klein-Asien. V. 435, 436. Kind. Artesischer Brunnen von Passy. VII. 206. — Erdbohr-Arbeiten. I. 369, 746. Kindinger. (Fr.). Braun-Eisenstein mit Kern von Spath-Eisenstein. V. 183. King: siehe „Butler-King". Kiss (Dr. K.). Steinkohlen-Petrefacte von Rosenau. VI. 405. Kitzbüchl (k. k. Bergverwaltung). Mineralien. I. 556. Klein (Alb.). Bergmännische Unternehmungen. IX. 239. Kleinschrod (C. Th.) Fossiler Baumstamm. V. 898. Klement (Jos.). Kohlensäure-Quelle von Szt. Iván. X. *V.* 36. Kleszczynski (E.). Erzrevier von Přibram. V. 884. — Geologische Skizze von Přibram. VI. 254. — Hüttenprocess von Přibram. VII. 171. — Mineral-Species und Pseudomorphosen von Přibram. VI. 46. — Niveau-Verhältnisse und Wasserwirthschaft von Přibram. VII. 177. — Stamm von Lepidoden-

dron. VII. 608. Klipstein (Dr. A. v.). Marienbad. II. b. 1. — Geognostische Darstellung des Grossherzogthums Hessen. III. a. 187, d. 131. — St. Cassian-Schichten, deren geologische Stellung. III. c. 134. Klug (J. V.). Tertiäre Petrefacte von Porstendorf. IV. 188; V. 747. Kner (Prof. R.). Bären-Skelet aus der Slauper Höhle. II. a. 159. — Bernstein bei Lemberg. II. b. 163. — Istrien. IV. 223. Kobell (Prof. v.). Aräoxen. II. d. 169. — Fluorsäure (Wirkung der) auf Silicate. II. d. 169. — Klinochlor, Anal. V. 862. — Magnetismus ausgeglühter Mineralien. VIII. 675. — „Die Mineralnamen und die mineralogische Nomenclatur." IV. 428. Koch (C. L.). Kupferbezirk von Michigan. IV. 178. Köhler (Ed.). Blaues Steinsalz. VI. 855. — Eisenstein-Lager der ostgalizischen Karpathen. VI. 183. Köhler (Prof.). Zirkon aus dem Pfitsch-Thale. IV. 836. Kokscharow (N. v.). Euklas in Russland. IX. *V.* 29. — Klinochlor von Achmatowsk und zweiaxiger Glimmer vom Vesuv. V. 852. — „Krystallographie des Glimmers." VI. 410. — Magnesia-Glimmer vom Vesuv. VII. 822. — „Materialien zur Mineralogie Russlands." VIII. 773. Kolenati (Prof.). Brünner Gegend (geologische Karte der). IV. 175. — Mährisch-schlesischer Verein für Geologie. II. a. 158, d. 151, 152, 154. — Steinkohlen-Formation in Böhmen und Mähren. V. 666 Anmerk. — Tertiär- und Quader-Pflanzen aus Mähren. IV. 175. Koller. Keuperkohle von Weyer. I. 637. Koninck (Prof. de). Geologie von England und Schottland. VII. 184. Kopetzky (R.). Braunkohle von Strassgang. IV. 434. — Kohle und Eisensteine von Görz. II. a. 140. — Schildkröte aus der Braunkohle. IV. 429. Kořistka (Prof.). Höhenkarte des Erzherzogthums Oesterreich. VI. 185. — Höhenmessungen in Mähren. III. d. 128; IV. 12, 29; V. 161, 665 Anmerk., 701; VI. 72; VII. 279; IX. 80. — — in Nieder-Oesterreich. II. d. 155; III. c. 94, 99, d. 128. — — in den nordöstlichen Alpen. II. a. 34. — — in den Sudeten, Bieskiden und West-Mähren. VII. 279; X. 237. — — (über geologisch-orographische). III. b. 1. — Kreil's magnetische und meteorologische Beobachtungen. I. 61, 221, 423; III. a. 36, c. 119. — Neuere geographische und topographische Arbeiten. IV. 283. — Quellen-Temperatur in den mährisch-schlesischen Sudeten. X. 253. — Reductions-Tafeln für barometrische Messungen. VI. 837. — Werner-Vereines (Verbindung der Arbeiten des) mit denen der k. k. geologischen Reichsanstalt. II. d. 152. — Wiener Beckens (Niveau-Verhältnisse des). III. c. 112, 115. Kornhuber (Dr.). Mitgründer des naturwissenschaftlichen Vereines zu Pressburg. VII. 187, 364. — Mittel-Ungarn (nördliches). IX. *V.* 128. — Neutra-Thal. IX. *V.* 112. Kotschubey (P. A. v.). Klinochlor. V. 861. Kotschy (Dr. Th.). Schreiben A. v. Humboldt's an ihn. X. *V.* 3. Kotz (Baroninn v.). Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. VIII. 173, 790, 811; IX. *V.* 134. Kováts (J. v.). Fossile Flora von Ungarn. II. b. 178, d. 166; VIII. 319; X. 447. — Petrefacte der Ofener Gegend. VIII. 310, 317, 319. — Ungarischer geologischer Verein. I. 379; IV. 432, 433. Krantz (Dr.). Geschenke an das Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt. VIII. 182. Krasser (F. A.). Polirschiefer von Leitmeritz. IX. *V.* 35. Kraynág (A. v.). Anthracit-Bergbau in Pennsylvanien. III. a. 179, 183, c. 7. — Asphaltstein von Seefeld, Anal. VII. 372. — Nickelerz von Kitzbühel, Anal. I. 557. Krejčí (Prof.). Silurisches in Böhmen. X. 479, 480, 481, *V.* 111, 175. Kreil (Dir.). Magnetische und meteorologische Beobachtungen im österreichischen Kaiserstaate. I. 61, 220, 423; III. a. 36, c. 199. — Seehöhe von Prag. VIII. 236. Kreith (Graf). Felsőbánya. II. c. 166. Kretschmer (K.). Braunkohlen-Pflanzen von Oedenburg. IV. 638. Krickel (J. A.). Hermanns-Höhle. V. 501. Krüger (H.). Verkieselung lebender Bäume. VIII. 736. Kubinyi (Frz. v.). Hegyallya. II. b. 178. — Säugthiere (fossile) bei Ofen. VIII. 332. — Ungarischer geologischer Verein. I. 378. Kuczkiewicz Magnetische Beobachtungen zu Wieliczka. I. 499. — Transmissions-Gurten aus abgenützten Grubenseilen. III. d. 132. Kudernatsch (Joh.). Alpen (geologische Notizen aus den). III. b. 44. — Banater Gebirgszug. VI. 219, 905. — Bergbau im Banat. I. 705; II. b. 167. — Cephalopoden des Adnether Marmors. II. b. 173. — — des Ooliths von Swinitza. II. a. 147. — Eisenstein-Lager von Gollrad. II. a. 155; III. a. 4. — Guttensteiner Kalk. X. 85, 86. — Goldwäschereien des österreichischen Kaiserstaates. II. b. 164. — Lebensabriss. VII. 375. — Nieder-Oesterreich südlich der Donau. III. b. 170. — Reisen im Auftrage der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 176, 625; II. a. 137; III. a. 99, b. 170. — Semmering-Tunnel. I. 375. — Steierdorfer Kohlenlager. I. 356; II, b. 167; VI. 905. Kudernatsch (Jos.). Entgoldung der Arsenik-Kiese. III. a. 202. — Entsilberung des Kupfersteines. III. a. 201. — Stahl-Fabrication. III. b. 168. — Tyres und Puddling-Stahl. III. a. 200. — Zinnes (Gewinnung des) in England. III. a. 173. Kulczycki. Taïti und Taiarapu. X. 570, *V.* 188. Kunz (P.). Insecten (fossile) von Radoboj. II. a. 141. — Krikehajer Braunkohlen-Becken. VII. 609. Kupido. Korund in Mähren. II. d. 151. Kutschera (Jos.). Höhenmessungen im südlichen Böhmen und Nivellements des fürstl. Schwarzenberg'schen Holzschwemm-Canales. V. 433, 625. Kyhl (P.). Versuche mit Naturselbstdruck. IV. 859, 860.

Lallemant (Dr.). Ausrüstung der k. k. Fregatte „Novara". VIII. 368, 369. Lamont (Prof.). Erd-Magnetismus. X. *V.* 34. Landes-Cultur und Bergwesens-Ministerium (k. k.). Erlässe und Verordnungen. II. d. 171; III. a. 208, b. 173, c. 161, d. 172.

— — Forstgesetz. III. d. 151. — — Magnetische Beobachtungen (Instruction über). I. 486, 490, 501, 513, 750. — — Personalstands-Veränderungen. I. 178. 381, 563, 750; II. a. 165, b. 194, c. 168, d. 171; III. a. 208, b. 172, c. 159, d. 148. — — Viehsalz aus dem Salzkammergut. II. d. 140. — — Zusammenstellung technischer Erfahrungen. III. d. 131. Landes-Oekonomie-Commission (k. preuss.). Versuche über Erschöpfung des Bodens durch Anbau. I. 42. Lang. Tertiäre Petrefacte aus Ungarn. VII. 813. Lang (Dr.). Mineralwasser von Trentschin-Töplitz, Anal. X. 1. Lang (Dr. v.). Optische Arbeiten. V. 19. Langer (Fr.). Fische (fossile) von Sagor. IX. V. 49. Langsdorf (Brüder). Entdecker des Salzhausener Braunkohlen-Lagers. X. 524. Lanna (A.). Bergmännische Unternehmungen. IX. 239. Lanza (Prof.). Dalmatien. IV. 157, 647, 648; VI. 898. — Petrefacte aus Dalmatien. V. 643. — Reisebericht aus Deutschland, Frankreich und England. VI. 877, 899; X. V. 136. Larisch-Mönnich (Geologische Untersuchung der Güter des Grafen). IV. 649. Lavizzari (Dr.). Cephalopoden von Lugano und Mendrisio. V. 216. Layer (M.). Nekrolog. III. a. 1. Lea (J.). „Observations on the genus Unio etc.“ IX. V. 4. Lehigh-Kohlen-Compagnie. III. c. 8. Lehmann. Magnetismus des Basaltes. VIII. 657. Leobner k. k. Montan-Lehranstalt. Jahrbuch. II. b. 171; III. b. 162; IV. 194; X. V. 135. — k. k. Ober-Bergamt. Magnetische Beobachtungen. I. 491. Lepellier. Gewinnung von Bittersalz aus Dolomit. VI. 71. Leschner. Magnetische Beobachtungen zu Freiberg. I. 493. Lettsom (W. G.). „Manual of the Mineralogy of Great-Britain.“ IX. V. 66. Leydolt (Prof). Aetzung und Abdruck von Mineralien mittelst Fluorsäure. II. b. 123. — Krystallographische Untersuchungen mittelst Fluorsäure. V. 889. — Krystallographie des Glimmers. VI. 411. — Nekrolog. X. V. 83. Lidl (F. v.). Eisensteine und Torflager im südlichen Böhmen. V. 233. — Kallwang. IV. 429. — Lubenz. VII. 373, 374. — Parschlug. IV. 171. — Petrefacte der Rietzinger Braunkohle. IV. 413. — Pseudomorphose nach Steinsalz. IV. 101. — Reisen im Auftrage der k. k. geologischen Reichsanstalt. V. 263, 264; VI. 189; VIII. 249. — Silur-Beckens (westlicher Theil des mittelböhmischen). VI. 189. — Steinkohlen von Böhmen und Mähren, Probe. VI. 160. — Steinkohlen-Mulden in Böhmen. VI. 164, 411. — Steinkohlen-Formation des Pilsener Kreises. VII. 249. — Südwestliches Böhmen. VI. 189, 580. — Thon-Eisensteine, Anal. IV. 829. — Wittingauer Tertiär-Becken. V. 208. Liebener (L.). Gymnit. I. 605. — Kyanit-Pseudomorphose. I. 350. — Magnet-Eisenstein pseudomorph nach Glimmer. III. d. 31. — Pseudomorphosen aus Porphyr. II. c. 163. — — aus dem südlichen Tirol. IV. 160. — Tirol (geognostische Karte von). VI. 185. Liebig (J.). Bergmännische Untersuchungen. IX. 239. Liechtenstein (Alois Fürst). Palast der k. k. geologischen Reichsanstalt in Miethe überlassen. II. b. 158. — Ehrengedächtniss. IX. V. 125. Lienbacher (Joh.). Eröffner des Stangalpener Anthracit-Lagers. IX. 215. Lill v. Lilienbach. Halleiner Salzgebirgs (Durchschnitt des). V. 607, 608. — — Schrambach-Schichten. V. 593. Lill v. Lilienbach (A.). Hatchettin von Brandeisl. V. 898. — — Mineralien der k. k. geologischen Reichsanstalt geschenkt. X. V. 176. — — Mineralien-Sammlung. X. V. 176, 177. — — Sphärosiderite von Brandeisl. IV. 648. Lindacker (Jos.). Uran-Mineralien, Anal. IV. 221. 222. — Voltzin, Anal. IV. 220. Lindner. Lithographische Schiefer von Gallignana. IX. V. 123. Linné (C.). Muschelschichten von Uddevalla. IX. 601, 602. Lipold (M. V.). Alpenkalk mit Dachstein-Bivalven. III. d. 90. — Anmerkungen zu Prinzinger's „Geologie der Umgebung von Hall“. VI. 347. — Blei-Bergbau zu Unterpetzen. VI. 169. — Bleierze in Kärnthen. VII. 369. — Böhmen (geologische Aufnahmen in). X. V. 84, 95, 96, 110, 185. — Braunkohlen-Flötze von Gran. IV. 140. — Braunkohle von Wildshut. I. 599. — Cattaro und Montenegro. X. V. 23, 27. — Diluvial-Lehme (eisenführende) in Unter-Krain. IX. 246, V. 5. — Eisenlager im Jasloër Kreise. VII. 836. — Eisensteine, Anal. VIII. 616. — Eocenes in Ober-Krain. VIII. 371. — — in Ober- und Nieder-Oesterreich. IX. 118, 119, 123, 130, 136. — Erratische Blöcke und alte Gletscher im Gebiete der Salzach. V. 792, 793. — Erz-Lagerstätten von Tergove. VII. 848. — Flussgefälle im Salzburgischen. V. 438, 614. — Gailthaler Schichten und alpine Trias. VII. 374. — Grauwacke und Eisensteine im Salzburgischen. V. 369. — Halleiner Salzberg. V. 590. — Höhenbestimmungen in Kärnthen, Krain und Steiermark. VI. 142, 908; VII. 346; X. 30, 31, 45. — Hüttenberger Erzberg. VI. 643. — Idria. IV. 422; VII. 838, 839. — Jura-Kalk in Nieder-Oesterreich. II. d. 167. — Kärnthen (nordöstliches). V. 882; VI. 194, 198, 414. — — (östliches). VII. 332. — — (südöstliches). VI. 897; VII. 175, 193, 369, 374. — — (südwestliches). VII. 365. — Kalk-Alpen des Salzkammergutes. IV. 433. — Kalksteinen und Dolomiten (chemische Analyse von). II. b. 67; IV. 828. — Kohlenschichten von Cattaro. IX. V. 111, 112. — — von Fünfkirchen. VIII. 804, 805; IX. V. 111. — Krain (Ober-). VIII. 178, 205, 371, 384, 385, 776; X. V. 58. — — (Unter-). VIII. 785, 793, 811, 812; IX. 257, V. 38, 48, 60, 149; X. V. 58. — Kreide in Ober-Oesterreich, Salzburg und Steiermark. IV. 170. — — und Eocenes von Triest und Istrien. IX. V. 92. — Kreide- und Eocen-Petrefacte aus Kärnthen. VI. 187. — Krystallinische Schiefer- und Massengesteine in Kärnthen. VII. 365. — Küstenland (Istrianisches). X. V. 75. — Kupfer und Quecksilber bei Laak. IV. 863. — Kupfererze in Ober-Krain. III. b. 131

— Lias und Jura (alpiner) in Kärnthen. VII. 193. — Mähren (nordwestliches). X. 219, *V.* 13. — Nickel-Bergbau im Leogang-Thale. V. 148. — Nieder-Oesterreich nördlich der Donau. III. a. 169, 171, 182, 183, 189, b. 171. — Pflanzen (fossile) von Laak. IX. *V.* 18. — Porzellanerde im Bacher-Gebirg. VIII. 770, 771; XI. *V.* 49. — Reisen im Auftrage der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 177, 368, 379, 657, 747; II. b. 165, d. 154; III. a. 101, d. 70; IV. 846; V. 231, 253; VIII. 178; IX. *V.* 149; X. *V.* 75, 84, 95, 110, 183. — Salzburg. II. a. 22; V. 231, 253. — — (geologische Karte von). IV. 176, 856; V. 229. — Salzburger Alpen. II. c. 108. — Salzkammerguts (geologische Karte des). IV. 431. — Schiefer (krystallinische) und Massengesteine in Nieder- und Ober-Oesterreich. III. c. 35. — Schotter (diluvialer) des Lavant-Thales. V. 891. — Sericit-Schiefer im Salzburgischen. V. 201. — Silurisches in Böhmen. X. *V.* 111, 183. — Steinkohlen-Petrefacte aus den Windischen Gräben. VI. 192. — Sulzbach-Thal. VII. 169. — Tännengebirg. II. a. 79. — Tertiäres um Idria. IX. *V.* 18. — — des Lavant-Thales. V. 889, 890; VII. 578. — — und Diluvium in Kärnthen. VII. 175. — Tertiär- und Quartär-Gebilde in Ober-Oesterreich und Salzburg. III. d. 147 — Trias im Küstenlande. IX. *V.* 81. — — im östlichen Kärnthen. V. 893. — — (Eisenstein führende) in Krain. IX. *V.* 81. — Verwässerung (continuirliche) zu Aussee. I. 373, 411. — Werner-Vereines (Verbindung der Arbeiten des) mit denen der k. k. geologischen Reichsanstalt. II. d. 152. — Zink-Lagerstätte von Petzel. VIII. 169. 170. — Zinnober aus dem Pototschnigg-Graben. VI. 814. Lippmann (J.). Sendungen aus dem Erzgebirge für die k. k. geologische Reichsanstalt. V. 433, 644, 894, 895; VI. 884. Littrow (K. R. v.). Schreiben, betreffend Pick's „über Barometer-Höhenmessungen". VI. 878. Lobkowicz (Joh. Fürst). Correspondent der k. k. geologischen Reichsanstalt. IV. *V.* 153. Löschke. Mineralien u. s. w. aus dem Klattauer Kreise. V. 194. Löwe (Alex.). Asphaltgehaltes (quantitative Bestimmung des). I. 749. — Eisensteine von Pitten, Anal. V. 516. — Erze und Hüttenproducte aus Serbien, Anal. II. b. 174. Logan (Sir E. W.). Betheilung mit der Wollaston-Medaille. VII. 363. — Pflanzen (fossile) von Canada. X. *V.* 35. Loibl (A.). Steinbruch-Karte von Mähren und k. k. Schlesien. V. 396. Loosey (K.). J. D. Owen's Bericht über Wisconsin, Jowa und Minnesota. IV. 841. Lorenz (Prof. J. R.). Liburnischer Karst und Quarnerische Inseln. X. 332. Lorière (de). Petrefacte aus den Faluns der Touraine. III. a. 169. Lortet. Geschiebe mit Eindrücken. IV. 672, 673. Loschan (G.). Erze der Comenda-Alpe. VII. 673. Lozinsky (M.). Schedel von Elephas primigenius. II. d. 158. Ludwig (R.). Braunkohle von Salzhausen. X. *V.* 178. — Gasentwicklung der Soolquellen von Nauheim und Kissingen. VII. 828. — Geologische Karte des Grossherzogthums Hessen. VIII. 797. — Quarz pseudomorph nach Baryt. X. *V.* 179. — Steinkohlen-Gebilde von Offenburg. VIII. 334. — Süsswasser-Mollusken der Steinkohlen-Gebirge. X. *V.* 178. Lukas (Dr.). Barometrische Höhenmessungen der Herren Prantner und Urlinger. VI. 880, 899. — — — (Berechnungen von). VIII. 163. — — — (Einfluss der atmosphärischen Wellen auf). VI. 887. — Erdbeben. VII. 165. Lunelli (Prof.). Barometrische Beobachtungen zu Trient. X. 32, 33. Lyell (Sir Ch.). Orthoceratiten am Untersberg und Fuchsstein. VIII. 151.

Mac-Adam (J.). Skelet des Riesenhirsches im Museum zu Belfast. VII. 161. Magistris (A.). Kalksteinbrüche in der hintern Brühl. VI. 201. — Sprengung von Gesteinen mittelst Reibungs-Elektricität. VII. 828. Magnus (Prof.). Ackererden, Analyse. I. 142. Majer (Prof.). Petrefacte aus Stuhlweissenburg. VI. 886. Mailänder geologische Gesellschaft. IX. *V.* 153. Maimeri (Dr.). Lithographische Steine von Bassano. IV. 637. — Petraja bei Bassano. VI. 886. Malaguti. Silbers (Gewinnung und Vorkommen des). I. 749. Manchester (Literarische und philosophische Gesellschaft zu). Druckschriften. X. *V.* 81. Mannlicher (G.). Siebenbürgische Petrefacte. II. b. 73. Manz (v.). Bergbaue in der Bukowina. V. 221; VI. 103, 116, 134. Marcou (Prof. J.). Felsengebirg („Rocky Mountains"). IX. *V.* 107. — Nord-Amerika. X. *V.* 1, 18. Marignac. Klinochlor. Analyse. V. 862. Markus (C.). Kobalt-Nickelerze von Dobschau. I. 363. Markus (Fr.). Silber-Extraction zu Tajova. II. a. 109; V. 406. — Silberstufen (Abdrücke von angeschliffenen). VI. 168. Markus (S.). Gasflammen-Regulator. VI. 64. — Thermo-Lysimeter. VII. 187. Maria-Theresien-Ordens (Dr. Hirtenfeld's Geschichte des k. k. Militär). X. *V.* 2. Marmora (Gen. de la). „Voyage en Sardaigne". IX. *V.* 4. Marschall (A. Fr. Graf). Archivar der k. k. geologischen Reichsanstalt (Ernennung znm). I. 6. — N. Boubée's Denkschrift über Ackerbau-Geologie. I. 129. Marschan (J.). Waschgold. IX. *V.* 15, 134. Marsden (N.) Entdecker der Blei-Lagerstätten von Galena (Nord-Amerika). VII. 794. Martius (C. v.). Palmen (geographische Verbreitung der). II. d. 159. — Pflanzen (fossile) vom Kochel-See. VI. 651. Marx (A.). Stosszahn von Mastodon. VII. 608. Massalongo (Prof. A.). Ammoniten (jurassische) der Süd-Alpen. IX. *V.* 47. — Gründer des naturwissenschaftlichen Vereines „Ibis" zu Verona. VIII. 168. — Gypsabgüsse fossiler Fische und Pflanzen. X. 149, *V.* 91. — Knochenhöhlen im Veronesischen. II. a. 137. — (Kritik Catullo's über das Werk des Dr.). IV. 113. — Pflanzen (fossile) aus dem Venetianischen. VI. 886. Mayer (FML.). Vermächtniss an die k. k. geologische Reichsanstalt. IX. *V.* 39. Mayer (Prof.). Listriodon splendens.

X. *V.* 53. Medhurst (V. G.). „Chinese Repository". X. *V.* 2. Melion (Dr.). Bucht des Wiener Beckens bei Malomeřitz. III. a. 140. — Conchylien (fossile) von Malomeřitz. III. d. 77. — — — von Rossitz, Littenschitz u. s. w. IV. 703. — Horn- und Feuersteine um Brünn. II. c. 1. — Nova Hora bei Julienfeld. IV. 73. — Petrefacte des oberen Jura um Brünn und Blansko. V. 696. — Sudeten (Ausläufer der). V. 386. — Umgebung von Brünn. IV. 321. Melling. Raibl. I. 257, 263. Meneghini (Prof.). Toscana (Geologie von). IV. 782; V. 228. — — (Pflanzen und andere Petrefacte aus). IV. 648; V, 228.) — Verrucano. IX. 456, 457. — Meneguzzi. Höhenmessungen im Venetianischen. VIII. 249. Mensdorff (A. Graf). Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. IX. 175. Merck (E.). Muster schwedischer Granite und Porphyre. IX. *V.* 134, 145. Merian (P.). Lias von Tirol und Vorarlberg. IX. 474. — Sendung von Büchern an die k. k. geologische Reichsanstalt. IV. 446, 839. Meschendörfer (Prof. J.). Geologische Aufnahme Siebenbürgens. X. *V.* 107. Meyer (H. v.) Anthracotherium Dalmatinum. IV. 165. — Archegosaurus. IX. *V.* 90. — Balaenodon Lintianus. I. 163. — „Paläontographica". IX. *V.* 96; X. *V.* 81. — „Reptilien aus der Steinkohlen-Formation". IX. *V.* 90, 108. — Säugethiere der Leidinger Braunkohle. V. 524. — Triton aus Basalt-Tuff. X. *V.* 51. — Wirbelthiere (fossile) aus Oesterreich. I. 165. — Wollaston-Medaille. IX. *V.* 54. — „Zur Fauna der Vorwelt". VII. 852; X. *V.* 54. Meyer. Braunkohlen-Schichten von Neudorf. IV. 49. Michelin (A.). Eocene Petrefacte von Ober-Oesterreich. IX. 116, 117. Micksch. Magnet-Eisenstein von Glashütten. VI. 616. — Steinkohlen des westlichen Böhmens. VI. 162. — Zinkblende im Sphärosiderit. VII. 610. Miesbach (Al.). Büste Seiner k. k. Apostolischen Majestät für die k. k. geologische Reichsanstalt. VI. 887. — Festrede bei der Werner-Feier. II. d. 22. — Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. II. a. 157; VI. 887; VII. 609, 610. — Mährische Braunkohlen-Werke. IV. 48. — Steinkohlenbau zu Grünbach. II. b. 108. Militärisch-geographisches Institut (k. k.). Preise der Karten. IX. *V.* 154. Miller (Prof. A. v.). „Die steiermärkischen Bergbaue". X. *V.* 194. Ministerium des Innern (k. sächsisches). Uebersendung von Werken an die k. k. geologische Reichsanstalt. VII. 829. Mitterndorfer (J.). Höhlen und Petrefacte des Grebenzer Gebirgs. III. d. 140. Mladek. Faserkalk-Concretionen von Ruditz. V. 692. 693. — Quader im Zwittauer-Walde. V. 731. Mohs (Fr.). Lebensabriss. II. d. 12. Moltke (Freih.). Karte von Klein-Asien. V. 435, 436. Montan-Behörden. Personal-Veränderungen. IV. 195, 437, 650, 866; V. 234, 446, 644, 899; VI. 202, 420, 654, 909; VII. 207, 388, 612, 853; VIII. 186, 388, 621, 816; IX. 176, 300, 509, 699; X. 142, 355, 468, 576. Morgenbesser (Franz v.). Kupferspuren am Aichberg. V. 519. Morlot (A. v.). Bryozoen von Reichenburg. II. a. 163. — Carcharodon von Gairach. II. a. 149. — Gletscherspuren bei Pitten. V, 527. — Hornblende-Gneiss. V. 542. — Kupfer-Bergbau (uralter) am Mitterberg. I. 197. — Leitha-Kalk. I. 347. — Metamorphosirte Eocen-Gebilde. VIII. 405, 448, 449.. — Miocenes Meer der nordöstlichen Alpen. I. 365. — Mittheilungen (briefliche) an Haidinger. I. 347. — Mur-Thal. I. 29; VII. 47, 49, 51, 66. — Nach-tertiäre Erkaltungs-Periode. VII. 601. — Nord-Steiermark. I. 99. — Ober-Krain. I. 389; VII. 640, 641, 675, 685. — Porphyre der Werfener Schiefer. VII. 636. — Radoboj. I. 268. — Raibl. I. 255. — Römisches Eisenwerk (befestigtes). I. 199. 366. — Spath-Eisenstein in Geoden von Braun-Eisenstein. V. 185. — Terrasse von Raune. VII. 687. — Tertiäres in Steiermark. VII. 39. — Unter-Steiermark. IV. 177; VII. 220, 225, 227, 236, 238, 550; VIII. 404, 442, 449. — Weitensteiner Erz-Lagerstätte. VIII. 424, 428. — Wiener Sandstein von Kainach. VII. 220. Moser (Ign.). Agronomisch-chemische Arbeiten. I. 376. — Salpeter-Bezirke in Ungarn. I. 453, 562. Mrazek (W.). Braunkohle, Anal. III. a. 161, 163, 164. — Brunnwasser, Anal. III. c. 154. — Erdarten, Anal. III. c. 155. — Hochofen-Schlacken, Anal. III. a. 156, 157. — Kalksteine und Dolomite, Anal. III. a. 163. — Kupfererze, Anal. III. a. 162. — Quarz-Krystalle aus dem Bitizer Walde. II. d. 170. — Steinkohlen, Anal. III. a. 158, 161, 164. Mühlbacher, k. k. Bergamt. Gebirgsarten und Mineralien. I. 161. Müller (Fr.). Einfluss der Kohlendämpfe auf gusseiserne Röhren. III. d. 132. — Wetterlösung mittels eines Stromes von Wasserdampf. III. d. 133. Müller (Frz.). Steinsalz von Bayonne. V. 428. Müller (H.). Grauer und rother Gneiss des Erzgebirges. VIII. 519 Anmerk. — Müller (Herm.). Höhle beim Einöder Mineralbade. III. d. 139. Müller (Joh.). Bos Urus von Moosseedorf. VIII. 779. Müller (Dr. Fr.). Schreiben aus Melbourne (Australien) an Hofrath Haidinger. X. *V.* 90. Müller (Prof.). Pferdeknochen und Hufeisen aus der Zeit der Türkenkriege. I. 745. Münichsdorfer (Fr.). Hüttenberger Erzberg. VI. 619, 623. Murchison (Sir R. I.). Besuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. VIII. 768, 791. — Denkmahl für L. v. Buch. VIII. 183. — Meeres-Conchylien von Radkersburg. VI. 297. — Mittel-Steiermark. VII. 219, 242, 257 Anmerk., 539, 562, 575, 586. — Nulliporen-Kalk. VII. 582. — Publicationen des „Geological Survey of Great Britain". VIII. 186. — „Siluria". 3. Ausgabe. X. *V.* 43, 44. Murmann (F. J.). Künstlicher Marmor. VII. 375. Mylne (R. M.). Geologische Karte der Umgebung von London. VIII. 186.

Nagybányer, k. k. Inspectorat-Oberamt. Einsendungen an die k. k. geologische Reichsanstalt. II. c. 166; IV. 834; IX. 176. Nagy-Klausenthal (K. v.). Tertiär-Petrefacte von Reps. X. *V.* 191. Napoleon (Prinz). Bericht über die Pariser-Ausstellung von 1856. VIII. 772. Naturforscher (Kais. Leop. Car. Akademie der). Demidoff'sche Preisausschreibung. VIII. 779. — „Nova Acta". V. 209. — Subvention (jährliche) von Seiner k. k. Apostolischen Majestät bewilligt. IV. *V.* 156. Naturforscher-Versammlung zu Gotha. Mineralogische Section. III. a. 152. — (32.) zu Wien. VIII. 789, 799; X. *V.* 91. Naumann (C. F.). Granulit in Sachsen. VII. 766, 834 Nechay v. Felseis (J.). Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. IV. 638; IX. *V.* 54. Nees v. Esenbeck. Geschenk der „Nova Acta Nat. Cur." an die k. k. geologische Reichsanstalt. V. 209. Nendtvich (Prof.). Bergtheer von Peklenicza. VII. 742 Anmerk. 743, 744, 745, 746. — Steinkohlen-Pflanzen von Vassas. I. 356. — — von Steierdorf, Anal. I. 707. Nerée-Boubée, siehe „Boubée". Neubehler. Rhinoceros-Zähne von Hronitz. II. b. 161. Neugeboren (J. L.). Korallenstöcke von Ober-Lapugy. III. d. 125. — Tertiäre Petrefacte von Nemesey. III. c. 158; IV. 192. — Petrefacten-Sammlung. X. *V.* 57. Neumann (J. G.). Meteor-Eisen von Braunau. V. 866. Neumann (K. A. und J. G.). Fossiles Eisen von Chotzen. VIII. 351, 354. Neuwall (Mährische Braunkohlen-Werke der Herren A. und J.). IV. 45. Niederländische General-Commission für geologische Untersuchung des Landes. IV. 187. Niederrist. Raibl. I. 255. Niepce de St. Victor. Photographische Anwendung des salpetersauren Uran-Oxydes. IX. *V.* 47. Niuny (Fr.). Mangan-Erze aus dem Banat. VII. 609. Nocito (Dr. G.). Tertiäre Petrefacte von Girgenti. V. 218. Noeggerath (J.). Bituminöses Holz von Enskirchen. V. 198. — Erdbeben in Visp-Thale (Sommer 1856). VI. 876. — „Geognosie und Geologie". IX. *V.* 155. — Gerölle mit Geschiebe-Eindrücken in Conglomeraten. IV. 667, 849. — Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. V. 195, 643. — Kohlen-Eisenstein der Grafschaft Mark. III. c. 133. Novara-Expedition (Nachrichten von der). VIII. 368, 369, 372, 799; IX. 277. *V.* 11, 22, 26, 89, 102, 137; X. *V.* 3, 4, 50, 62, 75, 109, 136, 177, 178, 188. Nowicki (C. v.). Kupfererz-Aufschluss bei Eibenberg. X. 349, *V.* 89. — Metallisches Eisen und Schlacken von Wolfsmühle. IV. 647.

Oellacher (J.). Granit, Anal. I. 608. — Vorhauserit, Anal. VIII. 360. Oesterlein. Eisen-Bergbau bei Pitten. V. 515. Oeynhausen (v.). Gyps-Formation des Oder-Thales. IX. 143, 144, 148, 149. Offenbányer, k. k. Bergverwaltung. Schrift-Tellur für die k. k. geologische Reichsanstalt. II. a. 135. Oldham (Th.). Denkschriften der „Geological survey of India". VIII. 781, 782. Olexik (Dr.). Vergleichende barometrische Beobachtungen zu Brünn. VII. 302. Omboni. Trias der lombardischen Alpen. IX. 473. Orbigny (d'). Foraminiferen von Nussdorf, II. d. 108. Orbigny (A. d'). Ammonites variabilis. VIII. 145. — Nautilus semi-striatus. VIII. 144. Orsi (P.). Gründer des „Museo cittadino" zu Roveredo. VIII. 774 — Petrefacte von Roveredo. V. 216. Oszwald (L.). Gediegenes Kupfer von Réczk. I. 145. Otto (E. v.). Quader-Petrefacte. VIII. 157. Owen (D. D.). Blei-Gebiet am Lake Superior. VII. 796, 799. — Geologische Aufnahme von Nord-Amerika. IV. 841. Owen (Prof. R.). Säugethier-Fauna (fossile) von Australien. X. *V.* 177.

Pančič (Prof.). Petrefacte von Belgrad. V. 891; VIII. 157. Pander (Chr.). „Monographien fossiler Fische Russland's". X. *V.* 18, 19. Panfilli. Braunkohle von Judendorf. VII. 43, 45. Papen (Major). Höhenschichten-Karte von Europa. IX. *V.* 124, 134. Parolini (A.). Intermittirende Quelle von Oliero. IX. *V.* 65. Partsch (E.). Höhenmessungen an der tirolisch-bayerischen Grenze. IX. 309, 310, *V.* 56. Partsch (P.). Basalt von Fürstenfeld. VI. 270, 274, 280, 285, 294. — Bibliotheks-Katalog des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes. II. a. 157, d. 150. — Congerien-Schichten. II. d. 120. — Eocenes in Oesterreich. V. 897; IX. 106, 108, 113. — Nagyág. VIII. 93 Anmerk., 109 Anmerk., 714. — Nekrolog. VII. 815. Steinkohlen-Formationen des Oesterreichischen Kaiserstaates. II. c. 95. — Tertiäre Mollusken des Wiener Beckens (Werk über). I. 373; II. a. 150, d. 98, 150. Pasetti (S. R.). Erdbohrungen am rechten Ufer der Donau bei Wien. I. 361. Pasini. Venetianische Alpen (Petrefacte der). X. *V.* 91. — Venetianischen Gebietes (geognostische Karte des). I. 377. Patera (Ad.). Hauerit. I. 156. — Joachimsthaler Erze (Zugutebringung der reichen). V. 611; VI. 871. — Nickels (Analyse seines regulinischen). VI. 875. — Paterait. VII. 196. — Silber-Extraction auf nassem Wege. I. 573; II. a. 156, c. 52; III. b. 166. — Urangelb. IV. 427, 428. — Verdichtung der nutzbaren Röstungs-Producte. V. 430, 431. Pattloch (O.). Opalgesteine von Czerwenitza. VIII. 157, 158, 176. Paul (R.). Randgebirg des Wiener Beckens. X. 257. — Wiener Sandstein. X. *V.* 4. Peach (Ch.). Wollaston-Preis. X. *V.* 45. Pecchioli (Prof.). Einsendungen aus Toscana und Elba. V. 430. Pedro II., Kaiser von Brasilien (S. M. Dom). Correspondent der k. k. geologischen Reichsanstalt. IX. *V.* 80. Pelouze. Entstehung von Eisen-Oxyd auf nassem Wege. III. a. 180. Peratoner. Bohrungen am Ufer der Donau bei Wien. II. b. 191. Petényi (v.). Acerotherium incisivum. VIII. 327. Peters (Prof. C.). Anthracit-Gebilde der französisch-savoyischen Alpen. VI. 185. — Antilopen (Zähne von) aus der Braunkohle. V. 216. — Aptychen des österreichischen

Neocoms und obern Jura. V. 439, 440. — Ausser-Bleiberg. VI. 906. — Biharer Gebirg und Arader Comitat. IX. *V.* 87, 102, 119, 131. — Central-Alpen von Ober-Pinzgau. V. 766. — Deutsch-Bleiberg. VII. 67. — Gyps von Längenfeld. VII. 181. — Höhenbestimmungen in Kärnthen. VI. 567; VII. 675. — — im Pesther und Graner Comitate. IX. 164; X. 69. — Kärnthen. VI. 166, 508, 883, 907; VII. 629. — Kalk-Alpen des Salzburgischen Saale-Gebietes. IV. 862; V. 116. — Kalkstein- und Graphit-Lager von Schwarzbach. III. d. 145; IV. 126. — Kössener Schichten von St. Wolfgang. IV. 783. — Krain. IX. 345, 346. — Krystallinische Gesteine von Villach und Krems-Alpe. V. 885. — Krystallinische Schiefer im nordwestlichen Ober-Oesterreich. IV. 232. — Mittel-Ungarn. VIII. 787, 788, 796, 797, 802; X. 483, *V.* 57. — Ofen (Umgebung von). VIII. 308, 771, 778. — Pistacit-Schiefer. V. 831. — Pseudomorphose nach Steinsalz. IV. 102. — Reisen im Auftrage der k. k. geologischen Reichsanstalt. III. d. 73, 134; V. 255, 256, 879, 882; VI. 508, 883, 907; VII. 629. — Radstädter Tauern. V. 808. — Rhinoceros-Schädel von Szliácz. V. 887, — Riesenhirsch. VI. 198, 318. — Säugethiere aus den Sebensteiner Löss. V. 227, 527. — — (diluviale) von Brogyán. VI. 908. — — (tertiäre) von Monte Promina. VI. 184. — Salzburg. V. 255, 256. — Steinkohlen-Formation zwischen Salzburg, Steiermark und Kärnthen. VI. 416. — Stur's Ansichten über die Salzburgischen Central-Alpen (Kritik über). V. 444. — Süsswasser-Becken von Rein. IV. 433. — Tertiärer Sandstein von Perg. IV. 189. — Tertiäres von Flachau bis Wagrain. V. 206. — — und Diluvium in Mittel-Kärnthen. VI. 416. — Trachyt in Central-Ungarn. VIII. 778. — Trionyx aus dem Tegel. IV. 178. — Turracher Schiefer. IX. 202, 203. — Ungarn (geologische Studien aus). X. 483. — Pettko (Prof. J. v.). Honther Comitat. IX. *V.* 144. — Rhinoceros-Schädel von Szliács. V. 887. — Sandstein von Szallás und Eisenbach. I. 161. — Süsswasser-Quarz von Hlinik. I. 360. — Vulcanischer Krater im Hodritscher-Thal. I. 159. — Westliches Ungarn. IV. 433. Petzholdt. Predazzit. VIII. 164. Pfeiffinger (J. v.). Cement-Fabrik zu Eperies. VII. 757. Phöbus (Prof.). Mineralien für die k. k. geologische Reichsanstalt. IV. 836. Pichler (Prof. Ad.). „Beiträge zur Geognosie Tirol's". X. *V.* 45. — Gegend südlich vom Inn. IX. *V.* 120. — Innsbruck. IX. *V.* 100, 101, 131. — Kalk-Alpen (nordöstliche) in Tirol. VII. 717, 851; VIII. 786, 795, 802; X. 95, 99. — Pflanzen (fossile) des Conglomerates bei Innsbruck. VIII. 367, 780. Pichler (V.). Turrach und Anthracit der Stang-Alpe. IX. 185, *V.* 56. Pick (A. J.). „Ueber Sicherheit barometrischer Höhenmessungen". VI. 450, 878. Pictet (F. J.). Säugthiere (fossile) von Moosseedorf. VIII. 779. Piddington. Geologisches Museum zu Calcutta. VIII. 782. Pirč (M.). Tertiäre Pflanzen von Laak. VIII. 364; IX. *V.* 18. Pirona (Prof. J. A.). Gediegenes Quecksilber von Gagliano. VI. 811. Pischl. Petrefacte von Roveredo. V. 216. Pittoni (R. v.). Piauzit von Tüffer. VII. 91, 92, 95. Plattner. Entgoldung der Arsenik-Kiese. III. a. 202. Plener (Hofrath). Gründer des naturwissenschaftlichen Vereines zu Pressburg. VII. 364. Plücker (Prof.). Magnetismus der Krystalle. VIII. 672, 673. Plümike. Kohlenbau von Hrastnigg. II. c. 11. Pluskal (Dr.). Petrefacte von Lomnitzka. II. d. 152. Poggendorff (Prof.). Theorie des Magnetismus. VIII. 672. Pohl. Versteinte Holzstämme. VIII. 728. Pollak (S.). Bleiführender Letten, Anal. III. a. 163. — Braunkohlen, Anal. III. a. 158; IV. 150, 154, 634. — Eisensteine, Anal. IV. 398. — Erdarten, Anal. III. a. 155. — Eisenerze und Kohlenschiefer aus Böhmen, Anal. IX. 176. — Kalksteine und Dolomite, Anal. III. a. 163; IV. 401. — Mergel, Anal. IV. 400. — Porzellanerde, Anal. III. a. 161, 162. — Schieferthon, Anal. III. b. 157; IV. 398. — Schürfungen im nordöstlichen Böhmen. IX. 239, *V.* 57. — Spath-Eisenstein, Anal. III. a. 156, 157. — Nickelerze, Anal. IV. 400. Poppelak (J.). Nekrolog. X. *V.* 42. — Tertiäre Petrefacte von Feldsberg. IX. *V.* 67. — — — von Nikolsburg. I. 675; II. d. 111. — — — von Porstendorf. IV. 188. Porth (Em.). Böhmen (nordwestliches). VIII. 701, 788; IX. *V.* 17, 45. — Eisen-Lagerstätte von Auwal. VIII. 169. — Eruptive Gesteine im Rothliegenden des nordöstlichen Böhmens. IX. *V.* 45. — Knochenhöhle im Riesengebirg. VIII. 169. — Krystallinische Schiefer des Riesengebirges. IX. *V.* 17. — Kupfer von Swinitza. IX. *V.* 46. — Mineralien und Gebirgsarten aus dem Riesengebirg. IX. 174. — Nekrolog. IX. *V.* 79, 87, 137. — Quarz im Melaphyr. VII. 810. — Reise nach Klein-Asien. IX. *V.* 85. — Rochlitzer Erzvorkommen. IX. *V.* 91; X. 10. — Rothliegendes im böhmischen Riesengebirg. VIII. 180; IX. *V.* 37. Potiorek. Magnetische Beobachtungen (ältere) zu Bleiberg. I. 514. Prantner (R. St.). Höhenmessungen in Tirol. VI. 899. Prestel (M. A. F.). Krystallinische Structur des Meteor-Eisens. V. 866. Prettner (J.). Höhenbestimmungen in Kärnthen. VI. 143; VII. 346, 668. Prévost (Const.). Wiener Tertiär-Becken. II. d. 96. Přibramer (k. k. Berg-Oberamt). Ergebnisse des dortigen Hauptwerkes von 1750 bis 1849. I. 310. — Magnetische Beobachtungen. I. 502. Přibramer (k. k. Montan-Lehranstalt. Jahrbuch. X. *V.* 135. Prinzinger (G.). Bunter Sandstein und Grauwacke südlich von Tännen- und Dachstein-Gebirg. III. d. 144. — Haller Salzberg. VI. 328, 411. — Hierlatz-Schichten unter Isocardien-Kalk. III. d. 95. — Jura-Kalk in Nieder-Oesterreich. II. d. 166, 167. — Kreide in Ober-Oesterreich, Salzburg und Steiermark. IV. 431. — Petrefacte aus dem Salzburgischen. II. a. 25, b. 170.

— Reisen im Auftrage der k. k. geologischen Reichsanstalt. II. b. 194; III. a. 101; VIII. 795. — Salzburg (geologische Karte von). IV. 176. — Salzkammergut. IV. 431. — Schiefer-Gebirg im südlichen Salzburg. I. 602. — Tirol. VIII. 795. — Viertel unter dem Mannhards-Berg. III. d. 17. Proell (Dr. G.). Gasteiner Fürstenquelle. III. a. 197. Pusch (G. G.). „Geognostisch-bergmännische Wanderungen". IV. 180. — Gyps in Galizien und Polen. IX. 146, 149, 150.

Quenstedt (Prof.). Ammonites angulatus. II. c. 21. — „Handbuch der Mineralogie." VIII. 168. — „Jura." VIII. 168. — „Sonst und Jetzt." VIII. 168.

Ragazzoni. Geologie der Lombardie. X. *V.* 192. — Lias-Kalk von Brescia IX. 479, 480. — Nummuliten-Kalk von Brescia und am Garda-See. IX. 496, 497. Ragsky (Prof. Frz.). Anthracit, Anal. V. 225. — Arsenikkies, Anal. IV. 823. — Braunkohlen, Anal. II. c. 165; III. a. 156, 166; IV. 150, 154, 828; V. 191, 641. — Eisenerze, Anal. III. d. 116, 117; V. 641. — Eisen-Oxyds (Entstehung des) auf nassem Weg. III. a. 180. — Eisenprobe (colorimetrische). III. d. 146. — Eliasit, Anal. III. d. 124. — Erdarten, Anal. III. c. 135. — Gas aus dem Hercules-Bad bei Petersdorf, Anal. IV. 630. — Graphit, Anal. III. b. 157; IV. 829, 634; V. 192, 201. — Gypserde, Anal. IV. 632. — Hercules-Bäder im Banat. II. b. 93. — Hydraulischer Kalk, Anal. II. d. 155; V. 192. — — Thonmergel, Anal. III. d. 101. — Ivandaer Mineralquelle, Anal. IV. 700. — Kalk (gebrannter), Anal. V. 642. — Kalksteine, Anal. III. c. 155. — Kohlen-Eisenstein, Anal. IV. 152. — Kupfer-Fahlerz, Anal. III. c. 156. — Kupferschliche, Probe. V. 641. — Lignit, Probe. V. 192. — Marienbader Mineralmoor, Anal. IV. 401. — Mergel, Anal. V. 191, 192. — Mehadiaer Mineralquellen. II. a. 151. — Nickels (Gewinnung des) am Nöckelberg. V. 437. 438. — Polirerde, Anal. IV. 829, 830. — Runkelrüben, Anal. III. a. 164, d. 151. — Salpeter-Proben. II. b. 166, 186. — — Kehrstaub, Anal. III. a. 164. — Salzsäure (Aufschliessung von Mineralien durch) bei erhöhtem Druck und Temperatur. IV. 186. — Schwefel-Antimons (Textur des). IV. 429. — Schwefelsorten, Anal. V. 191. — Sphärosiderit, Anal. IV. 631, 632. — Spodium, Anal. IV. 398. — Steinkohlen, Proben. III. a. 165, 166; IV. 401. — Talkschiefer (verwitterter), Anal. V. 642. — Thon (feuerfester), Anal. V. 641. — Torf, Probe. III. a. 165, 166. — Uran-Pecherz, Probe. III. c. 156. — Viehsalz, Anal. II. d. 141; III. d. 116, 117; V. 640. Rammelsberg (Prof.). Augit (zersetzter), Anal. V. 87. Ramsauer (G.). Alterthümer und Gebeine aus den Gräbern bei Hallstatt. I. 352, 533. — Ammoniten von Hallstatt. II. b. 149. — Erwerbung seiner Sammlung für die k. k. geologische Reichsanstalt. II. b. 148. — Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. III. a. 184, d. 121. — Salzbergbau-Modelle. II. b. 177. — Stollen-Ausmauerung. III. d. 134. Rant. Geologie und Bergbau von Borneo. IX. 289. Rath (Dir.). Banater Petrefacte. VII. 844. Rath (Frz.). Erdbohrungen im ungarischen Tieflande. X. *V.* 109. Raufer (G.). Piauzit von Tüffer. VII. 91, 607. Ravenstein (A.). Papen'sche Höhenschichten-Karte von Europa. IX. *V.* 123, 124. Rawson (Hon. W. R.). Druckschriften vom Cap. IX. *V.* 23. Reden (Freih.). Ehrengedächtniss. VIII. 811; IX. *V.* 136. — Statistik der österreichischen Bergwerks-Production. VII. 846. — Stein- und Braunkohlen-Karte von Deutschland. VIII. 168, 169. Reich. Magnetische Polarität des Pöhl-Berges. VIII. 665, 666. Reichenau (k. k. Ober-Verwesamt). Einsendungen an die k. k. geol. Reichsanstalt. II. b. 148. Reichenbach (K. Freih.). „Geologische Mittheilungen aus Mähren" deren Berichtigung. V. 661, 670, 690, 707, 744. — Metallisches Blei in Basalt. X. *V.* 53. Reichenbach (R. Freih.). Eisenerze, Roheisen und Braunkohlen, Anal. VIII. 151, 615, 757; IX. 174, 504. — Paraffin und Essigsäure als Holzessig. III. b. 36. — Salpeter-Erzeugung. I. 316. Reichenstein (Müller v.). Bergbau von Nagyág. VIII. 131. Reinbold (Dr. Ign.). Geschichte des Nagyáger Bergbaues. VIII. 128. Reissacher (R.). Quellenstollen in Wildbad-Gastein. VII. 307, 608. — Seilverbindung bei einem 750 Klafter langen Aufzuge. III. d. 132, 133. Reissek (S.). Kieselnadeln in den rothen Thonen des Dachstein-Gebirges. V. 198, 439. — Untersuchung eines veränderten Hammerstockes. V. 197. Reitz (Fr.). Mineralien aus dem Banat. VII. 611. Renard (Dr.). Semisäcular-Feier der kais. Gesellschaft der Naturforscher zu Moskau. VII. 182. Renevier. Petrefacte der Lombardie. IX. 481, 482, 483, 487. Retzius (Prof.). Bos Urus von Moosseedorf. VIII. 779. Reuss (Prof.). Egeran-Schiefer. VII. 519. — Eger und Asch (Geologie des Gebietes von). VII. 493, 527, 533; VIII. 466. — Foraminiferen des Lemberger Bernstein-Sandes. II. a. 163. — — u. s. w. aus Mittel-Steiermark. VI. 193, 351; VII. 588. — Franzensbad und Eger. I. 685. — Glimmerschiefer des Gebietes von Eger. VIII. 15. — Gosau-Gasteropoden. IV. 111, 394. — Gosau-Petrefacte. II. a. 160; d. 166, 169. — Gosau-Thal. II. d. 52. — Krebse der Raibler Schichten. IX. *V.* 75. — Kreidegebilde in Mähren. X. 230, 231. — Kupfergehalt des böhmischen Rothliegenden. III. b. 96. — Mährens (Beiträge zur geologischen Kenntniss). V. 659; VII. 840. — Malakolith von Rochlitz. X. 11, 12. — Petrefacte von Rokitzan. VII. 355. — Umgewandelter Bernstein. VII. 495 Anmerk. Reuss (W.). Eisensteine von Rudolphsthal. VI. 406. Reutter (K.). Mineralien von Přibram. II. d. 135. Richter (J.). Augit-Krystalle von Schima. III. c. 157. Richthofen (Freih. v.). Beregszászer Gebirg. IX. *V.* 117. — Edle Erz-Lagersfätten im ungarischen Trachyt. X. *V.* 71. — Eruptives, Miocenes und

Diluvium im Nordost-Ungarn. X. 436. — Eruptiver Gang in Steinkohle. VIII. 162. — Hermannstadt. X. *V.* 88. — Höhenmessungen im Lech-Thal und in Vorarlberg. X. 67. — Kieselsäure im Trachyt-Porphyr. X. *V.* 47. — Kreidegebilde in Vorarlberg. VIII. 809. — Kronstadt. X. *V.* 105, 106. — Melaphyr. VIII. 798, 799. — Oestliches Siebenbürgen. X. *V.* 180. — Quarz-Porphyr von Süd-Tirol. IX. *V.* 7. — Porphyre in Ungarn. X. *V.* 36. — Süd-Tirol. VII. 841; VIII. 777. — Syenit in Süd-Tirol. VIII. 164. — Trachyt-Gebirg zwischen Eperies und Tokai. IX. *V.* 84. — — der Hargitta. X. *V.* 133, 134. — Trachyt und Vulcanisches von Telki-Bánya. IX. *V.* 98, 150. — Trias und Lias in Vorarlberg. VIII. 796. — Ungarn (nordöstliches). X. *V.* 116, 130, 134; X. 436. — Vorarlberg. VIII. 787; X. 72. — Vorarlberg und Nord-Tirol (Kalk-Alpen in). X. 72. Riedl (Em.). Pristova-Thal. VIII. 288. Riedwald (M. v.). „Allgemeine Zeitung für Wissenschaft." X. *V.* 81. Riegel (A.). Fünfkirchner Steinkohlen-Pflanzen. VIII. 803. — Gurney'sches Löschverfahren. III. d. 143. Rieger (J.). Einsendungen von Grossau. II. b. 155. Rittinger (P.). Bergbau von Vöröspatak. II. d. 83. — Bewegung des Wassers in Canälen. II. b. 179. — Mönchkolben-Pumpe (einachsige). I. 93. — Kind's Erdbohr-Arbeiten. I. 746. — Technische Erfahrungen der k. k. Berg- und Hüttenbeamten aus dem Jahre 1851. III. d. 131. Rittler (Jul.). Hatchettin von Rossitz. V. 898. Rivot und Duchanoy. Berg- und hüttenmännische Notizen aus den ungarischen und banater Bergbau-Bezirken. IV. 568, 785. Robert (J.). Cephalopoden von Adneth. VIII. 156, 763. — Mangan-Erze von Weitenstein. VIII. 763. Robiati (A.). Geologische Gesellschaft in Mailand. IX. *V.* 153. — Geologische Lehrbücher für dessen Erziehungs-Anstalt. VI. 170. Römer (H.). Geologische Karte von Hannover. IX. A. 40, 41. Rösler (G.). Nekrolog. VIII. 158. Roeszner (Jos.). Silber-Extraction zu Tajova. II. a. 111. Roithberg (Jos. v.). Continuirliche Salzberg-Auswässerung. I. 412. Rolle (Dr. Fr.). Braunkohlen- und Schotter-Gebilde in Ober-Steiermark. VII. 39. — Höhenmessungen in Ober-Steiermark. VII. 169, 706. — Hypsometrische Karte von Ober-Steiermark. VI. 194. — Judenburger Kreis. IV. 848. — Kalke und Dolomite des Drann-Thales. X. 210. — Kössener Schichten. X. 107. — Mittel-Steiermark. VI. 170; VII. 219. — Ober-Steiermark (südwestliches). V. 322. — Ostracoden, Foraminiferen und Bryozoen (tertiäre) aus Ober-Steiermark. VI. 193, 194, 351. — Sand und Tegel (meerischer) von St. Florian. VII. 192. — Sandstein und Schiefer von Kainach. V. 885. — Stang-Alpe. IX. 222, 226. — Süd-Steiermark. VIII. 266, 403, 788. — Tertiäres (kohlenführendes) von Rinegg. V. 202. — — und Diluvium in Mittel-Steiermark. VII. 535. — Tertiär-Petrefacte von Csurgo. VIII. 185. Rollmann (Dr. W.). Optische Untersuchungen an Belemniten. VII. 830. Rose (Prof. G.). Classification der Trachyte. VIII. 368, 369. — Geologische Forschungen in Böhmen. VII. 816. — Glimmer vom Vesuv. V. 865. — Klinochlor. V. 855, 860, 861. — Nachricht über L. v. Buch's Ableben. IV. 189. — Trachyt von Nagyág. VIII. 723, 724. Rosenauer. Erbauer des fürstl. Schwarzenberg'schen Holzschwemm-Canales. V. 627. Rossiwall (Jos.). „Die Eisen-Industrie des Herzogthums Krain im Jahre 1855." VIII. 773. — Kohlenflötze im Murthale (Fohnsdorf). IV. 172. — Mineralien von Eibiswald. I. 358. — Pflanzen der Fohnsdorfer Braunkohle. IV. 176, 177. — Reisen im Auftrage der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 628; II. a. 143. — Schwefel-Arsenik in der Fohnsdorfer Braunkohle. IV. 109. — Rosthorn (Frz. v.). Ammoniten-Schiefer in Kärnthen. V. 213. — Amphibol-Gneiss des Velber-Tauern. V. 784. — Kreideschichten in Kärnthen. VI. 188. — Krystallinische Gesteine der Salzburger Central-Alpen. V. 769, 824. — Mineralogie und Geognosie von Kärnthen. VII. 333, 335, 342. — Petrefacte von Kappel. IX. *V.* 59. — Salzburger Alpenspitzen und Tauern. V. 767 Anmerk. — Sammlungen (geologisch-paläontologische). VI. 743. Rothkirch (K. Graf). Correspondent der k. k. geologischen Reichsanstalt. X. *V.* 110. — Rothschild (Freih.). Asphalt- und Cement-Fabrik zu Giudecca. VII. 756, 760. — Royal Institution of Great-Britain. Sitzungsberichte und Jahrbuch. X. *V.* 92. Rudolf (J.). Pläne der Höhlen des Karstes. III. d. 127. Rudolff (Bergrath). Bergöl von Starosol. VI. 652. Russegger (Jos. v.). Fische (lebende) aus dem Schemnitzer Erbstollen. II. b. 181. — Holz (fossiles) der ägyptischen Wüste. VIII. 729. — Magnetische Beobachtungen zu Wieliczka. I. 495, 496. — Pflanzen (fossile) von Heiligenkreuz. III. d. 127. — Werner-Säcularfeier zu Schemnitz. II. d. 35.

Sabine (General). Magnetische Apparate für die Novara-Expedition. VIII. 175. St. Julien (Graf). Lignit-Bergbaue im Hausruck-Walde. VII. 174. Salm-Horstmar (Fürst). Phytochemische Versuche. I. 138. Salm-Reifferscheid (Hugo Fürst). Höhlenbär von Slaup. I. 364, 611; II. b. 108, 159. — Präsident der Wiener k. k. geographischen Gesellschaft. IX. *V.* 142. — Slauper Höhle (Durchforschung der). II. a. 137, 146. Salm (E. Altgraf). Faserquarz von Blansko. III. d. 124. Salzburg (k. k. Bergwerks-Direction zu). Magnetische Beobachtungen. I. 487. Sandberger (Frid.). Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. IV. 159, 167, 647, 837. — Karminspath. IV. 167. — Marmor im Herzogthum Nassau. IV. 58. — Schwerspath (himmelblauer) von Naurod. III. d. 26. — Tertiär-Beckens von Mainz (Monographie des). VIII. 370. Sandberger (G. und Frid.).

Versteinerungen des Rheinischen Schichtensystems in Nassau. VII. 386. Sapetza (Jos.). Eisenerze von Lokenhaus. IX. V. 149. — Pflanzen (fossile) von Oedenburg IX. V. 148. Savi (Prof.). Geologische Gliederung von Toscana. IV. 782. — Verrucano. IX. 456, 457. Schabus (J.). Kalomel-Krystalle (künstliche). III. c. 148. — Lehrbuch der Mineralogie. IX. V. 136. — Rittingerits (Krystallgestalt des). III. d. 121. Schafhäutl (Prof.). Geognostische Karte der tiroler und bayerischen Alpen. II. a. 138, d. 162. Scarabelli (Prof.). Tertiäre Mollusken von Imola. IV. 181. Schaumburg-Lippe (Fürstin von). Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. VIII. 811. — (J. W. Fürst zu). Fossiler Stamm einer Araucaria. IX. 299, V. 64, 80, 136. — — Correspondent der k. k. geologischen Reichsanstalt. IX. V. 80. — (Prinz Wilhelm zu). Besuch der k. k. geologischen Reichsanstalt IX. V. 125, 126, 140. Scheda (Major). General-Karte des Oesterreichischen Kaiserstaates. VI. 870; VIII. 783. Scheerer (Prof.). Insel Nässundholm. IV. 884. — Skandinavische Mineralien. VI. 856, 884. Schefczik (A.). Bewegung schwimmender Krystalle einiger organischer Säuren. VI. 263. — Fette Oele auf der Oberfläche der Flüsse. VII. 95. — Magnete (abgeänderte Construction temporärer). VIII. 292. Schemnitz (k. k. Berg-Direction zu). Anthracit vom Theresia-Gang. IV. 163. — (k. k. Berg-Akademie zu). Jahrbuch. X. V. 135. Schenzl (P. G.). Bleispeise von Oeblarn, Anal. I. 343. Scherzer (Dr. K.). Kupfer- und Eisen-District am Lake Superior. IV. 407. — Novara-Museum (Vorschlag zu einem). VIII. 799. — Rückkehr. X. V. 109. — Schreiben vom Cap. IX. V. 11. — — von Java. IX. V. 102, 103. — — über die Inseln St. Paul und Amsterdam. IX. V. 26. — — von Neuseeland. X V. 50. — — von Singapore. IX. V. 89. — Sendungen aus Nord-Amerika. IV. 162, 406. — Tahiti (geologische Notiz über). X. V. 188. Scheuchenstuel (K. v.). Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. II. b. 156; VI 408. Schimper (W. P.). Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. II. b. 144. Schlagintweit (Ad.). Höhenmessungen um den Grossglockner. I. 125. — Isogeothermen der Alpen. I. 287, 301. — Petrefacte aus den bayer. Alpen. IV. 646. — Thalbildung und Gebirgszüge der Alpen. II. b. 33. Schlagintweit (Herm.). Regenverhältnisse der Alpen. I. 280. Schlagintweit (Ad. und H.). Werk über die Alpen. V. 888. — Reisen in dem nördlichen Tibet. VIII. 775. Schlehan (G.). Asphalt und Steinkohlen in Dalmatien. II. d. 137. — Dalmatinische Pstrefacte. IV. 419, 646; VI. 184, 651, 652. Schleiden (Prof.). Verkieseltes Holz. VIII. 729, 733. Schleiermacher (M. K.). Magnetisch-polare Gesteine. VIII. 763, 806. Schlosser (Jos.). Croatischen Küstenlandes (Bereisung des). IV. 177. Schmidburg (K. Freih.). Werk über vergleichende Terrainlehre. VII. 172. Schmidl (Dr. Ad.). Höhlen des Karstgebirges. I. 701, 747; III. d. 127. — Höhlenbär aus Krain. IV. 843. — Recca-Flusses (unterirdischer Lauf des). II. b. 184. Schmidt (F. E.). Fossile Hölzer. VIII. 729. Schmid (Ingenieur). Gediegen Eisen von Chotzen. VIII. 352, 353. Schmidt (Jul.). Erloschene Vulcane Mährens. IX. 1, V. 32, 33. — Erdbeben vom 5. Jänner 1858. IX. V. 29. — Höhenmessungen in Mähren und Schlesien. X. 253. Scholl (Freih.). Höhle bei Brunn am Steinfeld. VI. 872. Schouppe (Ant. v.). Eisenerzer Erzberg. V. 396. Schrimpfe (G.). Kalkspath von Boleschin. VI. 161. Schröckinger v. Neudenberg (Jul. R.). Geschenke an der k. k. geologischen Reichsanstalt. IX. V. 54, 64, 105. Schrötter (Prof.). Dopplerit, Anal. I. 305. — Fossile Brennstoffe Oesterreichs. I. 367, 611; II. b. 108. — Gediegen Eisen von Newcastle. III. a. 173. — Mineral-Industrie in England. III. a. 172. — Steinkohle von Grünbach, Anal. II. a. 144. — — von Gloggnitz, Anal. V. 521. — Versammlung (32.) deutscher Naturforscher und Aerzte zu Wien. X. V. 91. — Wolkensteiner Quelle, Anal. I. 57. Schroll (B.). Wald (versteinerter) von Radowenz. VII. 726. Schübler (G.). Versuche in Bohrlöchern des Steinsalz-Gebirges. VII. 830. Schur (Dr.). Schwefel- und Alaun-Erde am Büdös. V. 217. Schuster. Granit von Karlsbad. VI. 90, 92, 93. Schwab (Alex. v.). Sendungen an die k. k. geologische Reichsanstalt. IV. 646; VIII. 763, 764. Schwabenau (R. v.). Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. IX. 175, V. 55. Schwarzer (Ign.). Eisensteine von Sternberg. I. 355. Schwarzenberg (Adolf Fürst). Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe zu Prag. VIII. 772. Schwind (Frz. v.). Kurbel- und Gatterführung bei Sägmühlen. III. d. 133. — Wasserrad von 36 Fuss Durchmesser. III. d. 132. Sedgwick. Meeres-Conchylien von Radkersburg. VI. 297. — Geologische Wahrnehmungen in Steiermark. VII. 219, 537 Anmerk., 539, 562, 575, 576, 582, 586, 594. Sedlaczek (Jos.). Hand-Mikroskop mit Flüssigkeits-Linse. VI. 97. Seebach (R. v.). Trias-Petrefacte von Weimar. IX. 158, V. 17. Seeland (F.). Braunkohlen und fossile Pflanzen von Leoben. I. 739. — Braun- und Steinkohlen Oesterreichs. I. 609. — Kohlengebirg von Hrastnigg. II. c. 11. — Skorodit von Lölling. IX. V. 155. — Steierdorfer Kohlen-Formation und deren Flora. III. a. 187. — Tertiäre Mollusken von Radoboj. II. a. 141. Seelos (G.). Panorama des Rittner Hornes. IX. V. 15. Sénarmont (de). Glimmer vom Vesuv. V. 863, 864. — Glimmers (Krystallographie des). VI. 410. Sendtner (Prof. O.). Isogeothermen der Alpen. I. 301. Senft (Prof. F.). „Classification und Beschreibung der Gebirgsarten." VIII. 797. — Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. VII. 811. Senoner (Ad.). Ehren-Medaille

(Betheilung mit einer). VII. 363; VIII. 160. — Höhenbestimmungen (Zusammenstellung der) aus den Kronländern des österreichischen Kaiserstaates. I. 523; II. a. 59, b. 133, c. 63, 78; III. a. 41, 62, b. 115, c. 67; IV. 120, 534; V. 586. — Museum Villa zu Mailand. VII. 763. — Petrefacte aus den südlichen Alpen. V. 216. — Uebersicht der Analysen im Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt. X. Heft III, Anhang. Seybolt. Kohlengebilde bei Klein-Semmering. V. 559. Shanghai-Gesellschaft (Schriften der). X. *V.* 2. Shaw (J.). Bleihandel mit den Indianern am Lake Superior. VII. 798. Simony (Prof. Fr.). Erratisches Diluvium im Salzkammergute. II. a. 153. — Geographische Gesellschaft zu Berlin. III. a. 181. — — — zu Wien, Vorschlag zu deren Gründung. III. a. 182. — Gletscherspuren am Radstädter Tauern. VII. 48. — Johanns-Hütte auf der Dorfer Alpe. IX. *V.* 53. — Kalkgesteines (Oberflächen-Veränderung des). II. a. 164. — Luft-Temperatur im Salzkammergute. II. b. 148. — Panorama vom Schafberg. I. 374. — Petrefacte von Hallstatt. III. a. 184. — Reisen im Auftrag der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 176, 651, 749. — Schichtungsverhältnisse im Salzkammergute. I. 748. — Seen des Salzkammergutes. II. b. 170. — Tertiäre Petrefacte von Ottnang und Wolfsegg. IV. 190. — Urgebirgs-Geschiebe auf dem Dachstein. II. b. 159, 160. Sismonda (A.). Gliederung der Alpen von Piemont. IV. 781. Skribanek (FML. v.). Ingenieur-Geographen-Corps. II. b. 163. — Karten des Oesterreichischen Kaiserstaates. II. b. 162. Smithsonian Institution. Entstehung. IV. 842. — — Sendungen an die k. k. geologischen Reichsanstalt. IV. 842; VI. 903; IX. *V.* 145. — — Verwaltungs-Berichte. VIII. 782. Smyth (Admiral W. H.). Schreiben an Haidinger. VII. 830. Smyth (Piazzi). Astronomische Beobachtungen auf Teneriffa. VII. 829. Smyth (W. Warr.). Besuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. IX. *V.* 80. Société Linnéenne de Normandie. Abhandlungen. IV. 842. Sonklar v. Instätten (Major). Besteigung des Gross-Glockners. VI. 815 Anmerk. Sowerby (J.). Tertiäre Mollusken des Gleinz-Thales. VII. 576. Spécs (Prof.). Eger-Salz, Anal. VIII. 488 Anmerk. Spinelli (J.). Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. IX. *V.* 134. Spiske (K.). Fohnsdorfer Kohlenschiefer. VII. 40. Sprung (Prof. Frz.). Altrömisches Eisenwerk in der Wochein. I. 200, 209. — Eisenspath des Jauerburger Schiefers. VII. 369, 658. — Kohlengebilde von Eibiswald. I. 359. — — von Voitsberg. VII. 554, 557. Squier. Alterthümer am Lake Superior. VII. 783. Stache (Dr. G.). Castua und Klana. IX. *V.* 112. — Eocenes in Inner-Krain und Istrien. X. 272. — Fiume. X. *V.* 119. — Höhenmessungen im Unter-Krain. X. 53. — Kohlen in Krain und im Illyrischen Küstenlande. X. *V.* 49. — Krain (geologische Aufnahmen in). VIII. 785, 794, 801, 812; IX. 258, *V.* 6. — Krantz (Einsendungen des Dr.) an die k. k. geologische Reichsanstalt. VIII. 182. — Kreidegebilde von Gottschee und Möttling. IX. *V.* 69. — Küstenland (Istrianer). IX. *V.* 81, 82, 193; X. *V.* 6, 117, 197. — Neogenes von Unter-Krain. IX. 366, *V.* 8. — Nummuliten-Gebilde in Istrien. X. *V.* 9. — Petrefacte der böhmischen und sächsischen Kreide. VIII. 810, 811. — Quarnerische Inseln. X. *V.* 85, 99, 193. — San Stefano. X. *V.* 38. — Tschitscher Boden. IX. *V.* 93. Stamm (Dr.). Illustrirte technische Wochenschrift. VIII. 803. — Versammlung der österreichischen Berg- und Hüttenmänner. IX. *V.* 46. Staring (W. C. G.). Geologie der Niederlande. VIII. 773, 798. — Voltz's geologische Berichte über Surinam. VI. 867. Stephan (Erzherzog, kais. Hoheit). Besuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. IX. *V.* 125, 126, 140. — Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. IV. 168; VIII. 618, 789, 790. — Museum auf Schloss Schaumburg. VIII. 607. Sternberg (Kasp. Graf). Bergbau (alter) in Böhmen. V. 281, 301, 302; VIII. 32, 49, 56, 580. Stiehler (Fr.). Gebläse-Verlängerung. III. d. 133. Stockheim (Freih. v.). Geologische Karte und Petrefacte von Passau. II. b. 189. Stoppani (Prof. A.). Kritik über Fr. v. Hauer's Karte der Lombardie. X. *V.* 191. — Lias und Trias der lombardischen Alpen. IX. 137, 473, 475, 477. — „Studii geologici e paleontologici sulla Lombardia." IX. *V.* 31, 124. Stolz. Nachgelassene Manuscripte und Sammlungen, betreffend Mineralogie und Geologie von Teplitz. VII. 842. Strachwitz (M. Graf). Kohlen- und Eisenbaue bei Ritzing und Lokenhaus. IX. *V.* 149. Streffleur (V.). Nivellements von Deutsch-Altenburg bis Hainburg. III. d. 36 Anmerk. — Relief-Karte von Nieder-Oesterreich. VI. 190. Stressl (O. C.). Dinotherium (Reste von). VIII. 167. Strombeck (A. v.). Braunschweig (geologische Karte von). VIII. 167. — Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. II. a. 135. Strozzi (March. C.). Tertiäre Floren. IX. *V.* 135. Struve. Basaltische Hornblende, Anal. VI. 155. — Theorie der Bittersalz-Quellen. IX. 441. Stuckheil (A.). Tagkarte von Nagyág. VIII. 91, 94, 97, 132. Studer (B.). Geologische Karte der Schweiz. IV. 841. — Jung-Eocenes in Vorarlberg. VII. 36. — Kalk-Alpen (Schweizer und Savoyer). IV. 778. — Marmor von Arzo. IX. 481. — Molasse der Schweiz. VI. 442. — Thonschiefer der Lombardie. IX. 455. Stütz (Andr.). Bergbau am Sonnwendstein. V. 518. — Nagyáger Bergbau. VIII. 87, 95, 96, 721, 722. Stur (D.). Böhmen (nördliches). VIII. 775, 784, 792, 809. — Braun's Abhandlung über Kirchneria. V. 886. — Bunter Sandstein bei Lilienfeld und im Enns-Thale. II. a. 145; IV. 192. — Central-Alpen zwischen dem Hoch-Golling und Venediger. V. 818. — Cephalopoden von Enzesfeld. II. a. 165. — Cephalopoden-Kalk von Hörnstein.

II. c. 27. — Comelico und Carnia. VII. 178, 405, 431. — Enns-Thal. IV. 171, 177, 192, 435, 461. — Gross-Glockners (Besteigung des). V. 882, 883; VI. 814. — Höhenmessungen in den obersten Gebieten der Drau, der Piave und des Tagliamento. VII. 459. — — im Taborer Kreise. X. 37. — Hohenegger'sche Sammlungen. X. *V.* 86. — Isonzo-Thal. IX. 324. — Kalk und Dolomit der Nordwest-Karpathen. X. *V.* 46. — Kohlensäure-Quelle von Sz. Iván. X. *V.* 36. — Krain (nordwestliches). VIII. 171. — Kreidegebilde in Krain. IX. *V.* 71. — Lemberger und Przemisler Kreis. X. *V.* 104. — Lias-Kalk von Hirtenberg und Enzesfeld. II. c. 19. — Lienz und Carnia. VII. 405. — Liptau und Thurocz. IX. *V.* 129. — Lungau. V. 444, 818. — Mähren (westliches). IX. 18, 53. — Mariazell und Schwarzau. III. a. 184, 195. — Modern, Tirnau und Szered. IX. *V.* 82. — Neogen-Tertiär, Diluvial- und Alluvial-Ablagerungen im Nordost-Gebiete der Alpen (Karte der). VII. 383, 384. — Pflanzen (fossile) von Libowitz und Wottwowitz. X. *V.* 69, 194. — Pseudomorphosen nach Steinsalz. IV. 103. — Sandstein von Losoncz. IX. *V.* 93. — Taborer Kreis. VIII. 809; IX. 661; X. 37. — Tertiärer Sandstein mit Pflanzenresten bei Feistritz. VII. 687. — Tirol (Grenzgebirg zwischen Kärnthen und). VI. 167, 168, 524. — Triassischer Kalkschiefer der Konsica-Alpe. VII. 684. — Ungarn und Mähren (Grenzgebirg zwischen). IX. *V.* 94. — Vorwort zu Forbes's Denkschrift über die britische Fauna und Flora. IX. 575. — Waag-Thal. IX. *V.* 113; X. 27, 67, 68, 76. — Zolkiewer Kreis. X. *V.* 123, 127. Sturm (H.). Biharer Eisenstein, Anal. III. a. 32. Sturz (J. D.). Geologische Karte von Brasilien. V. 876. — Steinkohlen und fossile Brennstoffe (Tabellarische Darstellung der). VI. 196. Suckow (v.). Schall-Phänomen am Monte Tomatico. IV. 559. Suess (Prof. E.). Aptychen. X. *V.* 4, 5. — Argiope pusilla. VII. 687. — Brachiopoden (Systematik der). II. d. 156, 160; VII. 177. — — der Hierlatz-Schichten. III. b. 171, d. 93; VI. 177. — — der Kössener Schichten. III. a. 180; IV. 735. — — des nordöstlichen Ungarns. X. 415. — — von Pitulat. III. d. 129. — — der Starhemberg-Schichten und des Dachstein-Kalkes. IV. 731. — Colonien (silurische) in Böhmen. X. 481, *V.* 176. — Dachstein-Gebirges (Profil des). V. 196. — Davidson's Werk über Brachiopoden. VII. 386, 387. — Erratische Blöcke am östlichen Abhange des Rosalien-Gebirges. IX. *V.* 101. — Graptolithen. II. a. 164; III. a. 195, 198, b. 139. — Jura (oberer) bei Nikolsburg. III. d. 129. — Leitha-Kalkes (Alter des). X. *V.* 175. — Merista (neue Brachiopoden-Gattung). II. d. 150. — Oligocene Austernbank bei Melk. IX. *V.* 95. — Petrefacte aus den bayerischen Alpen. VII. 378, 379. — — des Haller Salzberges. VI. 349. — — von Kappel. IX. *V.* 59. — — der Kolimer Hügel. III. a. 167, 168. — — des Trias-Kalkes von Füred. VI. 652. — Quellenbildungen (alte) in den Hochalpen. V. 439. — Rhynchonellen-Schichten. IV. 733. — Säugthiere (fossile). IX. *V.* 87, 88, 121, 147, 158; X. *V.* 19, 51. — Spiriferen des alpinen Lias. III. d. 139. — Stramberger Schichten. IX. *V.* 57. — Tegelschichten von Hernals. III. b. 161. — Thecideen des österreichischen Lias. III. c. 157. — Trionyx aus dem Hernalser Tegel. IV. 178. — Vorarlberger Alpen und Hallstätter Salzberg. V. 881. — Wirbelthiere (fossile) in Oesterreich. X. *V.* 51. Suttner (J.). Tertiäre Mollusken von Grund. II. d. 112. Svanberg (L.). Anthracit-Roheisen, Anal. III. c. 9. Swallow (G. C.). Bericht über die geologische Aufnahme des Staates Missouri. VII. 822. Szabó (Prof. Jos.). Alluvium von Central-Ungarn. IV. *V.* 132. — Ofen (Umgebung von). VIII. 301, 314 Anmerk., 316, 319, 324. — Salpeter-Gewinnung in Ungarn. I. 324. — Süsswasser-Kalk von Alt-Ofen. VI. 416. — Trachyt und Tertiäres im Nordosten von Pesth. IX. *V.* 120.

Tanzer (Dr.). Mineralquelle zu Krapina-Teplitz. IX. 277. Tasche (G.). Magnetismus einfacher Mineralien und Gebirgsarten. VIII. 649, 807, 808. — Salzhausener Braunkohlen-Lager. X. 521, *V.* 108. Taylor (R. C.). Kohlen-Statistik. III. a. 104. Tchihatcheff (P. v.). Hippurit aus Klein-Asien. IV. 835. — Nachrichten aus Klein-Asien. IX. *V.* 89, 123. — Physische Geographie von Klein-Asien. IV. 840; V. 233; VII. 821. Theodori (Dr. C.). Plesiosaurus-Reste aus dem Lias von Banz. VI. 868. Ther (E. J.). Kupfererze von Böhmisch-Brod. VI. 408. Thiele (Prof.). Versuche über Natur-Selbstdruck. IV. 859. Thinnfeld (Minister Freih. v.). Beitritt zum Werner-Verein. II. d. 151. — Geologischen Reichs-Anstalt (a. u. Vortrag über Errichtung der k. k.). I. 1. — Steinsalz (violblaues) der k. k. geologischen Reichsanstalt geschenkt. II. b. 155. — Vöröspataker Bergbau. II. d. 64, 83. — Werner-Säcularfeier (Anordnung der). I. 560; II. d. 1. Thonhäuser (Bergrath). Schwarzkupfer-Amalgamation. III. a. 201. Thun (Minister Graf L.). Beitritt zum Werner-Verein. II. d. 151. — Besuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. VII. 819. Thurlie (Ph.). Entdecker der Eisenlager von Marquette (Nord-Amerika). VII. 778, Tiroler geognostisch-montanistischer Verein. Erläuterung zur Karte von Tirol. IV. 842. Tischbein. Achat-Mandeln. IX. *V.* 55. Tkaleez. Graphit und Kupferschliche, Anal. V. 641. Tomaschek (A.). Collio von Friaul. V. 226. Tomé (L.). Quecksilber-Grube von Vallalta. IX. *V.* 122. Torneycroft. Tyres-Fabrication. III. a. 200. Toscana (Grossherzog v. k. H.). Betheilung Senoner's mit einer Ehren-Denkmünze. VII. 363. Toulouser Akademie (Schriften der). X. *V.* 17. Trebra (F. W. H. v.). Magnetismus des Harzer Granites. VIII. 656, 806. Treutler (F.). Steinbruch-Karte des Freudenthaler Baubezirkes. V.

396. Trinker (Jos.). Gold-Lagerstätten von Heinzenberg und Kleinkogl. I. 213. — Gyps-Krystalle von Vallalta. IX. *V.* 122. — Erratische Blöcke im südwestlichen Tirol. II. b. 74. — Quecksilber-Bergbau von Vallalta. IX. 442, *V.* 122. — Seefelder Asphaltwerk. VII. 196. Troyon (Fr.). Säugthier-Reste von Moosseedorf. VIII. 779. Tschermak (G.). Analysen von Mineralien, Erzen und Gesteinen u. s. w. VIII. 615, 616, 617, 759, 760; IX. 295. — Basalt von Freudenthal und Hof. IX. *V.* 49. — Grünstein von Neutitschein. IX. *V.* 50. — Trachyt von Banow. IX. 63, *V.* 44. — Vulcane (erloschene) in Mähren. IX. 1, 16. Tschudi (v.). Dopplerit von Appenzell. I. 306. Tunner (Dir. P.). Dachschiefer von Turrach. IX. 228. — Eisenstein-Lagerstätten der alpinen Grauwacke. V. 383 Anm. — Erz-Lagerstätte zu Paak. VIII. 439. — Jahrbuch der k. k. montanistischen Lehranstalt zu Leoben. II. b. 171, 172; III. b. 162; IV. 194; VIII. 178. — Kieslager an der Zinkwand. IV. 465. — Neuberger Puddling-Stahl und Tyres. III. a. 201. — Pariser Ausstellung (Bericht über den montanistisch-metallurgischen Theil der). VII. 198, 364. — Pflanzenschiefer und Anthracit der Stang-Alpe. IX. 214. Tunner (Fr.). Schildkröte in der Leidinger Braunkohle. V. 524. Turiner Akademie der Wissenschaften. Denkschriften. III. d. 130, 131. Turner (Dr.). Hydrophan und Tabaschir. VIII. 176, 177. Turczmanovitz. Steinsalz (blaues) von Kalusz. V. 643.

Uhlmann (Dr.). Alterthümer im Torfe von Moosseedorf. VIII. 778. Ullmann (Fr.). Erzgänge von Hirschenstand. VIII. 53 Anmerk. Ungarischer geologischer Verein. Gründung und Thätigkeit. I. 378, 379. Ungarischer naturwissenschaftlicher Verein (k.). Ehren-Mitglieder. IX. *V.* 91. Unger (Dr.). Erhöhung des Bodens in historischer Zeit. VII. 602. — Mineralquelle von Hengsberg. VII. 566. Unger (Prof. Frz.). Chara Rollei. VII. 546 Anmerk. — Enns-Thales (Geologischer Durchschnitt des). I. 15, 16. — Flora des Basalt-Tuffes von Gleichenberg. VI. 287, 289. — — des Conglomerates bei Innsbruck. VIII. 367, 780. — — des Elbogen-Falkenauer Beckens. VIII. 494. — — der Molasse von Raune. I. 395, 396. — — (tertiäre) von Binowe. IX. 403. — — — von Feistritz. IX. 345. — — — von Sotzka. I. 175. — — — von Unter-Steiermark. X. 177, 215. — Früchte (fossile) von Stein. I. 393. — Gratz (Karte der Umgebung von). V. 530; VII. 223, 234, 236. — Höhlen in Steiermark. V. 555. — Kohlenpflanzen von Muthmannsdorf. I. 161. — — der Stang-Alpe. V. 366, 367. — Pflanzengeographische Arbeiten. I. 139, 140. — Quellen-Temperatur in den Tiroler-Alpen. I. 293. — Säugthiere (fossile) der Badelhöhle. V. 551 Anmerk. — Tertiäre Kohlenflora von Voitsberg. VII. 552. — Tobelbad bei Gratz. VII. 244. — Zirbelkiefer im Kalktuff. VII. 65, 66. Unkhrechtsberg (Ed. R.). Höhenbestimmungen in Mähren. IX. 1, 24. — Petrefacte von Olmütz. VIII. 367, 780. Urban (E.). Basalt im Schlesien. VI. 312. Urlinger (P.). Höhenmessungen um Gresten. VI. 880.

Vallach (G.). Kupfer-Wismuthglanz von Schlaggenwald. III. d. 125. — Verwerfung des Gellnauer Zinnganges. VII. 172. Van Breda (Prof.). Präsident der geologischen Commission der Niederlande. IV. 187. Varrentrapp. Klinochlor. V. 862. Venanzio (Fr.). Petrefacte aus dem Bergamaskischen. V. 216. Ventura (Dr. S.). Therme bei Trentschin. VIII. 798. Villa (A. und G.). Geologie der Brianza. VIII. 783. — Kreide-Petrefacte aus der Lombardie. VII. 607. — Naturhistorisches Museum zu Mailand. VII. 763. Vinke (v.). Karte von Klein-Asien. V. 435, 436. Visiani (Prof. R. de). Fossile Flora von Dalmatien. X. *V.* 109. Vogl (J. F.). Basalte und Wacken von Joachimsthal. VIII. 77 Anmerk. — Eliasit. III. d. 124. — Erzführung der Joachimsthaler Gänge. IV. 556. — „Gangverhältnisse und Mineralreichthum Joachimsthal's". VIII. 369. — Ganggebilde (secundäre) von Joachimsthal. VII. 837. — Lavendulan und Lindakerit von Joachimsthal. IV. 552. — Mineralien (neue) von Joachimsthal. IV. 220; VII. 195, 196. — Paterait. VII. 195, 196. — Rittingerit. III. d. 121. — Silberanbruch des Geisterganges zu Joachimsthal. V. 630. Volger (C.). „Borazites (Monographie des)". VI. 186. Voltz (Fr.). Doppelspath. IV. 167. Voltz (Dr.). Niederländisch-Guyana. VI. 867. Vorhauser (Joh.). Entdecker des Fleimser Gymnites. I. 607. — Pseudomorphosen aus Tirol. IV. 160. Vukotinović (L. v.). Kalniker Gebirg. IV. 550. — Küstenland (croatisches). IV. 177. — Moslaviner Gebirg. III. a. 171, b. 92, — Rudeer Eisenwerk. VI. 166. — Sauerquelle von Jamnitza. VII. 201. — Tertiäres um Agram. VI. 173. — Warasdin-Teplitz. III. d. 13.

Wade (Major). Zähigkeit verschiedener Eisensorten. VII. 780. Wagner (Prof.). Wissenschaftliche Lehranstalt zu Philadelphia. VII. 199, 200. Wala (Jos.). Eisenkiesel-Pisolith. VII. 606. Wallishauser'sche Buchhandlung. Geschenk an die k. k. geologische Reichsanstalt X. *V.* 136. Wallner (Leonh.). Magnetische Declination im Jahre 1569. I. 489. Walther. Greenokit von Kirlibaba. VI. 124. Walther (J.). Erze und Gebirgsarten von Joachimsthal. VI. 163. — Joachimsthaler und Pressnitzer Bergbaue. VIII. 569, 580. — Silberstufen (reiche) aus Joachimsthal. IV. 835; VII. 166. Waltl (Prof.). Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. IV. 837. Waniek (Major). Eisensteine und Kohlen in der Roman-Banater Militärgrenze. VII. 382. Warnsdorff (E. R. v.). Karlsbad, geologische Verhältnisse. VI. 88. Watson. Floren-Typen der Britischen Inseln. IX. 578, 579,

581. Wehrhan. Bleiglanz-Lagerstätte von St. Leonhard. X. 165. Weidmann (F. C.). Werner-Feier zu Reichenau. II. d. 18. Weinek. Ankerit vom Bacher-Gebirg. IV. 163. Weiss (B. V.). Eisenstein im Karpathen-Sandstein der Bukowina. VI. 131. Weiss (Chr. S.). Kreidepflanzen von Niederschöna. III. d. 125. — Nekrolog. VII. 815. Wenzelides. Petrefacten-Sammlung. II. d. 103, 110. Werdmüller v. Elgg (Ph. O.). Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. I. 163, 356; V. 519, 527. — Säugthiere (fossile) aus der tertiären Kohle von Leiding. V. 524. Werner (A. G.). Lebensabriss. II. d. 4. — Säcularfeier. I. 560; II. d. 1. Werner (Bas.). Blauspath im Geröll. V. 525. Werner-Verein. Gründung. II. a. 158, d. 151. — Leistungen, III. b. 167; IV. 1, 424; V. 217, 659; VI. 184; VII. 200, 201; VIII. 184; IX. *V.* 51. — Wertheim (Th.). Propylamin. II. a. 143. Wetherill (Ch. Al.). Kupfer- und Blei-Gebiet im nordwestlichen Theile der Vereinigten Staaten. VII. 771. Wibmer (Hanns). Magnetische Declination zu Ischl im Jahre 1685. I. 510. Widmann (Dr. H. v.). Erläuterungen zur geognostischen Karte von Tirol. IV. 842. Widtermann (V.). Frischerei am Schwallboden. IV. 498. — Gymnit von Fleims. IV. 525. Wiener Freunde der Naturwissenschaften. Publicationen. II. d. 170; III. d. 1. Wiener Akademie der Wissenschaften (kais.). Denkschriften. VII. 826. — Fossile Brennstoffe des österreichischen Kaiserstaates. I. 367, 609. — Magnetische Declinations-Beobachtungen. I. 472. Wilczek (H. Graf.). Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. IX. 508. Wilkes (Cap. Ch.). Wissenschaftliche Seereise. IX. *V.* 145. 146. Windakiewicz (E.). Torflager von Ronach. V. 791, 792. Wineberger (L.). Geognosie des Bayerischen und Neuburger Waldes. II. d. 144. Winkler (Dr.). Serpentin von Frankenstein. VIII. 682. Winkler (Jos.). Kalomel-Krystalle (künstliche). III. b. 168. — Quecksilber-Gewinnung aus Fahlerzen. III. c. 148. Winter (R.). Tragbarer elektrischer Reibungs-Apparat. VII. 828. Wisner. Goldeinlösung zu Vöröspatak. II. d. 80. Wissiak. Okergruben im Adlitz-Graben. VI. 880. Wodiczka. Flora (fossile) von Sagor. II. b. 185. — Geologie der Herrschaft Kutjewo. VI. 868. — Piauzit von Tüffer. VII. 91. Woldřich (Dr. J. H.). Wiener Sandstein. X. 262, *V.* 5. Wolf (H.). Beczwa-Gebiet. IV. *V.* 44. — Bikk-Gebirg. X. *V.* 70. — Braunkohlen in nordwestlichen Ungarn. X. *V.* 64. — Brunnengrabung bei Berchtoldsdorf. X. *V.* 31. — Central-Ungarn. IX. *V.* 95. — Diluvium am Garda-See. VIII. 161. — Eisenbahn-Einschnitte zwischen Wien und Linz. IX. *V.* 94, 95; X. *V.* 36, 37. — Höhenmessungen der k. k. geologischen Reichsanstalt im Jahre 1857. X. 29. — — in Kärnthen und Krain. VI. 567; VII. 89, 90, 675, 690; IX. 160. — — im nordwestlichen Böhmen. VIII. 510. — — in Ober-Oesterreich. VI. 842; VIII. 255, 265. — — in Ober-Steiermark. VII. 706. — — in Steiermark und Ungarn. IV. 528. — — in Tirol. X. 59. — — in Ungarn. IX. 160; X. 555, *V.* 78, 79. — — in den venetianischen Alpen. VIII. 249. — — im westlichen Mähren. VII. 298, 301. — Honther und Neograder Comitat. IX. *V.* 114, 129, 130. — Mineralquellen im Honther Comitate. IX. *V.* 152. — Muschelsand (mariner) bei Speising. X. *V.* 48. — Nivellements im Wiener Stadtgebiet. VIII. 171, 234. — Przemisler und Lemberger Kreis. X. *V.* 104. — Südliches Tirol. VIII. 777, 787. — Westliches Mähren. V. 883; VII. 183; IX. 18, *V.* 42. — Zolkiewer Kreis. X. *V.* 123. Wondraczek (J.). Kohlenschürfungen in Mähren. IV. 430. Wood (Searles). Jetzige und vorweltliche Meeres-Fauna der Britischen Inseln. IX. 600, 601. Woodward (P.). Betheilung mit dem Wollaston-Preise. VIII. 177. Wüllerstorf-Urbair (Freih.). Commandant der Novara-Expedition. VIII. 368. — Schreiben aus Singapore. IX. *V.* 89. Wurzbach v. Tannenberg (C.). „Bibliographisch-statistische Uebersicht der österreichischen Literatur im Jahre 1854“. VII. 183. Wyley (A.). Geologische Aufnahmen am Cap. IX. *V.* 24 Anmerk.

Zach (M. v.). Magnetischer Granit des Ilsensteines. VIII. 656. Zaddach (Dr. E.). Magnetische Polarität des Basalts und der Trachyte. VIII. 649, 661, 663, 665, 807. — Magnetische Polarität einfacher Mineralien. VIII. 677, 678. Zahlbruckner (J.). Pflanzen-Geographie Oesterreichs. I. 139. Zanolini (Dr. A.). Schwefellager von Rimini und Cesena. IX. *V.* 105. Zekeli (Fr.). Caprinen. V. 202, 203. — Cerithien, Inoceramen und Gasteropoden der Gosau-Schichten. II. a. 149, b. 168, d. 168. — Gasteropoden der Gosau-Formation. IV. 111, 394. — Gosau-Formation. III. b. 162. — Hippuriten. V. 199. — Omphalia, neue Gasteropoden-Gattung. III. a. 198. — Radioliten. V. 205. — Tertiäre Petrefacte aus Siebenbürgen. II. b. 173. Zelebor. Tertiäre Conchylien von Baden und Gauderndorf. II. d. 105, 113. Zeller. Mineralquellen von Windischgarsten. I. 745. Zeni (F.). Gründer des „Museo cittadino“ zu Roveredo. VIII. 774. Zepharovich (Prof. V. v.). Berdan'sche Quetsch- und Amalgamir-Maschine. V. 207. — Bergtheer und Braunkohle in Croatien. VII. 738; VIII. 161. — Besuch auf Schloss Schaumburg. VIII. 607. — Böhmen (Aufnahmen im südl.). V. 263, 264. — Bukowina (Ficker's und Alt's Reise in die). V. 219. — Collio von Friaul. V. 226. — Einsendungen an das Museum der k. k. geolog. Reichsanstalt. IV. 155, 402, 636, 832; V. 427. — Eisensteine und Kohlen der Roman-Banater Militärgrenze. VII. 382, 607. — Eliasit. III. d. 124. — Essigsauren Magnesia (Krystallform der). VI. 138. — Freiberger Gang-Formation. VI. 175. — Geolog. Institut der Niederlande. IV. 187. — Höhenmessungen im südl. Böhmen.

V. 317, 318; VI. 503; VII. 133, 163. — Hohle Geschiebe. VI. 652. — Jamnica. VII. 201. — Kalkspath und Bergholz von Boleschin. VI. 161. — Lippmann's Mineralien und Pseudomorphosen aus dem Erzgebirg. V. 433, 894; VI. 884, 885. — Lombardie (Schichtgebirge der). VII. 843; IX. 445, 475, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495. — Mastodon angustidens aus der Jauling. IV. 711. — Michaelsberger Bergbau. IV. 435. — Mineralien von Böhmisch-Eisenberg. X. 228. — Mineralien (Harzer und norwegische). VI. 165, 884. — Mineralien-Sammlung der Universität Krakau. X. *V.* 86. — „Mineralogische Topographie des Oesterreichischen Kaiserstaates." VI. 885; IX. *V.* 124. — Mineralvorkommen von Mutěnitz. IV. 695. — Pilsener Kreises (Beiträge zur Geologie des). V. 271; VI. 453. — Prachiner und Klattauer Kreis. VI. 172. — Přibramer Aufbereitungs- und Hütten-Arbeiten (Kleszczynski's Beschreibung der). VII. 171, 178. — Přibramer Erzrevier (Kleszczynski's Bericht über die). V. 884. — Professor an der Krakauer Universität (Ernennung zum). VIII. 184. — Schwerspath in den Karlsbader Quellen. IV. 864. — Silur-Formation von Klattau, Přestitz und Rožmital. VII. 99. — Sprengung mittels Reibungs-Elektricität. VII. 828. — Steinkohlen-Gebirg von Padochau. V. 226. — Strakonitzit. IV. 635, 699. — Tihány und Füred am Plattensee. VI. 652; VII. 196, 197. — Tunner's „Jahrbuch der Leobner montanistischen Lehranstalt". IV. 194. — Zinnober von Schemnitz. V. 223. Zerrenner (Dr. C.). „Metallurgische Gasfeuerung in Oesterreich." VII. 173. — Oláhpian (geognostische Verhältnisse von). IV. 484. — Petrefacte, der k. k. geologischen Reichsanstalt geschenkt. IV. 159; IX. 155, *V.* 55. — Pusch (nachgelassenes Werk von). IV. 180. — Süd-Slavonien (geognostisch-bergmännische Notizen über einen Theil von). IV. 493. — Temperaturen von Gewässern. IV. 492. — Torfmoor bei Laibach. VII. 200. Zeune (Prof.). Magnetisch-polarer Granit und Basalt. VIII. 657, 658. Zeuschner (Prof.). Karpathen-Sandsteines (Bindemittel des). VI. 42, 45. — Löss der Bieskiden und des Tatra. II. a. 76. — Obere Kreide von Krakau. I. 242. — Salzlager der Alpen und Karpathen. I. 234. — Schwefelflötz von Swoszowice. I. 351. Zichy (Edm. Graf). Veranlassung einer geologischen Untersuchung des Körös-Thales. III. a. 15. Ziervogel. Entsilberung des Kupfersteines. III. a. 201, 202. Zigno (Freih. A. de). Fische vom Monte Bolca. VI. 416. — Geschichtete Gebirge der venetianischen Alpen. I. 181, 377; IV. 780. — Oolith-Gebilde (ausser-europäische). VIII. 181. — Pflanzen (fossile) der venetianischen Alpen. III. b. 171; V. 886. — Werk über die Oolith-Flora. VI. 200; VIII. 185, 790, 791; X. *V.* 1. — — über die fossilen Nashörner in Italien. VI. 200. Zimmermann. Magnetisch-polarer Serpentin von Frankenstein. VIII. 659, 682. Zincken (G.). Marmor von Porto Venere. VIII. 184. Zippe (Prof.). Alunits (Krystallform des). III. d. 25. — Anthracit mit Kupferglanz. IX. *V.* 55. — Blauspath von Thernberg. V. 525. — Conglomerat von Woltusch. VII. 120. — „Geschichte der Metalle." VIII. 791. — Granitfels von Tabor. VIII. 784. — Orographische Scheidelinie zwischen Böhmerwald und Fichtelgebirg. VII. 516. — Rittingerit. III. d. 121. — Rothgiltigerz von Joachimsthal. II. d. 140. Zipser (Prof.). Geschenke an die k. k. geologische Reichsanstalt. IV. 835; IX. *V.* 122, 147. — Säugthier-Reste (fossile) von Theissholz. IX. *V.* 122, 147. Zois (Freih. S.). Säugthier-Reste im Krainer Bohnerz. VII. 688. Zollikofer (Th. v.). Diluvium am Garda-See. VIII. 161; IX. 496. — Drann-Thal in Steiermark. X. 200. — Lombardie, Geologisches. VII. 610, 830; IX. 493, 494. — Unter-Steiermark. X. 157, *V.* 13, 75.

II. Orts-Register.

Abaschin (Böhmen). Schiefergestein und Syenit. II. b. 10. Abauj-Tornaer Comitat (Ungarn). Geologischer Bau des östlichen Theiles. IX. *V.* 143; X. *V.* 20, 55, 57. Abbeville (Frankreich). Celtische Alterthümer im Diluvium. IV. 200. Abertham (Böhmen). Bergbau. VIII. 40. — Porphyr. VIII. 26. — Zinnseifen. VIII. 80. Achen-Thal (Salzburg). Erratische Gesteine. IX. 110. — Gestaltung. V. 797, 798. Achen-Thal (Tirol). Adnether Petrefacte. VIII. 733. — Geologischer Bau. VI. 333; VII. 730, 733, 736. — Kössener Petrefacte. VII. 731. Achmatowsk (Russland). Klinochlor. V. 851. Adamstadt (Böhmen). Erz-Lagerstätte. V. 107. Adamsthal (Mähren). Werner-Säcularfeier. II. d. 31. Adelsberg (Krain). Geologischer Bau. IX. 324, 327. — Kesselthal. X. 286. — Magdalena-Grotte. I. 704. — Magnetische Elemente. I. 227. Aden (Arabien). Geologische Beschaffenheit. III. a. 205. Adersbach (Böhmen). Versteinerter Wald. VIII. 725; IX. *V.* 1. Admont (Steiermark). Gyps. II. a. 30. — Höhenmessungen. II. a. 55. — Magnetische Elemente. I. 224. Adneth (Salzburg). Cephalopoden. II. b. 173, d. 136; VIII. 156, 763. — Madreporen-Marmor. VII. 752. — Marmorbrüche. II. a. 97. Adour-Becken. (Frankreich). Miocen-Ablagerung (untere). I. 589. Aflenz (Steiermark). Leitha-Kalk. VII. 592. — Magnetische Elemente. I. 223. Afrika (Fortschritte der Geographie von).

IV. 295. Afritz-Bach (Kärnthen). Hochgebirgs-Schotter. VI. 552. Agordo (Venetien). Petrefacte. I. 167, 168; VIII. 157. — Quecksilber-Bergbau. IX. 442. Agram. Berg-Commissariat. VIII. 391. — Magnetische Elemente. I. 232; III. c. 123. — Tertiäres. IV. 173. Agtelek (Ungarn). Höhle. VII. 704. Aigen bei Salzburg. Gosau-Pflanzen. IV. 108. Aix (Frankreich). Insecten-Schichten. III. a. 186. Alberndorf (Nieder-Oesterreich). Gneiss in Serpentin. III. c. 53. Alexandria (Aegypten). Magnetische Declination. I. 548. Algäu (Bayern). Mergelschichten. X. 109. Almas (Banat). Gneiss-Gebiet. VI. 223. Almas (Ungarn). Kalk-Terrassen im Löss. X. 512, 513. Aloysthal (Mähren). Eisenhaltiger Letten. X. 234. Alpago (Venetien). Petrefacte der Chlorit-Kreide. I. 190. Alpen. Iso-Geothermen. I. 287, 301. — (Vergleichung der) mit den Karpathen. X. *V.* 30. — Notizen (geologische). III. b. 44. — Regen-Verhältnisse. I. 280. — Thalbildung und Form der Gebirgszüge. II. b. 33. — (Werk der Brüder Schlagintweit über Geographie und Geologie der). V. 888. — (bayerische). Petrefacte. VII. 378. — — zwischen der Isar und Salzach. VIII. 146. — (centrale) zwischen dem Hoch-Golling und dem Venediger. V. 818, 847, 851. — — Krystallinische Schiefer. III d. 63; IV. 174, 846, 847; V. 196, 437, 444, 810, 812, 818, 836, 851. — — von Ober-Pinzgau. V. 766, 794. — (Durchschnitt der) von Passau bis an das Adriatische Meer. VI. 881. — (illyrische). Lignit-Lager. II. d. 140. — (italienische). Marmorsorten auf der Pariser Ausstellung. VII. 750. — (kärnthner). Steinkohlen-Formation. VI. 175, 523, 537, 542. — (Kalk-) von Nord-Tirol und Vorarlberg. X. 72, 78, 87. — — südlich der Save, Höhenbestimmungen. VII. 690. — (Karnische). Kalk-Gestein. VIII. 407. — (lombardische). Geologischer Bau. VII. 843; IX. 445, *V.* 33. — — Obere Trias. IX. 137, *V.* 31. — — Verrucano. VIII. 183. — (nordöstliche). Brachiopoden. III. b. 171. — — (Ehrlich's Schrift über die). I. 372; III. a. 191. — — Geologische Durchschnitte. I. 11, 14, 176, 371, 561, 617. — — Geologische Notizen. III. b. 44. — — Gyps des bunten Sandsteines. II. a. 33. — — Höhenmessungen. II. a. 34, 47. — — Karte der Neogen-Diluvial- und Alluvial-Ablagerungen. VII. 383, 384. — — Kreide-Formation. IV. 170. — — Nördlicher Abhang zwischen Wien und Salzburg. I. 17, 59. — — Pseudomorphosen nach Steinsalz. IV. 101. — — Trias, Lias und Jura. IV. 715, 784. — — Verbreitung des miocenen Meeres. I. 363. — (österreich.). Prof. Simony's physiognomischer Atlas. IX. *V.* 53. — (östliche bayerische und angrenzende österreichische). II. a. 1, d. 161, 162; IV. 80, 226. — (Salzburger). Entstehung der Salz-Ablagerungen. I. 234, 240. — — Geologische Durchschnitte. II. c. 108. — (Savoyisch-französische). Anthracit. VI. 185; IX *V.* 48. — (Schweizer). Fossile Fucoïden. IX. *V.* 135. — (Steiner). Geologischer Bau. VII. 169. — (südliche). Ammoniten des Jura. IX. *V.* 47. — — Geologische Aufnahme. VI. 902. — — Gesteinsfolge. I. 59. — — Petrefacte. V. 216. — — Petrefacte des Muschelkalkes. VIII. 166. — (Salzbacher). Geologischer Bau. VII. 169; VIII. 406, 408, 409, 417. — (tiroler). Nordöstlicher Kalkzug. VII. 717, 851. — (venetianische). Geschichtete Gesteine. I. 181; III. b. 171; IV. 113, 180; IX. 850. — — Höhenmessungen. VIII. 249. — — Petrefacte. IX. *V.* 91. — (westliche). Gesteinsfolge. I. 59. Altenberg-Thal (Steiermark). Geologischer Durchschnitt. I. 104, 106. Altendorf (Krain). Turritellen-Schichten. IX. 379, 380, 392, *V.* 8. Altenmarkt (Nieder-Oesterreich). Gyps. II. a. 28, 30. — (Steiermark). Geologie. IV. 421; VIII. 415, 443, 453. Altheim (Ober-Oesterreich). Magnetische Elemente. I. 75. Alt-Kinsberg (Böhmen). Basalt. VII. 532. Alt-Ofen (Ungarn). Süsswasser-Kalk. VI. 416. Alt-Orsova (Militärgrenze). Magnetische Elemente. III. c. 121. Alt-Osslitz (Krain). Kupfer-Vorkommen. III. b. 161; IV. 863. Alt-Sandec (Galizien). Magnetische Elemente. III. a. 37. Altsattel (Böhmen). Fossile Flora. IX. 542. Alt-Warnsdorf (Böhmen). Fossiler Triton. X. *V.* 51. — Schichtenfolge des Braunkohlen führenden Basalt-Tuffes. X. 397, 398. Altwasser (Böhmen). Quarzzug. VII. 499. Altwasser (Ungarn). Künstliche Krystalle von Kalomel. III. b. 168, c. 148. — Quecksilber-Gewinnung aus Fahlerzen. III. c. 149, 150. Alt-Zedlisch (Böhmen). Gneissgebirg. VI. 757. Amerika (Geographische Arbeiten über). III. a. 139. — Petrefacte, gesammelt von Al. v. Humboldt und Degenhart. IV. 843. — (Britisches Nord-). Kohlenfelder. III. a. 139. — (Mittleres Süd-). Foetterle's geologische Karte. V. 876. — (Nord-). Meeres-Fauna. IX. 615. — (Vereinigte Staaten von Nord-). Prof. Agassiz's „Contributions" zu deren Naturgeschichte. IX. *V.* 65. — — Geologische Hebungs- und Senkungs-Perioden. VII. 199. — — Kohlenfelder. III. a. 137. — — Kupfer- und Blei-Gebiet im Nordwest. VII. 771, 783, 792. — — Schichten zwischen Silurischem und Kreide. X. *V.* 1, 18. Amherst (Nord-Amerika). Sammlung fossiler Fährten. X. *V.* 189. Ammer-Thal (Salzburg). Conformation. V. 802. Amonsgrün (Böhmen). Sauerquelle. VII. 514. Amplatz (Böhmen). Kalklager. VI. 600. Amsterdam (Insel). Besuch der Novara-Expedition. IX. *V.* 26. Angel-Fluss (Böhmen). Verlauf. VI. 585. Annaberg (Nieder-Oesterreich). Gyps. II. a. 29. Annathal (Ungarn). Kohlenbau. IV. 153. Antalós (Ungarn). Miocene Tuffe. X. 452. Arabien. Geologischer Bau. III. a. 204. Arader Comitat (Ungarn). Geologischer Bau. IX. *V.* 131. Arber-Berg (Böhmen). Ansicht. VI. 33. Arch (Krain). Neogenes. IX. 385. 391. Archipel (Indischer).

Kohlenführendes Tertiäres. IX. 293, 294. Ariach (Kärnthen). Hochgebirgs-Schotter. VI. 552. Arkansas (Nord-Amerika). Zinkerze. IX. *V.* 104, 105. Arlberg (Tirol). Kalkgestein. X. 100. Arnoldstein (Kärnthen). Steinkohlen-Formation. VII. 644. Arvaer Comitat (Ungarn). Braunkohlen-Lager. II. d. 160. — — Geologischer Bau. II. d. 157; X. *V.* 29. Arzberg (Nieder-Oesterreich). Höhenmessungen. II. a. 50. Arzo (Lombardie). Oberer Lias. IX. 481. Asch (Böhmen). Quarzgang. VII. 520. — Sauerquellen. VII. 534; VIII. 490. Asien (geographische Arbeiten über). IV. 295. Assling (Kärnthen). Gebirgsbau der Trias. VII. 647. Atlantis. Vegetations-Typus. IX. 589. Atlantischer Ocean. Tange. IX. 587. Atschau (Böhmen). Flora des tertiären Kalkmergels. IX. 549. — Grünerde. IX. 436. Atzgersdorf bei Wien. Brunnenbohrungen. X. *V.* 31, 32. Auckland (Neu-Seeland). Tertiäre Braunkohle. X. *V.* 66. Aussee (Steiermark). Continuirliche Verwässerung des Salzgebirges. I. 373, 411. — Torfmoor. III. a. 195. — Werner-Säcularfeier. II. d. 37. Ausser-Bleiberg (Kärnthen). Trias. VI. 907. Ausspanner-Gebirg (Böhmen). Bau auf Roth-Eisenstein. VIII. 595. Australien. Fossile Beutelthiere. IV. 296. — Geographische Durchforschung. IV. 296. — Goldvorkommen (neu entdecktes). III. a. 148. Austupenitzhof (Böhmen). Kaklager. VI. 697. Autieschau (Böhmen). Amphibol-Granit in Granit. V. 312. Auwal (Böhmen). Eisenerz-Lagerstätte. VIII. 169. Auwinkel bei Ofen. Dolomit. VIII. 314, 327. Avás (Ungarn). Miocenes. X. 455. Azoren. Jetziger Vegetations-Typus. IX. 588.

Babna-Gora (Krain). Petrefacte des Crinoiden-Kalkes. IX. 342. Bacher-Gebirg (Steiermark). Geologische Beschaffenheit. VIII. 271, 287, 412, 451, 465. — Kreide-Formation. VIII. 281. — Krystallinische Schiefer. X. 203. — Uebergangs-Schiefer. VIII. 415. — (Gebirg zwischen dem Sannboden und dem). VIII. 412. Bacherwinkel (Bayern). Alpenkalk. IV. 87. Badelhöhle (Steiermark). Gestaltung. V. 554. Baden bei Wien. Fundort tertiärer Mollusken. II. d. 104. — Schwefelquellen. I. 57. Baden (Grossherzogthum). Steinkohlen-Flora. VIII. 350. Badenmühle bei Baireuth. Raibler Schichten. IX. *V.* 160. 161. Bärenmutter (Mähren). Torflager. V. 89 Anmerk. Bärensteiner Gebirg (Böhmen). Orographie. VI. 754. Bäringen (Böhmen). Bergbau. VIII. 58, 65. Bajot (Ungarn). Meeres-Petrefacte (eocene). X. 503, 504. Baireuth (Kirchneria im untern Lias. V. 886. — Raibler Schichten. IX. *V.* 160, 161. Bakonyer Wald (Ungarn). Prof. Peters' Bereisung. IX. *V.* 87. Balvanida (Istrien). Knochen-Breccie. IV. 229. Balzers (Rhätikon). Lias- und Eocen-Gebilde. X. 127, 128. Banat. Ackererden. III. d. 81; X. Anh. 45. — Bergbau-Unternehmungen. I. 705; II. b. 167. — Geologischer Bau. III. a. 203; VI. 219, 905. — Eisenerze, Probe. X. Anh. 16. — Kalksteine, Anal. X. Anh. 32. — Kohlen, Probe. X. 574, Anh. 50. — Marmor. II. a. 101. — Mineralien und Gebirgsarten. IV. 403; VII. 607, 609, 611. — Mineralwässer, Anal. X. Anh. 68. — Petrefacte. I. 356, 357; VII. 844. — Silbergeschicke (hüttenmännische Behandlung der). IV. 807. Banka (Insel). Zinn-Bergbau. IX. 284, 285. Banow (Mähren). Trachyt. IX. 58, 59, 63, *V.* 44. Bánszka (Ungarn). Miocenes Becken. X. 449. Banz (Bayern). Wirbel von Plesiosaurus im Lias. VI. 868. Barau (Böhmen). Geolog. Bau. V. 271. — Krystallinischer Kalk. V. 289. Barko (Ungarn). Petrefacte. X. *V.* 22, 23. Bartfeld (Ungarn). Eisen-Sauerquellen. IX. *V.* 133, 144, 145. Bassano (Venetien). Lithographische Steine. IV. 637. — Quelle (intermittirende). IX. *V.* 65. Batjan (Insel). Nutzbare Mineralien. IX. 286. Bavean (Insel). Geologischer Bau. IX. 209, 291. Bayerkopf (Bayern). Alpenkalk. IV. 93. Bayern. Geologische Aufnahme und Karte. I. 745; II. d. 163; IV. 865; V. 888; X. *V.* 190. — (Trigonometrische Höhenpunkte an der Grenze zwischen Tirol und). IX. 309, 319, *V.* 56. — (südliches). Molasse. VI. 433. — — Temperatur von Gewässern. IV. 492. Bayerischer Wald. Geologischer Bau. II. d. 144; VI. 753. — — Nutzbare Mineralien. II. d. 145, 146. — — Orographie. VI. 751. Bayonne. Lager von Steinsalz. V. 428. Beczwa-Fluss (Mähren). Orographie seines Gebietes. IX. 20, *V.* 42. Bekes-Csanader Comitat (Ungarn). Alluvium. IX. *V.* 132. Belfast (Irland). Skelet des Riesenhirsches. VII. 161. Belgien. Geologische Karte. IV. 173; VIII. 175. — Kohlen-Statistik. III. a. 105, 106, 107, 134. Belgrad. Tertiäre Petrefacte. V. 891. Bellovar (Militärgrenze). Magnetische Elemente. III. c. 123. Bellowitz (Mähren). Grauwacken-Kalk. IV. 323. Belluno (Venetien). Magnetische Elemente. I. 228. Belvedere bei Wien. Fossilreste. I. 166, 361, 744; II. b. 187, d. 121. — Reste von Pferden und Hufeisen. I. 745. — Säugthier-Fauna (fossile). IX. *V.* 160. Bene (Ungarn). Alaunstein. IX. *V.* 118, 119. Beocin (Syrmien). Thonmergel, Anal. III. a. 161, 170. Beraun (Böhmen). Diluvium. X. *V.* 113. — Silurisches. X. *V.* 112. Berchtesgaden. Guttensteiner Schichten. VIII. 149. Berchtoldsdorf bei Wien. Brunnenbohrung. X. *V.* 31, 32. Berégh-Ugocser Comitat (Ungarn). Geologische Aufnahme. IX. *V.* 115, 143; X. 417. Beréghszaszer Gebirg (Ungarn). Alaunstein. IX. *V.* 117. — — Trachyt-Porphyr. X. 455. Berg (Böhmen). Blei-Bergbau. VIII. 47. Bergamo. Neocom. IX. 491. — Obere Kreide. IX. 493. Berghaupten (Grossherzogthum Baden). Steinkohlen-Flora. VIII. 346. Bergreichenstein (Böhmen). Geologischer Bau. V. 271, 283, 578. — Bergbau. V. 285, 286, 571, 584. — Kalk-

spath. V. 288, 292. Berlin. Geographische Gesellschaft. III. a. 181; IV. 841. Bern. Nerineen und durchlöcherte Gesteine. II. c. 47. Bernreuth (Nieder-Oesterreich). Kohle der Grestener Schichten. IV. 740. Berseg-Berg (Ungarn). Süsswasser-Kalk. X. 503. Beušca-Gebirg (Kärnthen). Dachstein-Kalk. VII. 655. Bëuscheg (Steiermark). Diluvial-Terrasse. VIII. 455. Beyschow (Böhmen). Kalk mit Gneiss und Granit. IX. 687. Bezau (Vorarlberg). Grünsand-Petrefacte. VII. 20. Bezdecin (Böhmen). Serpentin. V. 51. Bieskiden-Gebirg (Galizien). Höhenmessungen. VII. 279, 281. — Löss. II. a. 76. Biharer Comitat (Ungarn). Geologie. III. a. 15, 22; IX. *V.* 119, 120, 131. — — Höhenmessungen, III. a. 21. — — Topographie. III. a. 16. Bikk-Gebirg (Ungarn). Geologischer Bau. X. *V.* 70. Bikszád (Ungarn). Mineralquellen. X. *V.* 89. Bilin (Böhmen). Anauxit. V. 83. — Braunkohlen-Gebilde und deren Flora. II. a. 154. — Tertiäre Flora. I. 683, 684; II. a. 154; IX. 545. Billiton (Insel). Zinn-Bergbau. IX. 285. Binowe (Böhmen). Braunkohle im Basalt-Tuff. IX. 419, 420. — Flora der Basalt-Tuffe. IX. 403, 546. — Trachyt und Basalt. IX. 410. Birnbaumer Wald (Krain). Kreidegebilde. IX. 353, 354, 359. Bischoflaak (Krain). Eocene Flora. IX. *V.* 18, 19. — Zähne fossiler Säugthiere. IX. *V.* 158, 159. Bikoitz-Kamen (Böhmen). Granit und Granulit. V. 19. Bistritz (Siebenbürgen). Goldseifen. VI. 132. — Magnetische Elemente. I. 431, 433. Bistro (Ungarn). Kössener Petrefacte. X. *V.* 46. Bitizer Wald (Böhmen). Quarz im Granit. II. d. 170. Blanik-Berg (Böhmen). Turmalin-Granit. IX. 667, 668. Blanitz-Bach (Böhmen). Serpentine und Eklogite. IX. 673. Blankersdorf (Böhmen). Braunkohlen-Flötze. IX. 424. Blansko (Mähren). Hornstein- und Jaspis-Geschiebe. V. 697. — Jura auf Syenit. 681. — Kreide und Tegel-Gebilde auf Syenit. V. 702, 738, 745. Blattnitz (Böhmen). Steinkohlen-Gebirg. VII. 263. Blauda (Mähren). Allochroït-Fels. X. 223. Bleiberg (Kärnthen). Gebirgsbau. VII. 67. — Höhenmessungen. VII. 90. — Magnetische Elemente. I. 225, 513. — Profil. VII. 77. Bleistadt (Böhmen). Porphyr. VIII. 26. Bleistadt-Prünlas (Böhmen). Blei-Bergbau. VIII. 44. Bletria (Krain). Neogen-Petrefacte. IX. 383, *V.* 9. Blocksberg bei Ofen. Tertiäre Petrefacte. VIII. 317, 318. Bludenz (Vorarlberg). Geologische Durchschnitte. X. 135. — Magnetische Elemente. I. 72. Bochnia (Galizien). Steinsalz-Lager. I. 239; II. c. 30. Bochum (Rhein-Preussen). Kohlen-Eisenstein. III. c. 133. Bocksattel-Pass (Kärnthen). Thonschiefer und Quarz-Conglomerat. VI. 527. Boden (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. VIII. 495. — Vulcanische Gebilde. VII. 493. Bodendorf (Siebenbürgen). Tertiäre Petrefacte. X. *V.* 191. Bodensee. Geschiebe mit Eindrücken von Geschieben. IV. 667. Bodonos (Ungarn). Erdpech. III. a. 27; VII. 742 Anmerk. Böch-Graben (Ober-Oesterreich). Denkstein für L. v. Buch. IX. *V.* 107. Böckstein (Salzburg). Magnetische Elemente. I. 67, 487, 489. Böhmen. Bergzehent-Entschädigung. VII. 390, 391; X. 577. — Brachiopoden. II. d. 150. — Erze, Analysen und Proben. X. 572, 574, Anh. 15, 28. — Gebirgs-System. II. c. 101. — Geologische Aufnahmen. VII. 316; VIII. 387, 766, 775, 776, 784, 792, 793, 800, 809; IX. *V.* 60, 63; X. *V.* 95, 96, 97, 110, 111, 113, 185. — Gesteine, Analysen. X. Anh. 32, 42. — Graptolithen. I. 746; III. b. 139. — Höhenmessungen. III. c. 67; VI. 736; VIII. 133. — Kohlen und Torf, Proben. X. Anh. 50, 66. — Kreidegebilde. VIII. 810; X. *V.* 60, 61, 96, 113, 114. — Magnetische Elemente im Jahre 1845. I. 435. — Marmor. II. a. 103. — Fürstlich Schwarzenberg'sche Holzschwemme. V. 625. — Steinkohlen-Ablagerungen. II. c. 102; III. a. 188; VI. 411; X. *V.* 95, 96. — — -Floren. II. d. 165; III. d. 123, 129. — Zinn-Production. III. a. 173; IV. 191. — (Barrande's Werk über das Silur-System im centralen). IV. 430, 431. — (centrales). Geologischer Bau. X. *V.* 185. — (mittleres). Geologische Uebersicht. VII. 318. — — Gneissgebirg. VI. 355. — — Granitgebirg. VI. 363. — — Silurisches Becken. VI. 189, 594; X. 479, 481, *V.* 96, 111, 112, 175, 176. — — Silur-Petrefacte. VII. 355, 372; X. 479, 481, *V.* 175. — — Ur-Thonschiefer. VI. 167. — (nordöstliches). Geologische Aufnahme. VIII. 701, 788, 815. — — Rothliegendes. IX. *V.* 37, 38, 45. — — Schürfungen. IX, 239, *V.* 57, — — Steinkohlen-Flötze. IX. 239. — (nordwestliches). Geologische Aufnahme. VI. 874. — — Kohlenflötze des Rothliegenden IX. *V.* 241. — (südliches). Bodengestaltung. III. d. 73. — — Eisensteine und Torflager. V. 233. — — Geologie. III. d. 74; IV. 843; V. 263, 874. — — Granulit und Serpentin. V. 2. — — Krystallinischer Kalk. V. 227. — (südwestliches). Geologischer Bau. VI. 580. — (westliches). Kreide-Gebilde. X. *V.* 95, 97, 113. 114. Böhmerwald Bergbaue (alte). V. 571, 581. — Erz-Lagerstätten. VII. 323, 368. — Gebirgspässe. VII. 148, 369. — Geologische Aufnahme. IV. 858; V. 892. — (Geologische Studien aus dem). V. 1, 566; VI. 10, 749, 808; VII. 136. — Gneiss. V. 566, 577. — Goldwäschen (alte). V. 210, 581. — Granit und Granit-Porphyr. IV. 253; VI. 10. — Höhenverhältnisse. VII. 135, 137, 368. — Höchste Spitzen. VII. 148, 368. — Literatur. VII. 150. — Nordwestliche Ausläufer. VII. 480, 509; VIII. 511. Pflanzengeographische Grenzlinien. VII. 149, 369. — Quarzfels-Lagerzug. VI. 767, 768. — Seen. VII. 148, 349. — Torfmoore. VI. 171. — Urwälder. VI. 170. Böhmisch-Aicha. Kreidegebilde. IX. *V.* 91, 92; X. *V.* 61. Böhmischbrod. Rothliegendes (kupfer-

führendes). III. b. 96; VI. 408. Böhmisch-Eisenberg (Mähren). Mineralien. X. 227, 228, 232. Böhmisch-Leipa. Quader-Sandstein. IX. *V.* 81; X. *V.* 61. Böhmisch-Wiesenthal. Alter Bergbau. VIII. 582. Bösenbach-Schacht (Ober-Oesterreich). Aphanit. IV. 261. Bösing (Ungarn). Geologischer Bau. V. 204. Boguschowitz (Oesterreichisch-Schlesien). Diorit. IV. 314. Boldogkő-Várallya (Ungarn). Miocene Bucht. X. 445. Boldva-Fluss (Ungarn). Geologischer Bau seines Gebiets. VII. 692. 693, 701. Boleschin (Böhmen). Kalkspath. VI. 161, 499. — Kalkstein im Gneiss. VI. 498. Bologna. Subapennin-Petrefacte. IV. 638. Bombay. Schriften der geographischen Gesellschaft. VIII. 780. Bann. Sendung des Dr. Krantz an die k. k. geologischen Reichsanstalt. VIII. 182. Bori (Ungarn). Mineralquellen. IX. *V.* 152. Bormio (Lombardie). Magnetische Elemente. I. 71. Borneo (Insel). Geologischer Bau. IX. 288, 289. — Nutzbare Mineralien. IX. 286, 287, 288, 289. Borotin (Böhmen). Granit. IX. 676, 680. — Kalk mit Phyllit und Pegmatit. IX. 682. Borsabánya (Siebenbürgen). Kalk und Kieselschiefer. VI. 126. Borsen-Berg (Krain). Kreide-Formation. VIII. 220. Borsoder Comitat (Ungarn). Braunkohlen-Ablagerungen. X. *V.* 64. Boryslaw (Galizien). Naphtha. X. *V.* 183, 184. — Ozokerit. VI. 652; VII. 610. Boskowitz (Mähren). Grauwacke. V. 672. — Kreidegebilde. V. 714, 723, 745. — Quader-Kohle. V. 729, 762. — Rothliegendes. V. 666, 676. — Tertiäres. V. 745, 746, 756, 757. Bosporus (Grauwacken-Gebilde an den Gestaden des). IX. *V.* 85. Botticina (Lombardie). Geologischer Durchschnitt. IX. 479. Botzen. Magnetische Elemente. I. 67. Bradlstein (Mähren). Geologischer Bau. IV. 69. Brandau (Böhmen). Basalt. VIII. 604. — Steinkohlen-Gebilde. VIII. 166, 600, 601, 602. Brandeisl (Böhmen). Sphärosiderit im Kohlengebirg. IV. 648. Brandenberger Ache (Tirol). Gosau-Schichten. VII. 735. Brandgraben (Krain). Durchschnitt. VIII. 221. Brandhof (Steiermark). Geologischer Durchschnitt bis Lilienfeld. I. 15. Brandner Thal (Vorarlberg). Diluvium. X. 136. Brasilien. Braunkohlen-Flötze. VI. 196. Braunschweig (Geognostische Karte des Herzogthums). VIII. 167. Brazza (Dalmatien). Asphalt-Gestein. VII. 761. Bregenzer Wald (Vorarlberg). Profil. VIII. 1, 12. Breitenbach (Böhmen). Eisenerz-Gangzüge. VIII. 66. — Porphyr. VIII. 26. Brennberg (Ungarn). Fossile Pflanzen. IV. 638; IX. *V.* 148, 149. Brenner. Magnetische Elemente. I. 73. — Quellen-Temperatur. I. 292, 297. Brescia. Eocenes. IX. 495. — Magnetische Elemente. I. 68. — Schichtenfolge. X. *V.* 193. Brianza (Lombardie). Geologischer Bau. VIII. 783. Britisch-Amerika. Kohlen-Statistik. III. a. 105, 139. Britischen Inseln (Fauna und Flora der) nach E. Forbes. IX. 575, 577, 660. — — (Meeres-Fauna der). IX. 591, 593, 607, 609, 612, 621, 660. Brixlegg (Tirol). Geologischer Bau. IX. *V.* 69. Brloch (Böhmen). Kalkspath im Gneiss. V. 292. Brody (Galizien). Magnetische Elemente. III. a. 38. — Tiefland. X. *V.* 127. Brogyán (Ungarn). Säugthier-Reste aus diluvialem Lehm. VI. 908; IX. *V.* 112. Bruck an der Leitha (Nieder-Oesterreich). Römische Gräber, II. b. 192. Bruck an der Mur (Steiermark). Magnesit-Gestein. VI. 68. — Magnetische Elemente. I. 223. Bruderndorf (Nieder-Oesterreich). Nummuliten-Gebilde. IX. 111. Brühl bei Wien. Gyps. II. a. 28. — Kalkbrüche. VI. 201, 202. — Wiener Sandstein. X. *V.* 4, 5. Brünn. Geologische Karte. IV. 175. — Hornstein und Feuerstein. II. c. 1. — Magnetische Elemente. I. 426. — Mineralogie und Geologie der Umgebung. IV. 321. — Werner-Verein. II. a. 158, d. 151; III. b. 167; IV. 1, 424. Brüsau (Mähren). Pläner-Schichten. V. 719, 720. Brüx (Böhmen). Ausläufer des Leitmeritzer Mittelgebirges. IX. 433, 439. — Tertiäre Floro. IX. 548. Brunn am Gebirge bei Wien. Tertiärer Sand und Tegel. II. d. 118. Brunn am Steinfeld (Nieder-Oesterreich). Höhle. V. 501; VI. 871. — Marmor. II. a. 107. Brunnecken (Tirol). Magnetische Elemente. I. 67. Bruska bei Prag. Trilobiten (silurische). X. 482. Brzas (Böhmen). Steinkohlen-Becken. VII. 270. Brzezina (Böhmen). Eisenstein-Lager. VI. 614. Brzorad (Ungarn). Cölestin in neogenem Tegel. X. 502 Anmerk. Buchberg (Nieder-Oesterreich). Gyps. II. a. 31, 153. — Geologischer Bau. II. a. 152; II. c. 58. Buchberg (Steiermark). Braunkohlen-Becken. X. 184. Buchkogel (Steiermark). Uebergangs-Gebirg. VII. 238, 240. Bucsess-Berg (Siebenbürgen). Kalk-Conglomerat. X. *V.* 107. Budakés (Ungarn). Nummuliten-Gebilde. X. 495. Budweis (Böhmen). Anthracit. V. 224. — Magnetische Elemente. III. a. 40. — Pflanzenreste des Anthracites. V. 197. — Tertiäres Becken. V. 215. Büchel (Steiermark). Thonschiefer in Contact mit Granit. V. 540. Büchelschloss (Steiermark). Durchschnitt. V. 348. Büdös-Berg (Siebenbürgen). Geologischer Bau. IV. 169. — Schwefel- und Alaun-Erde. V. 217. Bürger-Alpel bei Mariazell. Kalkgebilde. III. a. 195. Bürs (Rhätikon). Flysch. X. 134, 136. Bujtur (Siebenbürgen). Tertiäre Petrefacte. II. b. 173. Bukowina. Bergbau. V. 219. — Erz-Lagerstätten. VI. 103. — Höhenbestimmungen. III. b. 132, 135; IV. 125; X. 345, 346. — Mineralien und Gebirgsarten. X. 353, 354. — Tertiäres und Diluvium. X. *V.* 105, 129, 130. Bundschuh-Thal (Salzburg). Eisenstein-Lager. V. 384. Bunzlauer Kreis (Böhmen). Bergmännische Schürfungen. IX. 239, *V.* 57. Buschenpelz (Böhmen). Braunkohlen-Zechen. IX. 528. Busstiehrad (Böhmen).

Steinkohlen-Formation. X. *V.* 14. Butzbach (Grossherzogthum Hessen). Pseudomorphose von Quarz nach Schwerspath. X. *V.* 179. Bzianka (Galizien). Elephas primigenius. II. d. 158.

Cadibona (Piemont). Fossile Säugthiere. X. *V.* 180. Calcutta. Geologisches Museum. VIII. 781, 782. — Schriften der Asiatischen Gesellschaft. X. *V.* 42, 43. Californien. Klima. II. c. 128. — Mineral-Reichthum. II. c. 147. — Producte. II. c. 135. — Reiseberichte. I. 718. 720; II, c. 121. Calvarienberg bei Nagyág. Gestalt und Lage. VIII. 93, 95, 712. — Trachyt, VIII. 102, 106, 113. Canale (Krain). Gebirgsbau. IX. 327. — Radioliten. IX. 348. Canal Gorto (Venetien). Kohle in schwarzem Kalk. VII. 451. Canal Socchieve (Venet.). Gneissblöcke. VII. 457. Canarische Inseln. Jetztzeitige Flora. IX. 588. Canzacoli (Tirol). Syenit an Kalk. VIII. 164. Cap der guten Hoffnung. Bergbau-Unternehmungen. IX. *V.* 24. — Magnetische Abweichung. I. 518. — Schreiben der Herren Dr. Hochstetter und Dr. Scherzer. IX. *V.* 9, 20. — Wissenschaftliche Institute. IX. *V.* 22. 26. Carlowitz (Slavonien). Magnetische Elemente. III. c. 122. Carlstadt (Militärgrenze). Magnetische Elemente. III. c. 122. Carnia (Venetien). Geologischer Bau. VII. 178, 179, 431, 458, 459. — Topographie. VII. 432. Carpano (Istrien). Geologischer Bau. IV. 423, 546. — Kohlenlager. IV. 228, 423, 549, 550; IX. *V.* 117. Castua bei Fiume. Geologischer Bau. IX. *V.* 112. Cattaro (Dalmatien). Geologischer Bau. IX. *V.* 111, 112; X. 23, 24, V. 117. — Magnetische Elemente. I. 231. Čehnitz (Böhmen). Lignit-Lager. V. 315. Celebes (Insel). Braunkohlen. IX. 662. Čerkow-Gebirg (Böhmen). Höhenbestimmungen. VII. 145. — Orographie und Geologie. VI. 749, 751, 754, 780. Černa prst (Krain). Dachstein-Kalk (?). VII. 685. Černitz (Böhmen). Kalk der silurischen Abtheilung B. VI. 600. Čerwenky-Wald (Böhmen). Aphanit. VI. 475. Čerweny-kamen (Ungarn). Ammoniten- und Terebratel-Kalk. X. *V.* 68. Cesena (Kirchenstaat). Braunkohlen. IX. *V.* 54. — Schwefellager. IX. *V.* 54, 105. Cettigne (Montenegro). Magnetische Elemente. I. 231. Chabhana-Karahissar (Klein-Asien). Trachytisches Gebirg. IX. *V.* 123. Chanowitz (Böhmen). Granit-Blöcke. VI. 469, 470. Cherbourg (Frankreich). Gesellschaft der Naturwissenschaften. VII. 363. Cherso (Quarnerische Inseln). Karst-Trichter. X. 343, 344. — Rudisten-Gestein. X. *V.* 99. Cheylawa-Wald (Böhmen). Kieselschiefer und Eisenerze. VII. 124, 126. Chenow (Böhmen). Gneiss. IX. 665, 666. — Körniger Kalk. IX. *V.* 670, 671. — Sandstein des Rothliegenden. VIII. 792, 809; X. 664, 688. Chiavenna (Lombardie). Topfstein. VII. 749. Chiem-See (Bayern). Molasse. II. a. 5. China (Büchersendung aus). X. *V.* 2. Chlum-Berg (Böhmen). Aphanite. VI. 606. — Gneiss und Granit. VI. 361. Chlumetz (Böhmen). Magnetische Elemente. I. 425. — Geologischer Bau. VI. 682. Chmelna (Böhmen). Eisenerze im Serpentin. V. 35. Chomle (Böhmen). Arachniden in Steinkohle. VII. 250. — Schichtenfolge der Kohlenmulde. VII. 269. Chotieschau (Böhmen). Durchschnitt der Kohlenmulde. VII. 261. — Silurische Abtheilungen A und B. VI. 596, 597. — Steinkerne fossiler Baumstämme. VII. 265. Chotzen (Böhmen). Gediegen Eisen im Plänerkalk. VIII. 351. 354; X. Anh. 6. Chozimirz (Galizien). Erdfälle im Gyps. IX. 148. Chudenitz (Böhmen). Thonschiefer-Gebiet. VI. 778. Chum-Berg (Steiermark). Piauzit. VII. 607. — Tertiäres. X. 178. Christianberg (Böhmen). Glimmer-Diorit. V. 51. — Granit. VI. 21. — Granulit. V. 49, 63. Christinenstadt bei Ofen. Tertiäres. VIII. 316, 322. Christophen (Nieder-Oesterreich). Eocener Sandstein mit Kohle. IX. 135, 136. Christophhammer (Böhmen). Eisenerze. VIII. 593, 599. Chrudiehrom (Mähren). Bernstein in der Moorkohle des Quaders. V. 198. — Kohle des Quaders. V. 730. Čikwaska (Böhmen). Verwerfungs-Spalte im Rothliegenden. VIII. 708. Cilly (Steiermark). Diluviale Ebene. VIII. 412, 457, 465. — Magnetische Elemente. I. 226. — Pristova-Thal. VIII. 288. — Tertiäres. VIII. 444. 445. — Vulcanisches Trümmergestein. VIII. 445, 449. Cima (Venetien). Grünstein. VII. 445. Cima Castello (Venetien). Trichterförmige Auswaschungen im bunten Sandstein. VII. 447. Cirkniza-Thal (Krain). Kohlengebilde und Trias. IX. 360. Cischlischora (Ungarn). Kieslager. VI. 121. Čischkau (Böhmen). Silurischer Kalk mit Braun-Eisenstein. VII. 112, 124. Cittiglio (Lombardie). Majolica. IX. 488. City of Superior (Nord-Amerika). Neugegründete Stadt. VII. 781. Cividale (Venetien). Gediegen Quecksilber. VI. 810. Coburg. Zechstein-Petrefacte. IX. *V.* 55. Cognola (Tirol). Diphya-Kalk und rother Marmor. VIII. 300, 303, 305. Collinsville (Nord-Amerika). Eisenwerke. VII. 779. Collio (Friaul). Geologischer Bau. V. 226. Colza (Venetien). Bunter Sandstein mit Gyps. VII. 454, 455. Comabbio-See (Lombardie). Nummuliten-Gestein. IX. 494. Comelico (Venetien). Geologischer Bau. VII. 178, 179, 431, 439. — Topographie. VII. 431, 432. Comén (Istrien). Fische der obern Kreide. VIII. 815. Comer See. Ammoniten-Kalk (rother). IX. 482. — Dolomite. IX. 477. — Trias. IX. 459, 463. — Verrucano. VIII. 183; IX. 458, 464. Como. Magnetische Elemente. I. 70. Conegliano (Venetien). Magnetische Elemente. I. 228. Connecticut-Thal (Nord-Amerika). Fossile Fährten. X. *V.* 189. Copenhagen. Magnetische Abweichung. I. 518. — Versuche mit Naturselbstdruck. IV. 859.

Coritenza (Krain). Kesselthal. IX. 356, 357. — Kreide. IX. 344. Cosina bei Triest. Braunkohle. VIII. 362, 814. Cremonx (Lombardie). Magnetische Elemen te. I, 69. Crevenna (Lombardie). Lias-Kalk. IX. 482. Croatien. Bergtheer und Braunkohle. VIII. 161; X. 140, Anh. 52. — Erze, Proben. X. Anh. 17, 27. — Geologische Bereisung. IV. 177; V. 875; VI. 417. — Höhenmessungen. IV. 534, 542. — Küstenland. X. *V.* 119, 120. — Karst-Gebilde. X. 332, 333, 335. — Marmor. II. a. 101. — Mineralwasser, Anal. X. Anh. 11. — Steinkohlen-Reservat. VIII. 191. — Unterirdische Flüsse und Bäche. VI. 418. Croce Domini-Pass (Lombardie). Werfener Petrefacte. IX. 461. Croda bianca (Venetien). Okerige Schiefer. VII. 438. Cserhat-Gebirg (Ungarn). Basalt. IX. 96, 129. Csernek (Slavonien). Seifengebirg. IV. 494. Csetraser-Gebirg (Siebenbürgen). Gestalt und Lage. VIII. 94. — Geologischer Bau. 101, 103, 107, 108, 111, 713. — Tellur-Formation. VIII. 115. Csobánka (Ungarn). Kalkgestein. VIII. 311, 315, 324. Csubar (croatisches Küstenland). Zinnober im Werfener Schiefer. VI. 418. Csurgo (Ungarn). Tertiär Petrefacte. VIII. 185. Czernokonzice (Podolien). Lagerfolge des Gyps-Gebirges. IX. 150. Czarny Potok (Bessarabien). Tertiäre Schichten. IX. 153, 154. Czászta (Ungarn). Tertiärer Sandstein auf Kohlen (?) Kalk. VII. 701. Czeikowitz (Mähren). Tertiäre Braunkohlen-Gebilde. II. d. 119. Czerniutz (Steiermark). Porphyr und Gailthaler Schichten. VIII. 430, 435. Czarnowitz (Bukowina). Magnetische Elemente. I. 433. — Tertiärer Sandstein mit Blätterabdrücken. IX. 156. — Tertiäres. X. *V.* 105, 130. Czerny Vrh (Kärnthen). Rother Kalk mit Ammoniten und Brachiopoden. VII. 335, 336. Czerwenitza (Ungarn). Opal im Trachyt. IX. *V.* 84. Czetkowitz (Mähren), Leitha-Kalk. V. 752. Cziklowa (Banat). Hüttenwerke. IV. 808. — Mineralien. VII. 611. Czikwaska (Böhmen). Kohlenflötze im Rothliegenden. IX. 242, 243. Czortkow (Galizien). Magnetische Elemente. III. a. 38.

Dachstein-Gebirg (Ober-Oesterreich). Geologischer Durchschnitt der Alpen. I. 16. — Gletscher (vorweltliche). II. a. 153. Grauwacke und Bunt-Sandstein. III. d. 144. — Kalk-Formation. IV. 729, 784. — Profil. V. 196. — Quellengebilde (alte). V. 439. — Thone mit Bohnerze. V. 198, 439. — Urgebirgs-Geschiebe. II. b. 159, 160. Dalaas (Vorarlberg). Gyps und Dolomit. VII. 17, 18. Dalmatien. Anthracotherium. IV. 165; VI. 184, 652. — Asphalt. I. 749; II. d. 137; VII. 760, 761. — Bergbau-Verordnungen. VIII. 621, 623, 626, 635, 636. — Geologischer Bau. III. a. 192, 193; IV. 157, 158; VI. 877, 898. — Hippuriten- und Nummuliten-Kalk. IV. 157; VI. 877. — Höhenmessungen. III. a. 41, 54. — Kohlenlager. II. d. 138, 139, 140. — Marmor. II. a. 100. — Petrefacte. III. a. 193; IV. 158, 646, 648; VI. 184, 185. — Trionyx (fossiler). VI. 184, 652. — (de Visiani's Werk über die fossilen Pflanzen von). X. *V.* 109. Damitz (Böhmen). Basalt auf und in Granulit. IX. 438. Daniele (Istrien). Kreide- und Nummuliten-Schichten. X. 295. Danieli (Steiermark). Sauerquelle. VIII. 463. Dannemora (Schweden). Lager von Magnet-Eisenstein. IX. *V.* 157, 158. Darocz (Ungarn). Kalktuff der Jetztzeit. X. 463. Darnberg (Böhmen). Granit. II. b. 25. Darowa (Böhmen). Steinkohlen-Becken. VII. 271. Dauba (Böhmen). Quader. X. *V.* 96, 97. Davidsthal (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. VIII. 498, 503. — Erdbrände. VIII. 506. — Pflanzen der Braunkohle. IX. 543. Debreczin (Ungarn). Magnetische Elemente. III. a. 39. — Salpeter-Gewinnung. I. 326. 458, 466. — Sandsteppe. X. 460. Dembica (Galizien). Elephas primigenius. VIII. 815. Detroit (Nord-Amerika). Industrielle Unternehmungen. VII. 772, 773. — Meteorologische Verhältnisse. VII. 774. Deutsch-Bleiberg (Kärnthen). Bleierz-Lager. VII. 77, 78, 80, 87, 88. — Geologischer Bau. VII. 67, 76, 77. — Höhenmessungen. VII. 89, 90. — Petrefacte des Lagerschiefers. VII. 84. Deutschland (Geognostische Uebersichts-Karte von). II. b. 89; VII. 386. — (v. Dechen's geologische Karte von). VII. 824. — Giebel's „Gaea exeusoria". II. d. 169. — (Karte über Verbreitung der Stein- und Braunkohlen in). VIII. 168. — Reptilien des Jura. X. *V.* 54. Déva (Siebenbürgen). Geologischer Bau. VIII. 83, 110, 111. Dexenberg (Steiermark). Leitha-Kalk. VI. 352, 589. — Tertiärer Tegel und Sandstein. VI. 578. Dienten (Salzburg). Eisenstein-Lager. V. 371, 372. Dietersdorf (Steiermark). Kohlen-Gebilde. IV. 172. Dillen-Berg (Böhmen). Aeussere Gestaltung. VI. 749, 751, 752. — Glimmerschiefer. VI. 765. — Schichtenstörungen. VI. 762. Dippoldiswalde (K. Sachsen). Syenit-Porphyr. VIII. 557. Dirnonitz (Mähren). Tertiäres. V. 760, 761. Divazza (Istrien). Kreide- nnd Nummuliten-Schichten. X. 302. — Schichtenstörung der eocenen Gesteine. X. 331. Dniester-Thal (galizisch-polnisches). Gyps. IX. 145, 147, 150, 154, 155. Dobra (Siebenbürgen). Magnetische Elemente. III. c. 120. Dobracz-Berg (Kärnthen). Magnetische Elemente. I. 225. Dobracz-Gebirg (Kärnthen). Dachstein-Kalk. VII. 74. — Diluvium. VII. 85. — Geologischer Bau. VI. 908; VII. 69. — Lager von Bohnerzen. VII. 88. Dobrassen (Böhmen). Plastischer Thon. VIII. 483. Dobrawy-Wald (Böhmen). Braun-Eisenstein in Thonschiefer. VII. 124, 125. Dobrol-Gebirg (Steiermark). Guttensteiner Kalk. VIII. 438. — Uebergangs-Gebilde. VIII. 429, 431. Dobrusch (Böhmen). Serpentin. V. 38. Dobschau (Ungarn). Geologischer Bau. IX.

V. 115; X. 539, 547, 549, 551, V. 40, 79. — Kobalt-Nickelerz. I. 363. — Steinkohlen-Formation. X. 553. — Werfener Schiefer. X. V. 128. Dömös (Ungarn). Tuff mit Blättern und Lignit. X. 511. Dolark (Steiermark). Ober-Tertiäres. VIII. 452. Dolina (Galizien). Magnetische Elemente. III. a. 39. Donau (Erdbohrungen am Ufer der) bei Wien. I. 361. — (Geologischer Durchschnitt des Alpengebietes vom Adriatischen Meer bis zur). VI. 419. 881. — Nivellement von Engelhartszell bis Freienstein. VIII. 265. — Oelschichten auf deren Oberfläche. VII. 96, 97. — (Plan und Profil der) im Wiener Becken. II. b. 191, d. 164. — Waschgold. IX. V. 15. Donau-Gebiet. Vorkommen des Riesenhirsches. VI. 198, 327. Donau-Thal. Höhenmessungen. II. d. 155, 156; III. c. 99. Donnersbach (Ober-Oesterreich). Erze. II. c. 163, d. 142; III. d. 122. Dorfner Oedthal (Salzburg). Gletscher. V. 803, 804. Dorna (Galizien). Glimmerschiefer. II, a. 139. Dorog (Ungarn). Braunkohlen-Flötze. IV. 141, 403. Dou-Alpe (Krain). Lias- und Nummuliten-Kalk. VIII. 225. Drann-Thal (Steiermark), Geologische Verhältnisse. X. 200, 203, 205, 208, 209, 215, 219. Drau-Thal. Basalt. VII. 322. — Dolomit auf Thonschiefer. VI. 546. — Etagenförmiger Bau. II. b. 44. — Geologischer Bau. VIII. 270, 275, 282, 287. — Hochgebirgs-Schotter. VI. 553. — Höhenmessungen. VII. 459, 461, 675. — Jura-Gebilde. VII. 335. — bei Lienz. VII. 406. — Tertiäres. VII. 334, 335; VIII. 285. — Trias. VI. 908; VII. 339. Drau-Save-Gebirgszug (Steiermark). Kalke und Dolomite. X. 209. Dreibrüderstein (Böhmen). Basalt. VIII. 75. Dreieichen (Nieder-Oesterreich). Tertiär-Petrefacte. I. 666. Dreifaltigkeits-Berg (Kärnthen). Eisenglanz und Braun-Eisenstein-Lager. VI. 545. Dreihacken (Böhmen). Gneissgebirg. VI. 761, 765 — Erze im Glimmerschiefer. VI. 765. Dreisessel-Fels (Böhmen). Granit (zerklüfteter). VI. 14, 15. Dresden. Kreide-Petrefacte, VIII. 810, 811. — Königl. mineralogischen Museums. (Prof. Geinitz's Beschreibung des). IX. V. 106. Drohowyze (Galizien). Grobkalk. IX. 152. Dürrenfeld (Kärnthen). Kreideschichten. VI. 548. Dürrenschöber (Steiermark). Durchschnitt. IV. 468. Dürrenstein (Kärnthen). Eisenglanz-Lager. VI. 520. Dürren-Alpe (Ober-Oesterreich). Petrefacte. III. a. 184. Dürnberg (Salzburg). Halleiner Salzberg. V. 590. Dürnstein (Steiermark). Uebergangs-Gebirg. V. 349, 352. Dürstenhof (k. k. Schlesien). Schieferbrüche. II. a. 146; III. b. 160. Dufton (England). Ueberschwefeltes Schwefelblei. VI. 5, 6, 7, 876. Duino (Istrien). Durchschnitt des Alpengebietes bis zur Donau. VI. 419, 881. Dunajec-Fluss (Galizien). Fossile Reste von Säugthieren. X. V. 52. Duppau (Böhmen). Basalt-Gebirg. VII. 194, 195, 329; VIII. 491. Dzwiniaczka (Galizien). Tertiäres auf altem Roth-Sandstein. IX. 154.

Edelény (Ungarn). Geologischer Bau. VI. 407; VII. 692, 699. — Höhlen. VII. 703 — Lignit-Flötze. VII. 697. Edelschrod (Steiermark). Krystallinisches Gebirg. VII, 226. Eger (Böhmen). Braun-Eisenstein. VIII. 475. — Braunkohlen-Becken. VII. 327, 328, 329, 380; VIII. 466, 477; IX. 537, 547. — Cypris-Schiefer. VIII. 477. — Diluvium. VIII. 486. — Erz-Lagerstätten. VII. 491; VIII. 31. — Geologischer Bau. I. 685; VII. 479; VIII. 1, 466. — Mineralquellen. VIII. 488. — Plastischer Thon. VIII. 483. — Süsswasser-Tertiäres. VIII. 466. — Torf. VIII. 487. Eggenberg (Steiermark). Lignitschichten. V. 192. Eggenburg (Nieder-Oesterreich). Tertiäres. I. 667, 668, 670. Ehningen (Württemberg). Hamites bifurcatus. V. 194. Ehrenhausen (Steiermark). Bryozoën des Leitha-Kalkes. VI. 352, 353, 594; VIII. 284, 285. — Tertiäres und Diluvium. VII. 535; VIII. 266. Eibenberg (Böhmen). Kupfer-Bergbau. X. V. 89. Eibenstock (K. Sachsen). Granit-Eruption VIII. 25. Eibiswald (Steiermark). Glanzkohle (tertiäre). VIII. 283. — Kohlengebilde. I. 359. — Krystallinische Gesteine. VIII. 273. — Säugthier-Reste. I. 359. Eichkogel bei Wien. Geologischer Bau. IX. V. 160; X. 25. — Tertiärer Süsswasser-Kalk. II. d. 122. Eifel-Gebirg. Magnetische Gesteine. VIII. 661, 807. Einöd (Steiermark). Höhle. III. d. 139. Einöd-Thal (Kärnthen). Eisenglanz im Glimmerschiefer. VI. 520. Einsiedl (Böhmen). Porphyrartiger Granit. VIII. 550. Eipel-Graben (Bayern). Alpenkalk. IV. 94, 95, 97. Eipowitz (Böhmen). Eisenstein-Lager. VI. 613, 614. Eisenbühl (Böhmen). Ausgebrannter Vulcan. VI. 767; VII. 331, 493. Eisenerz (Bayern). Alpenkalk. IV. 84. Eisenerz (Steiermark). Erzberg. V. 396. — Geologischer Durchschnitt der Alpen. I. 15. — Gyps. II. a. 32. — Grauwacke. V. 397. — Höhenmessungen. II. a. 57. — Magnetische Elemente. I. 223, 224. — Marmor. II. a. 98. — Trias. V. 401. Eisenhüttel (Böhmen). Eisenlager. VI. 605. Eisenstadt (Ungarn). Leitha-Kalk. III. d. 51, 52. Eisenthal (Bukowina). Kalksteine des Glimmerschiefers. VI. 108, 109. Elavena-Alpe (Vorarlberg). Flysch. X. 126, 127. Elba (Insel). Mineralien und Gebirgsarten. V. 431. Elbe-Thal (böhmisches). Phonolith. IX. 414. Elischau (Böhmen). Bergbau auf Silber. V. 301; VI. 482. — Granitblöcke. VI. 668, 669. Ellbogen (Böhmen). Braunkohlen-Becken. VII. 185, 186, 328, 380; VIII. 492, 502. — Braunkohlen-Flora. IX. 543, 547. Ellhotten (Böhmen). Diluviales Conglomerat und Geröll. VII. 267, 268. — Porphyr. VI. 608. Ellmau (Tirol). Guttensteiner Kalke. X. 93. Elsass. Gebirgsarten und Petrefacte. II. b. 144. Engelhaus (Böhmen). Phonolith. VII. 331. Engelstein-Berg (Bayern). Alpenkalk. IV. 99

Engelsburg (Böhmen). Magneteisen. VIII. 587. England. Ackerbau-Geologie. I. 140, 141. — Dachschiefer-Brüche. I. 445. — Fauna und Flora der Jetztzeit. IX. 579, 580. — Faunen der Kohlen-Formation. VII. 184. — Fische (fossile). II. a. 143. — Geographische Arbeiten. IV. 291. — Geologische Karte. IV. 839. — Kohlenfelder. III. a. 177. — Marmor. II. a. 93. — Mineral-Industrie. III. a. 172. — Quecksilber (Handel mit). I. 719. — Riesenhirsch. VI. 322, 323. — Stahl-Fabrication. III. b. 168, 169. — Zinn-Production. III. a. 173. Enns (Ober-Oesterreich). Geologischer Bau. II. b. 165. Enns-Thal. Geologischer Bau. IV. 461; V. 849. — Grauwacke. IV. 171. — Höhenmessungen. II. a. 57; VII. 713. — Kalksteine und jüngere Gebilde. IV. 435. — Krystallinische Schiefer. IV. 177. — Sandstein (bunter). IV. 192. Enskirchen bei Bonn. Bituminöses Holz. V. 198. Enzersfeld (Nieder-Oesterreich). Liassische Kalke. II. c. 19, 21, 24, 25, 27. Enzesfeld bei Wien. Kössener Petrefacte. VI. 176, 177. — Tegel-Petrefacte. II. d. 107. Eperies (Ungarn). Benczur'sche Cement-Fabrik. VII. 757. — Gebirgsarten und Petrefacte. II. b. 145, d. 135; III. a. 169. — Miocenes Becken. X. 439. — Opal-Gruben. VIII. 176; IX. *V.* 84. — Pflanzen (fossile). III. a. 169. — Trachyt-Gebirg. IX. *V.* 84; X. 438. Erba (Lombardie). Rother Ammoniten-Kalk. IX. 480, 481, 482, 487. Erdöbenye (Ungarn). Miocen-Bucht. X. 447. — Miocen-Flora. II. b. 178; V. 202. Erla (Nieder-Oesterreich). III. c. 37. Erlau (Ungarn). Geologischer Bau. V. 211, 212. — Magnetische Elemente. I. 428. — Pflanzen (fossile). V. 211. Erzgebirg (böhmisches). Erz-Lagerstätten. VII. 365, 366; IX. 571, *V.* 41, 42. — Geologischer Bau. VI. 809, 874, 875; VIII. 793. — Höhenbestimmungen. VIII. 513. — im Leitmeritzer Kreise. IX. 549, *V.* 41. — — im Saazer Kreise. VIII. 516, 539, 540, 543, 544. — Zinnerz-Formation. VII. 323; IX. 562, 564, 566. Erzgebirg (mittleres). Erzführung. VIII. 181, 568, 569; IX. *V.* 41. Erzgebirg (sächsisches). Gangzüge. VII. 180, 181. — Mineralien und Pseudomorphosen. V. 195, 433, 435, 644, 894, 895; VI. 884, 885. Erzgebirgs (geologische Aufnahme des böhmischen) zwischen Joachimsthal und Niklasberg. VIII. 165. Erzgebirgs (südwestlicher Theil des böhmischen). Eisen-Bergbau. VIII. 62, 71. — Geologischer Bau. VIII. 1, 21, 24. — Zinn-Bergbau. VIII. 49. Esino (Lombardie). St. Cassian-Kalk. VI. 894; IX, 468. Essegg (Slavonien). Magnetische Elemente. III. c. 122. Ettersberg bei Weimar. Trias. IX. 158. Euganeen-Gebirg (Venetien). Neocom-Petrefacte. I. 189. Europa (Dumont's geologische Karte von). VIII. 804. — Erz-Lagerstätten (Zonen der). VII. 180, 181. — Kohlen-Statistik. III. a. 105, 107, 116. — Lagerung der Braunkohlen. III. a. 178. — (Papen-Ravenstein'sche Höhenschichten-Karte von). IX. 123, 124.

Falkenau (Böhmen). Braunkohlen-Becken. VII. 185, 328, 380; VIII. 495, 502. — Süsswasser-Gebilde (tertiäre). VIII. 466. 492. — Tertiäre Flora. IX. 548. Falljoch (Tirol). Alpenkalk. VII. 726. Fautsch (Steiermark). Marines Tertiäres. VII. 576. Fassa-Thal (Tirol). Mineralien. III. d. 31; IV. 160, 161. Feistritz (Krain). Crinoiden-Kalk. IX. 342. — Terrassen-Diluvium. VII. 689. — Tertiäres Becken. VII. 687; IX. 344, 345. Fella-Thal (Istrien). Guttensteiner und Hallstätter Kalke. VI. 744. Fellban-Graben (Kärnthen). Graphit im Granat-Glimmerschiefer. VI. 515. Felsöbánya (Siebenbürgen). Aphanit, Diorit und Porphyr. II. c. 166. — Bergbau. IV. 575. — Hüttenbetrieb. IV. 579, 623. — Erzvorkommen. VI. 163, 408. Feltre (Venetien). Schall-Phänomene am Monte Tomatico. IV. 559. Ferrezely (Siebenbürgen). Silberhütten. II. c. 157; IV. 584, 609, 612, 823. Fersina-Thal bei Trient. Profil. VIII. 300. Fichtelberg (Bayern). Torfmoore. III. a. 197. Fichtel-Gebirg (böhmisches). Basalt. VII. 531. — Erzführung. VII. 323, 367, 529. — Granit und Ur-Thonschiefer. VII. 320, 321, 515, 517, 522, 526. — Höhenmessungen. VIII. 511. — Nordwestliche Ausläufer. VII. 514, 526. — Verbindung mit dem böhmischen Erzgebirge. VIII. 21. Fiume. Magnetische Elemente. I. 230. Flachau (Salzburg). Tertiäres. V. 206. Fladnitz (Steiermark). Durchschnitt. IX. 225. Fläsch (Vorarlberg). Kalkgestein. X. 126, 127, 128, 129. Flamhof (Steiermark). Leitha-Kalk. VII. 590. Fleims (Tirol). Gymnit. I. 607; IV. 525. — Mineralien und Pseudomorphosen. II. c. 163. — Vorhauserit. VIII. 358. — Fleissen (Böhmen). Zinnober. VII. 530. Flitsch (Krain). Isonzo-Thal. IX. 324, 328, 341, 344. — Neogenes Conglomerat. IX. 345, 355. — Thal-Verengerung (Flitscher Klause). IX. 356, 357. Flötzberg (Böhmen). Basalt. VIII. 73. Florisdorf bei Wien. Erdbohrungen. I. 361, 362. Foen (Banat). Ackererden, Anal. III. d. 87, 88. Fogaras (Siebenbürgen). Magnetische Elemente. I. 431. — Sandstein. VIII. 790. — Ueber-Schwefelblei. V. 888, 889. Fohnsdorf (Steiermark). Braunkohlen-Flötze. IV. 172. — Fossile Flora. IV. 176. — Schwefel-Arsen in Braunkohle. IV. 109, 173. Folla (Lombardie). Subapennines. IX. 496. Forni di sotto (Venetien). Hallstätter Cephalopoden-Dolomit. VII. 443, 444. Frammont (Elsass). Scheelit. IV. 159. Franken. Aequivalente der St. Cassian-Schichten. X. 22. Frankenstein (Grossherzogthum Hessen). Magnetisch-polarer Serpentin. VIII. 806. Frankreich. Ackerbau Geologie. I. 141. — Cement. VII. 155, 371; X. Anh. 43, 44. — Dachschiefer-Zolltarif. I. 452. — Eisen-Production. III. a. 108. — Kohlen-Statistik. III. a. 105, 106, 107 125. — Magnesia-

Gewinnung aus Dolomit. VI. 71. — Schieferbrüche. VII. 477. — Topographische und geographische Arbeiten. IV. 293. — Torf (gepresster). VII. 156; X. Anh. 68. — (Südwestliches). Faluns. I. 587. Franz (Steiermark). Profil. X. 169. Franzensbad bei Eger. Geologischer Bau. I. 685. — Mineral-Moor. VIII. 487. — Mineralquellen. VIII. 488. — Süsswasser-Tertiäres. VIII. 477. Frauenberg (Steiermark). Leitha-Kalk. VII. 593. Freiberg (Mähren). Basalt und Diorit. I. 554; III. c. 130. Freibühel (Steiermark). Petrefacte des Leitha-Kalkes. VI. 351; VII. 588. Freistadt (Nieder-Oesterreich). Granit. IV. 253. Fresen (Steiermark). Erzführender Glimmerschiefer. VIII. 276. Freudenhain (Böhmen). Kohlengebilde. IX. 425. Freudenthal (Oesterreichisch-Schlesien). Steinbrüche. V. 394. — Vulcan (erloschener). IX. 14, 16, *V.* 49, 50. Freiberg (K. Sachsen). „Berg- und Hüttenwesens (Bedeutung des) gegenüber der Eisenbahn-Frage.“ VI. 197. — Erzvertheilung auf den Gängen. VI. 197; IX. *V.* 39. — Magnetische Beobachtungen. I. 482, 492, 493. — Sammlung von Gangstufen. VI. 162, 175. Fribus (Böhmen). Aufgelassener Zinn-Bergbau. VIII. 57. Friedek (Oesterreichisch-Schlesien). Kreideschicht mit Baculiten. III. d. 33. Friedland (Böhmen). Granitit. IX. *V.* 110. — Neogenes. X. *V.* 62, 63. Friesach (Kürnthen). Kalk mit Eisenlagern. VI. 518, 519. Friese-Thal (Mähren). Kreidegestein. X. 230. — Torf. X. 231, 232. Fuchswiese (Böhmen). Granit. VI. 20. Füllendorf (Nieder-Oesterreich). Gyps. II. a. 28. Fünfhunden (Böhmen). Braunkohlen-Gebiet. IX. 529. Fünfkirchen (Ungarn), Eisenerze. III. d. 116; VIII. 617, 805. — Kohlen-Formation. III. d. 142; IX. *V.* 111. — Magnetische Elemente. III. c. 122. — Steinkohlen. IV. 401. Füred (Ungarn). Werfener Schichten. VII. 197. Fürstenfeld (Steiermark). Geologischer Bau. VI. 267. — Säulenförmiger Basalt. VI. 275. Furt (Nieder-Oesterreich). Töpferthon mit Sand und Kyanit. IV. 276. Fuscher Thal (Salzburg). Geologischer Bau. V. 229. Fuschl (Salzburg). Knochenhöhle (Ixloch). VIII. 786.

Gafalina-Kopf (Vorarlberg). Durchschnitt. X. 121. Gaffal-Joch (Vorarlberg). Trias auf Lias und Flysch. X. 117. Gagliano (Venetien). Quecksilber-Bergbau. VI. 810. Gaierle (Böhmen). Granit. V. 301. Gail-Thal (Kärnthen). Geologischer Bau. VII. 405, 420, 421. — Höhenbestimmungen. VII. 675. — Steinkohlen-Formation. VII. 340, 372, 374, 406, 424, 427. — Terrassen-Diluvium. VII. 646, 647. Gainfahren bei Wien. Tertiäre Schichten. II. d. 106. Gairach (Steiermark). Fossiler Hai. II. a. 149. Gaisberg bei Gratz. Uebergangs-Kalk. VII. 239. Galbina (Siebenbürgen). Kalkgestein. VIII. 108, 713. Galena (Nord-Amerika). Blei-Bergbau. VII. 794, 796. Galizien. Asphalt, Proben. X. Anh. 32. — Bernstein. VIII. 177, 178. — Eisenerze, Anal. X. Anh. 18. — Fossile Säugthiere. VIII. 150, 764, 815; X. *V.* 52. — Gyps-Formation. IX. 144, 145. 149, 157. — Höhenmessungen. III. b. 133, 134; IV. 121; X. 345. — Kohlen, Proben. X. Anh. 53. — Verordnung über Verwaltung des Bergregales in). VI. 912. — Zink-Erze, Probe. X. Anh. 28. — (östliches). Braunkohlen. II. c. 165. — — Eisenstein-Lager der Karpathen. VI. 182, 183. — — Geologische Untersuchungen. II. a. 85; X. *V.* 123, 124, 128. — (westliches). Blauer Thon. IX. 157, 158. — — Erdöhl. X. *V.* 183. Galignana (Istrien), Lithographischer Kohlenschiefer. IX. *V.* 123. Galszécs (Ungarn). Lignit im Trachyt-Tuff. X. 449. Galtenhof (Böhmen). Granit. VI. 761. Galzein (Tirol). Durchschnitt bis zum Thaurer-Joch. IX. *V.* 101. Gamlitz (Steiermark). Marines Tertiär-Conglomerat. VIII. 285. Gampertòn-Thal (Vorarlberg). Profil. X. 122, 123, 125. Gamskar-Kogel bei Gastein. Magnetische Elemente. I. 66. Gandina-Thal (Lombardie). Geologischer Bau. VI. 889. Garda-See. Nummuliten-Schichten. IX. 496. Gardone (Lombardie). Ammoniten. IX. 486. Gastein (Salzburg). Fürstenquelle. III. a. 197. — Geologische Verhältnisse. V. 229. — Mineralien und Gebirgsarten. V. 429. — (Wildbad). Heilquellen (Temperatur, Wassermenge und Seehöhe der). VII. 316. — Neuer Quellenstollen im Jahre 1856. VII. 307, 316, 608. Gauderndorf (Nieder-Oesterreich). Tertiäres. II. a. 112. — Tertiär-Petrefacte. I. 668. Gaunersdorf (Nieder-Oesterreich). Cerithien-Schichten. II. a. 116; III. d. 20. Gaya (Mähren). Braunkohlen-Flötze. IV. 47. Geiersberg (Böhmen), Torf. III. a. 158; X. Anh. 66, 67. Geiselstein im Vogelsberge. Magnetisch-polarer Basalt. VIII. 691, 807, 808. Georgensdorf (Böhmen). Porphyrzug. VIII. 555. — Silber-Bergbau. VIII. 584. Gerlos-Thal (Salzburg). Gneiss (metamorphischer). V. 779. — Gneiss, Kalk und Thonschiefer. V. 797. Gerwald-Graben (Salzburg). Werfener Schichten und Dolomit. V. 151. Geschlief-Graben (Ober-Oesterreich). Nummuliten-Schichten. IX. 116. Gesenk (mährisches). Geologischer Bau. V. 87, Gewitsch (Mähren). Tertiäres. V. 744, 750, 757. Giesshübel bei Wien. Randgebirg des Wiener Beckens. X. 257. Girgenti (Sizilien). Tertiäre Petrefacte. V. 218. Giudecca bei Venedig. Rothschild'sche Cement- und Asphalt-Fabriken. VII. 756, 760. Glan-Fluss (Kärnthen). Höhenbestimmungen. VI. 146. Glaselsdorf (Mähren). Sandstein der obern Kreide. V. 711 Glashütten (Böhmen). Granat und Pistazit im Kalk. VI. 37. — Mandelstein. VI. 612. — Magneteisen. VI. 616. Glatz-Berg (Böhmen). Basalt. VII. 512, 513. — Granit. VII. 509. Gleichenberg (Steiermark). Basalt. VI. 273, 292. — Fossile Flora. VI. 285, 287,

288, 289, 290. — Leitha-Kalk. VI. 291. — Magnetisches Elemente. I. 226. — Trachyt. VI. 267, 268, 292. — Tuffe und Conglomerate. VI. 273, 281, 293. Gleichenberger Graben (Bayern). Alpenkalk. IV. 90, 99. Gleirs-Thal (Tirol). Dolomit. VI. 337. Gleisdorf (Steiermark). Säugthier-Zähne. VIII. 365. Glodnitz-Thal (Kärnthen). Terrassen-Diluvium. VI. 557. Gloggnitz (Nieder-Oesterreich). Acerotherium incisivum. VII. 609, 610. — Braunkohle. I. 616. — Höhenmessungen. III. c. 106. — Lignit-Flötze. V. 519, 520. — Magnesit-Spath in Massen. III. d. 145. — Weissstein (Forellenstein). V. 491. Glosche (Steiermark). Eisenstein-Lager. X. 206. Gmünd (Kärnthen). Magnetische Elemente. I. 67. Gmunden (Ober-Oesterreich). Aeltere Beobachtungen über magnetische Declination. I. 510. Göding (Mähren). Braunkohlen. IV. 150. — Cokes. IV. 646. Göhlwand (Bayern). Jura und Neocom. VIII. 150. Göhren (Böhmen). Bergbaue. VIII. 585. Göllnitz (Ungarn). Erzführendes Schiefergebirg. IX. *V.* 83; X. 548. Gömör (Ungarn). Eisensteine. VII. 806. — Erz-Lagerstätten. X. *V.* 39. — Geologische Aufnahme. X. 535. Gönez (Ungarn). Vulcanische Tuffe. X. 442. Görkau (Böhmen). Kohlenführendes Tertiäres. IX. 528. Görschitz-Fluss (Kärnthen). Höhenbestimmungen. VI. 147. Görz. Isonzo-Thal. IX. 324, 346, 347, 356. — Magnetische Elemente. I. 228. Görz und Gradisca. Geologische Aufnahme. VII. 629; IX. 324, 346, 356. — — Höhenmessungen. III. a, 41, 48. Gössling (Nieder-Oesterreich). Gyps. II. a. 30. Göttweih (Nieder-Oesterreich). III. c. 102. Goldenhöhe (Böhmen). Bergbaue. VIII. 43, 59, 61. Goldenkron (Böhmen). Gneiss und Kalk. V. 60. — Serpentin. V. 24, 25. Golling (Salzburg). Magnetische Elemente. I, 74. Golrad (Steiermark). Eisenstein-Lager. II. a. 155; III. a. 4. — Gyps. II. a. 32. Gonobitz (Steiermark). Eisenstein-Lager. X. 207. — Profil. X. 208. — Rudisten-Kalk, VIII. 442. Gonten (Schweiz). Dopplerit. I. 306. Gosau (Ober-Oesterreich). Cephalopoden. IX. *V.* 75. — Cerithien. II. a. 149. — Entomostraceen und Foraminiferen. II. d. 169. — Fische (fossile). II. a. 143. — Gasteropoden. II. b. 168; IV. 111, 394. — Geologischer Bau. II. d. 52; III. b. 162. — Polyparien. II. a. 160. Gossendorf (Steiermark). Tertiäre Sandstein-Flora. VI. 287. Gotha. Kiefernholz mit Eisen-Oxyd imprägnirt. VIII. 730. — Mineralogische Section der Naturforscher-Versammlung. III. a. 153. Gottschee (Krain). Diluvium. IX. 248, 249. — Kreidegebilde. IX. *V.* 69, 70. Neogene Kohlengebilde. IX. 371, 374, 375, 394, 395. — Schichtenspaltungen. IX. 260, 261. Grafengrün (Böhmen). Krystallinischer Kalk in Glimmerschiefer. VII. 484, 489. Gran (Ungarn). Braunkohlen-Flötze. IV. 140, 151; X. 497, 499, 506. — Geologischer Bau. X. 483, 484, 490, *V.* 57, 58. — Tertiäres. IV. 403. Graner Comitat (Ungarn). Höhenmessungen. X. 69. Grange aux Bois (Frankreich). Agronomisch-geologische Beschreibung. I. 130. Granz (Nieder-Oesterreich). Weissstein. III. c. 41. Graseck (Bayern). Schwarzer Halobien-Kalk. VII. 379. Grasselt (Böhmen). Tertiär Flora. IX. 547, 548. Grasslitz (Böhmen). Bergbaue. VIII. 43, 48. Gratz. Clymenien und Orthoceratiten. VII. 241. 242. — Geognostisch-montanistischer Verein. I. 171, 173; V. 228, 437; VI. 171; VII. 177. — Geologische Aufnahme. VII. 219. — Kalk-Breccie der Steinberge. V. 563, 564. — Magnetische Elemente. I. 226. Mineralien-Sammlung des Joanneums. VII. 185. — Säugthier-Zähne. VIII. 365. — Tertiäres und Diluvium. VII. 535, 559, 560. — Uebergangs-Gebirg des Plawutsch. VII. 238. Gratzer-Feld. Diluvialer Schotter und Lehm. VII. 596, 599, 602. Gratzspitz (Salzburg). Dachstein- und Lias-Kalke. II. c. 112. Grebenzen (Steiermark). Kalkgebirg. V. 347; VI. 521; VII. 57, 58. Greifenstein bei Wien. Eocener Wiener Sandstein. IX. 123, 126; X. 262, 271, *V.* 5. Gresten (Ober-Oesterreich). Lias-Kalk. IV. 739, 740, 742, 743, 784. Greuth (Steiermark). Kalk und Uebergangs-Schiefer. V. 349, 350. — Schotter. VII. 64. Grintouz-Gebirg (Krain). Geologischer Bau. VIII. 219, 406; IX. 126, 127. Grinzing bei Wien. Tertiäres. II. a. 107. Grobelnig (Steiermark). Schotter-Terrasse. VIII. 456. Grobniker Feld (Croatien). Rother Diluvial-Lehm. X. 341. Grötsch (Steiermark). Tertiäres. VII. 579, 580. Groisbach (Nieder-Oesterreich). Gyps. II. a. 28, b. 107. Grossarl (Salzburg). Geologischer Bau. V. 229. Grossau (Nieder-Oesterreich). Eratischer Gneiss. IX. 110. — Kohlenführender Keuper und Lias. II. b. 155. Gross-Britannien. Fauna und Flora (jetztzeitige und vorweltliche). IX. 575, 592, 621, 636. — Geologische Aufnahme. IV. 839. — (Greg's und Lettsom's Werk über die Mineralogie von). IX. 66. — Kohlen-Statistik. III. a. 105, 106, 107, 116. — Roh- und Gusseisen-Production. III. a. 108. — Tiefen-Regionen des Meeres. IX. 609, 612. — Topographische und geographische Arbeiten. IV. 291. Gross-Dolina (Krain). Neogen-Petrefacte. IX. 9. Gross-Dorn (Krain). Schiefer und Sandsteine. IX. 271, 272, 367. Gross-Glockner. Besteigung durch Stur. V. 882, 883; VI. 814. — Höhenbestimmungen. I. 125. Gross-Hassberg (Böhmen). Basalt. VIII. 605. Grossklein (Steiermark). Kohle (tertiäre). VIII. 283. — Tertiäres. VIII. 284. 285. Gross-Malenze (Krain). Neogener Kalk. IX. 376. Gross-Plattenberg (Böhmen). Granit. VIII. 22, 24. Gross-Schüttüber (Böhmen). Braun-Eisenstein und Sphärosiderit. VIII. 476. Gross-Spitzberg (Böhmen). Basalt. VIII. 605. Grosswardein (Ungarn). Braunkohlen-Schürfe.

X. *V.* 90. — Magnetische Elemente. III. a. 40. — Mineralquellen. X. *V.* 89. Gross-Weigelsberg (Steiermark). Bivalven-Tegel mit Braunkohle. VI. 299. Grottau (Böhmen). Neogenes. X. *V.* 62, 63. Grottenhofen (Steiermark). Sandstein des Leitha-Kalkes. VII. 593. Grün (Böhmen). Porzellanerde. VI. 37. Grünbach (Nieder-Oesterreich). Kreidekohle. II. a. 144. Grünthal (Böhmen). Rothliegendes auf Gneiss. VIII. 602. Grünten (Tirol). Durchschnitt. VII. 25. Grund (Nieder-Oesterreich). Tertiäre Petrefacte. I. 362; II. a. 111. Grundmühle (Böhmen). Roth-Eisenstein. VII. 512. Gügl (Böhmen). Plastischer Thon. IX. 402. Guggerlung (Ober-Oesterreich). Kohlenschichten des Keupers. I. 637. Guglitz (Steiermark). Marine Tertiär-Petrefacte. VII. 571, 572; VIII. 454. Gunstberg (Ober-Oesterreich). Durchschnitt. IV. 769. Gurdau (Mähren). Nummuliten-Schichten. IX. 111. Gurhof (Nieder-Oesterreich). Serpentin. IV. 271. Gurk-Fluss (Kärnthen). Ursprung und Verlauf. IX. 262, 263, 264. Gurk-Thal (Kärnthen). Kalkgebirge. IX. 260. — Terrassen-Diluvium. VI. 555, 557. Guttaring (Kärnthen). Tertiäres. VI. 187, 188. Gutenegg (Steiermark). Tertiäres Kohlenlager. VIII. 445. Guttenstein (Nieder-Oesterreich). Kalk-Alpen. IV. 178, 179, 183, 184, 722, 784. — Muschelkalk. IV. 722, 741. Gyügy (Ungarn). Kiesel-Travertin mit Schnecken. IX. *V.* 153.

Habach-Thal (Salzburg). Gletscher, V. 800. — Schiefer (aphanitische). V. 775. — Serpentin. V. 777. — Smaragde. V. 773, 774. Hab-Alpe (Steiermark). Eklogitischer Amphibolit. VII. 231, 232. Haberspirk (Böhmen). Braunkohlen führende Schichten. VIII. 495. — Lignitschichten. VIII. 504. — Sphärosiderit. VIII. 507. Habrau (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. IX. 527, 528. Hackenhäuser (Böhmen). Braun-Eisenstein im Gneiss. VII. 492. Häring (Tirol). Pflanzen der eocenen Kohle. I. 537, 683; II. d. 159, 160; IV. 849. Hagenau (Nieder-Oesterreich). Braunkohlen-Flötze. III. a. 189, b. 40; IX. 134. Hagenbach (Baden). Steinkohlen-Formation. VIII. 338. Haimburg (Nieder-Oesterreich). Geologische Karte. III. a. 177, d. 35. Haindorf (Böhmen). Granitit. IX. *V.* 110, 111. Hainfeld (Steiermark). Kohle der Grestener Schichten. IV. 740. Hainspach (Böhmen). Geologischer Bau. X. 365, 389, *V.* 15, 16. Halbmeil (Böhmen). Basalt. VIII. 80. — Turmalin-Granit. VIII. 14. — Zinn-Bergbau (alter). VIII. 60. Hall bei Admont. Pseudomorphosen nach Steinsalz. IV. 103. Hall (Tirol). Atmosphärische Niederschläge. I. 283, 284. — Berghauptmannschafts-Gebiet. VIII. 189. — Salzberg. V. 881; VI. 328, 338, 339; 345, 347, 349, 350. — Werfener Schiefer. X. 91. Hallbach-Thal (Nieder-Oesterreich). Durchschnitt. IV. 741. Hallein (Salzburg). Mangan-Erz. VIII. 763. — Salzgebirg. I. 241; V. 590, 593, 607, 608. — Steinsalz (blaues). II. b. 155. Hallstatt (Ober-Oesterreich). Cephalopoden (neue). V. 204. — Geologisches Profil. V. 196. — Keltische Grabstätten. I. 553. — Menschliche Gebeine. I. 352, 553. — Oberer Muschelkalk. IV. 721, 723, 725, 726, 727, 784. — Petrefacte. I. 159; III. a. 184. — Ramsauer'sche Sammlungen. II. b. 148, 177. — Reste jetztlebender Thiere. I. 355. — Salzberg. V. 197. — Werner-Säcularfeier. II. d. 26. Hals bei Passau. Granit. IV. 261, 262. Hamelica (Böhmen). Eklogit. II. b. 20. — Geolog. Bau. II. b. 13. — Hamelicit. VII. 320, 382. Hammerau (Bayern). Torfmoor. III. a. 196. Hamor (Ungarn). Erzführendes Schiefergebirg. IX. *V.* 83. Hongácz (Ungarn). Tertiäres. VII. 699. Hannover. Mineralien, Gebirgsarten und Petrefacte. II. d. 143. — (H. Römer's geologische Karte des Königreiches). IX. *V.* 40, 41. — Topographischer Atlas. IV. 299. Hargitta-Gebirg (Siebenbürgen). Trachyte. X. *V.* 133, 134. Harie (Krain). Concentrisch-schalige Kugeln von Sandstein. X. 323. Hartberg (Steiermark). Geologische Aufnahme. V. 437, 531. Hartenberg (Böhmen). Erzgänge. VIII. 46. Harz-Gebirg. Gebirgsarten. V. 643. — Magnetisch-polare Gesteine. VIII. 656, 657, 806. — Mineralien. IV. 168; V. 642; VI. 165. Hasbach-Thal (Nieder-Oesterreich). Quarz der Grauwacke. V. 509, 510. Haselbach (Böhmen). Lignit in Lehm und Schieferthon. VIII. 505. Hasel-Berg (Bayern). Marmor (rother). IV. 330, 331, 332, 339. Haslau (Böhmen). Egeran. VII. 519. Haspelmoos (Bayern), Torfmoor. III. a. 196. Hasreith (Steiermark). Meerischer Tegel und Sand. VII. 568, 569. Hassberg (Böhmen). Basalt. VIII. 605. — Roth-Eisenstein, VIII. 599. Hassenstein (Böhmen). Körniger Kalk. VIII. 564, 565. Hauenstein (Böhmen). Phonolith. VIII. 606. Hausbrünn (Mähren). Tegel. V. 750, 751. Hausruck-Wald (Ober-Oesterreich). Braunkohlen-Lager. VII. 164, 174. Hayd (Böhmen). Granitgebiet. VI. 793. — Quarzlager. VI. 795. Hechten-Höhe (Böhmen). Basalt. VIII. 73. Hegyallya (Ungarn). Miocene Flora. V. 202. — Tuffe und Miocenes. X. 445. Heidenberg (Böhmen). Trachyt. IX. 418. Heiligenblut (Kärnthen). Ansicht des Gross-Glockners. VI. 815. Heiligen-Geist (Steiermark). Werfener und Guttensteiner Schichten. VIII. 278, 279, 287. Heiligen-Kreuz (Krain). Tertiäres. IX. 369. Heiligenkreuz (Ungarn). Fossil-Flora. III. d. 127, 128; V. 229, 230. Heinrichsgrün (Böhmen). Gneiss. VIII. 17. — Granit. VIII. 5. Heinrichsdorf (Böhmen). Porphyrzug. VIII. 555. Heinzenberg (Tirol). Gangverschiebungen. I. 213. Heinzendorf (Mähren). Kiesel-Concretionen im Pläner. V. 718. Hengsberg (Steiermark). Meerischer Tegel und Sand. VII. 562, 563. — Tertiärer Schotter. VII. 562, 566. Heng-

stererben (Böhmen). Grünstein. VIII. 29. — Zinngänge. VIII. 55, 58. Hermannstadt. Geologischer Bau der Umgebung. X. *V.* 88, 180. — Magnetische Elemente. I. 431. — Naturwissenschaftliche Sammlungen. X. *V.* 87. Hermsdorf (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. IX. 424. Hernals bei Wien. Fische (fossile). III. a. 176, 177; b. 160, 161. — Schildkröten (fossile). IV. 178. Hessen (Grossherzogthum). Geognostische Karte. VIII. 797. Hessen (Kur-). Geologische Landesanstalt. IV. 421. Heveser Comitat (Ungarn). Braunkohlen-Ablagerungen. X. *V.* 64. Hieflau (Steiermark). Diluvial-Terrassen. I. 103. — Kreideschichten. I. 111. Hierlatz (Ober-Oesterreich). Lias-Schichten. IV. 752, 753, 784. Hinterburg (Steiermark). Uebergangs-Schiefer. V. 344. Hinterkotten (Böhmen). Amethyst in Quarzfels. VII. 482. Hinter-Zinnwald (Böhmen). Zinnführender Greisen. IX. 566. Hirschegger-Alpen (Steiermark). Krystallinisches Gebirg. VII. 223, 226. Hirschenstand (Böhmen). Quarzblöcke. VIII. 31. — Zinn-Lagerstätten. VIII. 53. Hirtenberg (Nieder-Oesterreich). Liassische Kalke. II. c. 19. Hirzenbichel (Steiermark). Tegel-Petrefacte. VII. 565. Hitmesgrün (Böhmen). Grünstein. VIII. 559. Hitzmann-Alpe (Steiermark). Werfener Schiefer. VIII. 437. Hliney (Böhmen). Schieferletten mit Braunkohle. IX. 427. Hlinnik (Ungarn). Süsswasser-Quarz. I. 360. Hluk (Mähren). Geognostische Aufnahme der Umgegend. IX. 53. Hochberg (Bayern). Molasse. II. a. 4. Hochenegg (Steiermark). Grüner Thonschiefer. VIII. 205, 432, 434. — Kalk und Dolomit. VIII. 435. — Lehm. VIII. 458. — Porphyr. VIII. 435, 436. Hochfellen-Berg (Bayern). Sandstein und Kalk. IV. 326. — Versteinerungen. IV. 328. Hochgern-Berg (Bayern). Profil. IV. 347, 349. Hoch-Gall (Tirol). Gneiss im Glimmerschiefer. VII. 410. Hoch-Golling (Central-Alpen zwischen dem Venediger und dem). V. 818. Hochleiten-Graben (Salzburg). Durchschnitt. II. c. 110. Hochofen (Böhmen). Eisenerz-Lagerstätten. VIII. 63, 64. Hochstraden (Steiermark). Basalt und Tuff. VI. 284. Hochtanne (Böhmen). Quarzblöcke. VIII. 31. Hoch-Tregist (Steiermark). Conglomerate der Kreide mit hohlen Geschieben. VII. 550. Hodritsch (Ungarn). Mineralien. IV. 183, 835. — Vulcan (erloschener). I. 159. Höchelmoos (Bayern). Molasse. II. a. 6, 15. Höflein bei Wien. Eocener Wiener Sandstein. X. 271. Högel (Bayern). Fucoïden-Formation. II. a. 20. Hönigsthal bei Gratz. Säugthier-Reste. VIII. 365. Hörnstein (Nieder-Oesterreich). Cephalopoden-Kalke. II. c. 27. Höttinger Graben (Tirol). Encriniten und Cidariten. VII. 729. — Rauchwacke. VII. 721, 723. — Werfener und Guttensteiner Schichten. VIII. 786. Hof (kais. Schlesien). Basalt und Grauwacke. IX. *V.* 49, 50. Hofgastein. Magnetische Elemente. I. 66. Hohenbogen (Böhmen). Amphibolschiefer. VI. 779. Hohenelbe (Böhmen). Kupfererze. X. 572. Hohenfreschen (Vorarlberg). Kreideschichten (neocome). VII. 21, 22. Hohenifer (Vorarlberg). Neocom. VII. 4, 7. — Caprotinen-Kalk. VII. 5. Hohenmauthen (Steiermark). Geologische Aufnahme. VII. 219. Hohenstadt (Mähren). Fossile Pflanzen. IV. 185. — Magnet-Eisenerz. X. 232. Hohenwald (Böhmen). Gneissgebirg. X. 367. Hohenzollern. Achenbach's „Geognostische Beschreibung". VIII. 803. Hoher Dachstein (Ober-Oesterreich). Rother Thon mit Quarzkörnern. V. 439. Hohlstein (Böhmen). Granit. VII. 481. Holai-Kluk (Böhmen). Flora des Basalt-Tuffes. IX. 403, 546. — Phonolithartiger Trachyt. IX. 413, 417. Holkowitz (Böhmen). Granit in Blöcken. VI. 467. Hollersbach-Thal (Salzburg). Grüne Schiefer. V. 789. — Thalbildung. V. 800, 801. Hollersberg (Böhmen). Amphibolschiefer mit Serpentin. VI. 759. Hollewing (Böhmen). Brauner Glaskopf in zersetztem Amphibolit. VI. 806. Hollingsteiner Berg (Nieder-Oesterreich). Eocener Kalk. IX. 112. — Erratische Blöcke. IX. 109. Holzberg (Böhmen). Erzgänge. VIII. 570. — Ur-Thonschiefer. VIII. 539, 540. Homberg (Kärnthen). Gneissschotter. VI. 554. Homonna (Ungarn). Kössener Schichten. IX. *V.* 97. Honnersdorf (Böhmen). Schichtenfolge des Tertiären. VIII. 480. Honther Comitat (Ungarn). Braunkohlen-Ablagerungen. X. *V.* 64. — Geologische Aufnahme. IX. *V.* 114; X. *V.* 55. — Mineralquellen. IX. *V.* 152. Horaždiowitz (Böhmen). Gang-Granit. V. 312; VI. 481. — Geologischer Bau. V. 271; VI. 481. — Gneiss. VI. 485. — Krystallinischer Kalk. V. 288. Horka (Mähren). Ammoniten-Kalk des Jura. V. 684. Horn (Böhmen). Erzgänge. VIII. 47. — Sphärosiderit. VIII. 72. Horn (Nieder-Oesterreich). Höhenmessungen. III. c. 101. — Magnetische Elemente. III. a. 40. Hornwand (Mähren). Kohle des Quaders. V. 727. Horodenka (Bukowina). Kreide-Gesteine auf altem Roth-Sandstein. IX. 155. Hořowitz (Böhmen). Eisenerze, Anal. IV. 399. Hoslau (Böhmen). Serpentinfels. VI. 791. Hostitz (Böhmen). Kalk und Gneiss. V. 293. Howoran (Mähren). Braunkohlen-Flötze. IV. 46. Hradez (Böhmen). Kalk, Granit und Gneiss. V. 291. Hradischt-Berg (Böhmen). Quarzit. VI. 612. Hradischer Kreis (Mähren). Höhenmessungen. IX. 27. Hrastnigg (Steiermark). Kohlengebirge. II. c. 11; X. 181. — Steinkohlen, Proben. X. Anh. 60. Hromitz (Böhmen). Gediegen Kupfer auf Vitriolschiefer. VII. 608. — Tagbau auf Vitriolschiefer. VI. 602. Hrosenkau (Mähren). Basalt. IX. 61, 62, 79. — Trachyt. IX. 73. Hrubschitz (Mähren). Bitterkalkspath. VI. 98. Hruschau (Mähren). Lepidodendron. VII. 608. — Eruptives Gestein im

Kohlengebirg. VIII. 162; IX. *V.* 37. Hruschitze (Krain). Rudisten. IX. 354. Htričo Podhrady (Ungarn). Petrefacte des Klippenkalkes. X. *V.* 77. Hub (Salzburg). Thon-Eisenstein im Neocom. V. 385. Hubenau (Böhmen). Basaltberg. VI. 609. Hüttenberg (Kärnthen). Braun-Eisenstein. V. 185; VI. 639. — Lagerzug von Eisenstein in Glimmerschiefer. VI. 518, 619, 643. Hüttenhof (Böhmen). Turmalin-Granit und Gneiss. IV. 135. Huminetz-Berg (Mähren). Höhenbestimmungen. IX. 26, 33. Hundskogel bei Wien. Guttensteiner Kalk. VI. 201, 202; X, 257. Husslhof (Tirol). Thon-Glimmerschiefer. VII. 718. Hutberg (K. Sachsen). Amygdalophyr. IV. 647.

Jäger-See (Salzburg). Kalk und Dolomit. V. 813. Jakobau (Mähren). Psilomelan. IV. 97. Jakobény (Bukowina). Magnetische Elemente. I. 432. — Kalk des Glimmerschiefers. VI. 108, 109. — Lager von Eisenerzen. VI. 115, 116, 117. Jalowžin (Böhmen). Schichtenfolge des Steinkohlen-Gebirgs. VII. 264. Jamnig (Steiermark). Glanzkohle. VIII. 281. Jamnitza (Croatien). Mineralquelle. VII. 201, 202. Jamsky-Teich (Böhmen). Granit in Blöcken. VI. 467. Jarz-Kogel (Steiermark). Krystallinisches Gestein. VIII. 278. Jasienika (Galizien). Steinkohlen, Probe. X. Anh. 53. Jasloër Kreis (Galizien). Lager von Eisenerz im Karpathen-Sandstein. VII. 836. — Naphtha-Quellen. X. *V.* 183. Jauling (Nieder-Oesterreich). Jaulingit. VI. 404. — Mastodon angustidens. IV. 711. — Tegel. IV. 713. Jauerburg (Krain). Dolomit des obern Kohlenkalkes. VII. 653, 660. — Raibler Schiefer mit Lagern von Spath-Eisenstein. VII. 369, 638, 639, 659. Java. Geologische Beschaffenheit. IX. 290, 291, 293, 294. — (Nachrichten der Novara-Expedition aus). IX. *V.* 102. Jawornik-Berge (Mähren). Höhenbestimmungen. IX. 25, 26, 28, 31, 34. Jaworzno (Galizien). Steinkohlen-Formation. VII. 385. — Steinkohlen, Probe. X. Anh. 53. Idria (Krain). Anthracit. VIII. 12. — Eocenes. IX. *V.* 18. — Geologische Verhältnisse. VI. 422; VII. 838, 839; VIII. 211, 219, 220, 221. — Petrefacte. IV. 864; IX. *V.* 18. — Quecksilber-Lagerstätten. VIII. 385, 760, 761. — Kreidegebilde. VII. 839; VIII. 220, 221. Idritza-Thal (Krain). Dolomit. IX. 361. — Mergelschiefer und Caprotinen-Kalk. IX. 362. — Obere Trias. VIII. 216. — Werfener und Guttensteiner Schichten. VIII. 218; IX. 338. Jeckelsdorf (Ungarn). Erzführendes Schiefergebirg. IX. *V.* 83. Jedownitz (Mähren). Petrefacte der Hornstein-Concretionen im Jurakalk. V. 690. Jegla (Steiermark). Intermittirende Quelle. VIII. 460. Jelenje (Croatisches Küstenland). Nummuliten-Kalk. X. 336. Jelouza (Krain). Bohnerze. VII. 688. — Dachstein-Schichten. VIII. 219. — Hierlatz-Schichten. IX. 331. Jepa-Alpe (Kärnthen). Guttensteiner Schichten. VII. 637. — Trias. VII. 649. Jeschken-Gebirg (Böhmen). Gebirgsbau. X. 368, *V.* 16. — Geologischer Bau. X. 381, *V.* 16. Jessenigbauer (Kärnthen). Kössener Petrefacte. VII. 336. Iglau (Mähren). Magnetische Elemente. I. 425. Igló (Ungarn). Werfener Schiefer mit Gyps. X. *V.* 20. Jinin (Böhmen). Krystallinischer Kalk. V. 292. Jitschiner Kreis (Böhmen). Schürfungen im Kohlengebirg. IX. 241, 242, *V.* 57. Illova (Militärgrenze). Lager von Roth-Eisenstein. VII. 382, 383, 607. Illyrien. Marmor-Sorten. II. a. 99. — Geognostische Aufnahme. VI. 265, 741. Ill-Thal (Vorarlberg). Profile. X. 121, 135. Ilz (Steiermark). Braunkohlen-Gebilde. V. 558. Ilmersberg (Böhmen). Basalt. VIII. 73. Imberger Horn (Vorarlberg). Durchschnitt. VII. 25. Imola (Kirchenstaat). Tertiäre Petrefacte. IV. 181, 182. Imst (Tirol). Arlberg-Kalk. X. 100. — Magnetische Elemente. I. 73. — Sandstein (rother) der Trias. X. 92. Indien (Niederländisch-). Bergwesen. IX. 277, 278, 280, 281, *V.* 122, 123. — Braunkohlen. IX. 173. — Geognostisch-montanistische Aufnahmen. IX. 284. Inn-Kreis (Ober-Oesterreich). Höhenbestimmungen. VI. 842, 846. Innsbruck. Conglomerat. VI. 330; VIII. 780. — Geologie der Umgebung. VIII. 786, 795, 802; IX. *V.* 100, 101. — Magnetische Elemente. I. 73. — Pflanzen (fossile). VIII. 367, 780. — Thon-Glimmerschiefer. VII. 718. Inn-Thal. Diluvium. VII. 737. — Geologische Beschaffenheit in Tirol. VI. 328; VIII. 787. — Metamorphe Guttensteiner Kalke. VII. 718. Inecken (Istrien). Eocenes Hügelland. X. 288. Inner-Oesterreich. Geognostisch-montanistischer Verein. I. 171, 172, 173; II. a. 138; IV. 428; V. 228; VI. 170. Innzell (Bayern). Unterer Kalk und Dolomit des Rauschenbergs. VI. 896. Inzersdorf bei Wien. Miesbach'sche Ziegelwerke. II. a. 147, 148, b. 80, 86. — Petrefacte. II. a. 147, 148, 157, b. 83, 86. — Tegel. II. b. Tabelle zu 82. Joachimsthal (Böhmen). Basalt. VIII. 165. — Benützung der beim Rösten verflüchtigten Metalle. V. 430, 431. — Berg- und Hütten-Producten (Ertrag von). VIII. 37. — Eliasit. III. d. 124. — Erzgänge. IV. 556; VIII. 32, 33, 36, 77, 569. — Erzgebirgs (Bau des). VIII. 165. — Felsit-Porphyr. VIII. 554. — Grünstein. VIII. 29, 559. — Körniger Kalk. VIII. 28. — Lindakerit und Lavendulan. IV. 552. — Magnet-Eisenstein. VIII. 63. — Mineralien (neue). IV. 220; VII. 195, 196. — Porphyr. VIII. 26. — Rittingerit. III. d. 121. — Secundäre Gebilde auf Gängen. VII. 839. — Silbererz-Anbrüche des Geisterganges. V. 630; VI. 163; VII. 166. — Urangelb-Fabrication. IV. 427, 428. — Versetzung der Berghauptmannschaft nach Komotau. III. c. 161. — (Vogl's Schrift über Gänge und Mineralreichthum von). VIII. 369. — Werner-Säcularfeier. II. d. 19. — Zugutebringung der reichen Silbererze. V. 611; VI. 871. Johannes-Berg bei Ofen.

Dolomitischer Kalk. VIII. 311, 312; X. 495. — Tuff (diluvialer) über Tegel. VIII. 322. Johannes-Hütte am Venediger. IX. V. 53. Josephi-Berg (Steiermark). Profil der Gailthaler Schichten, Porphyre und Tuffe. X. 195. Irland. Fauna (jetztlebende). IX. 580, 581, 583. — Flora (jetztlebende). IX. 578, 579, 586. — Glaciale Gebilde. IX. 619. — Riesenhirsch. IV. 861; VI. 198, 318; VII. 161. — Steinkohlen-Gebiete. III. a. 123. Isar (bayerische Alpen zwischen der Salzach und). VIII. 146. Isar-Thal (bayerisch-tirolisches). Mittleres Gefäll. II. b. 50. Ischl. Blödit und Löweït. VII. 605. — Magnetische Beobachtungen (ältere). I. 510. — Magnetische Elemente. I. 75. — Soolen-Rückstände, Analyse. X. Anh. 77. Isel-Thal (Tirol). Geognostischer Bau. VII. 405. Iseo-See (Lombardie). Dachstein-Kalk. IX. 478. — Geologischer Bau der Ufer. VI. 892; IX. 478, 490. — Muschelkalk. VI. 896. Iser-Gebirg (Böhmen). Oberflächen-Gestaltung. X. 365, 367. — Geologischer Bau. X. 370, V. 15. Iser-Wiese (Böhmen). Iserin. IV. 832. — Sand (goldhältiger). IV. 833. Island. Okenit. V. 190, 191; X. Anh. 12. Isonzo-Thal (Istrien). Geognostische Aufnahme. VI. 742, 743; IX. 324, 347, 355, 361, 362, 364. — Neogenes. IX. 355. Isola bella (im Lago Maggiore). Magnetische Elemente. I. 70. Istrien. Asphalt-Lager. II. d. 137, 138. — Eocenes. X. 272. — Geologische Aufnahme. IV. 223; X. V. 193. — Höhenmessungen. III. a. 50. — Kohlen-Formation (eocene). II. d. 138; X. V. 49, 118. — Marmor-Sorten. II. a. 100. Italien. Marmor-Sorten. II. a. 91, 92. — Rhinoceros-Arten (fossile). VI. 200. — (Mittel-). Subapennine Petrefacte. IV. 638. — — Pflanzenabdrücke. IV. 648. Judenburger Kreis (Steiermark). Geologische Aufnahme. IV. 848. Judendorf (Steiermark). Braunkohlen-Gebilde. VII. 39. — Tertiäres. VII. 42. Jugelstein (Böhmen). Basalt. VIII. 75. Jung-Bunzlau (Böhmen). Kreidegebilde des Iser-Thales. X. V. 97, 115. Jung-Smolinowetz (Böhmen). Serpentin. VII. 110. Jung-Woschitz (Böhmen). Geologie der Umgebung. IX. 661, 672, 673. — Amphibolit (Granate führender) und Pegmatit. IX. 672, 673. Ivanda (Banat). Mineralquelle. IV. 700; X. Anh. 68. Iwanowice (Galizien). Petrefacte des Plänerkalkes. I. 251, 252. Ixloch (Salzburg). Knochenhöhle. VIII. 789.

Kaaden (Böhmen). Grünerde. VII. 845; IX. 435, 436. Kärnthen. Blei (silberhältiges), Probe. X. Anh. 16. — Braunkohle, Probe. VI. 156. — Eisenerze, Probe. X. Anh. 18. — Geologische Aufnahme. VI. 508, 859, 883, 897, 902, 907; VII. 629. — Geologische Karte. VII. 386. — Höhenmessungen. III. a. 62; VI. 567, 909; VII. 675; IX. 160, 164. — Kohlen, Probe. X. Anh. 54. — Muschelmarmor und bleiführender Kalkstein. V. 212, 213. — (Mittel-). Geologische Aufnahme. VI. 508. — — Tertiäres und Diluvium. VI. 416. — (nördliches). Geologische Aufnahme. V. 254, 445, 879, 880; VI. 201. — — Krystallinisches Gebirg. V. 885. — (nordöstliches). Geologische Aufnahme. V. 882; VI. 167, 168. — — Höhenbestimmungen. VI. 142. — — Kreide und Eocenes. VI. 187, 188. — — Krystallinischer Kalk und Eisenstein. VI. 198, 199. — — Krystallinische Schiefer. VI. 194, 414. — (östliches). Geologische Durchschnitte. VII. 332. — — Trias. V. 893. — (südöstliches). Alpiner Jura und Lias. VII. 193. — — Bleierz-Lagerstätten. VII. 369, 370. — — Gailthaler (Steinkohlen-) und Trias-Formation. VII. 374. — — Höhenbestimmungen. VI. 153; VII. 346. — — Krystallinische Schiefer- und Massen-Gestein. VII. 365. — — Tertiäres. VII. 175. — (Unter-). Geognostische Verhältnisse. VI. 166. Kaffberg (Steiermark). Zinkblenden, Probe. VIII. 155. Kahlenberger Dörfel bei Wien. Inoceramus. IV. 637. — Kalkstein (hydraulischer). X. 267. Kahreck (Vorarlberg). Profil. VII. 28. Kainach-Thal (Steiermark). Basaltschlacken. IX. V. 109. — Diluvialer Lehm. VII. 601, 602. — Tertiär-Becken. VI. 872; VII. 567. Kainisch (Steiermark). Dopplerit in Torf. I. 306. Kaisersberg (Nieder-Oesterreich). Graphit. V. 868. Kaiserwald-Gebirg (Böhmen). Geologische Verhältnisse. VII. 493, 494, 509. — Gneiss- und Serpentin-Gebirg. II. b. 31. — Metallische Lagerstätten. VII. 367. 368. Kakowa (Banat). Meteorit. IX. V. 110. Kalamaki (Griechenland). Subfossile Seethiere. VII. 173. — Solfatare. IX. V. 87. Kalembitz (k. k. Schlesien). Amphibol-Diorit. IV. 314, 315. — Aphanit-Mandelstein. IV. 317, 318. Kalich (Böhmen). Körniger Kalk. VIII. 565. — Porphyr im rothen Gneiss. VIII. 554. — Quarzstock. VIII. 567, 568. Kalinka (Ungarn). Schwefellager. I. 157. Kalkberg (Steiermark). Körniger Kalk. V. 347. Kalksburg bei Wien. Tertiäres. X. 257, 259. Kallwang (Steiermark). Geognostische Verhältnisse. IV. 429. — Magnetische Elemente. I. 224. Kalniker Gebirg (Croatien). Geologische Beschaffenheit. IV. 550. Kaltenleutgeben bei Wien. Wiener Sandstein und Eocenes. IX. 108; X. 260, 261. Kaltenlutsch (Mähren). Quader. V. 725. Kalusz (Galizien). Steinsalz (blaues). IX. 175. Kamenitz (Böhmen). Brauneisenstein-Lager. IX. 245. Kamiana-Berg (Ungarn). Schichtenfolge des Karpathen-Sandsteins. X. 423. Kaming-Graben (Kärnthen). Schotter und Grus. VI. 551, 552. Kaminski-Mühle (Steiermark). Porphyr. VIII. 433. Kammerbühel (Böhmen). Vulcanische Gebilde. VII. 533. Kammerkahr (Tirol). Kalkgebilde. IV. 366. Kamnitza-Hügel (Krain). Fossile Säugthiere. IX. V. 158, 159. Kamp-Alpe (Steiermark). Gebirgssenkung. IV. 475. Kanisa (Banat). Magnetische Elemente. III. c.

123. Kanker-Thal (Krain). Geologische Beschaffenheit. VII. 663. Kapellen (Steiermark). Miocenes. I. 104. Kapnik (Siebenbürgen). Berg-Commissariat. X. 145. — Hüttenprocess. IV. 584, 614. — Kalkspath- und Quarz-Stufen. IV. 834. — Miocenes. X. 457. Kappel (Kärnthen). Petrefacte. IX. *V.* 59. Kappel (Steiermark). Secundäres Conglomerat. VIII. 279, 280. Kappolska Planina (Steiermark). Uebergangs- und Werfener Schiefer. VIII. 420. — — Werfener Schiefer. VIII. 436. Kaprun (Salzburg). Thalbildung. V. 802. Kapsdorf (Ungarn). Melaphyr. X. *V.* 57. Karansebes (Militärgrenze). Magnetische Elemente. III. c. 121. Karasch-Fluss (Banat). Waschgold. IX. *V.* 16. Karasch-Thal (Banat). Gneiss und Granit. VI. 229. Karavanken-Gebirg (Kärnthen). Geologischer Bau. VII. 629, 630. — Oestliche Ausläufer. VIII. 206, 407. Karbendel-Thal (Tirol). Geologischer Bau. VI. 333, 336. Kariuscheg (Steiermark). Blei-Bergbau. VIII. 433, 434. Karlsbad. Geologische Verhältnisse. VI. 88, 906. — Göttl's Sinterbilder. V. 894; VI. 195. — Granit. VI. 906, 907. — (Hochstetter's Schrift über). VII. 825, 826. — Magnetische Elemente. III. a. 41. — Militär-Badhaus-Quelle. V. 142, 143. — Schwerspath als Quellenabsatz. IV. 864; V. 142. — Sprudel-Ausbrüche. VII. 202, 203. Karlsbader Gebirg (Böhmen). Basalt. VII. 329. — — Granit (zinnführender). VII. 319, 323, 496, 497. — — Höhenbestimmungen. VII. 147. — — Serpentin. VII. 322. — — Westliche Ausläufer. VII. 494, 505. — — Zinnerz-Formation. VII. 323. Karlsbrunn (k. k. Schlesien). Glimmerschiefer und Granitblöcke. V. 387. Karlsburg (Siebenbürgen). Magnetische Elemente. I. 431. Karlstätten (Nieder-Oesterreich). Weissstein und Serpentin. IV. 266. Karpathen. Adnether Schichten. VIII. 143. — Cephalopoden des rothen Lias. VI. 183; VIII. 143. — Erdbeben vom 15. Januar 1858. IX. *V.* 30, 37. — Geologie und Orographie. II. c. 97. — Geologische Beobachtungen. II. a. 139. — Geologische Reihenfolge der Gesteine. I. 59, 60. — Orographie und geologischer Bau. II. c. 97, 99. — Salz-Ablagerungen. I. 234. — (Kreideschicht am Fusse der). III. d. 33. — (kleine). Geologischer Bau. IV. 850; IX. *V.* 82. — — Höhenbestimmungen. IX. 161, 162. — (nördliche). Gyps-Formation. IX. 143, 148, A. 14. — — Schichtenstürzungen. IX. 155, 156. — — in Schlesien. III. c. 135; IV. 304; IX. *V.* 44. — — — Knollenkalk. IX. 44. — — — Sandstein. IX. 45, 47. — — in Ungarn und Galizien. IX. *V.* 83, 84. — (östliche). Sandstein. VI. 105, 112; X. *V.* 31. — — Eisenstein-Lagerzüge. VI. 182, 183. — (siebenbürgische). Geologische Aufnahme. X. *V.* 130. — (südliche). Kalkzüge. VII. 705. — (ungarisch-mährische). Klippenkalk. IX. *V.* 94. Karst (illyrischer). Höhlen. I. 701. — — Kreide und jüngere Gebilde. IX. *V.* 92. — (liburnischer). Geologische Recognoscirung. X. 333, 334. — (Unter-Krainer). Kalkgebilde. IX. 275. — — Neogenes. IX. 394, 395. — — Oberflächen-Gestaltung. IX. 373. Karwin (k. k. Schlesien). Ausströmung brennbarer Gase. III. b. 171, 172. — Steinkohlen-Becken. IV. 649. Kaschau (Ungarn). Berghauptmannschaft. X. 357. — Magnetische Elemente. I. 429. — Milch-Opal, Anal. IV. 398. Kasegowitz (Böhmen). Gneisszug. VI. 488, 492. Kassnitz (Kärnthen). Höhenbestimmungen. VI. 570, 571. Kassunau (Böhmen). Steinkohlen-Formation. VII. 263, 264. Katharinaberg (Böhmen). Bergbau. VIII. 575. Katowitz (Böhmen). Graphitschiefer. V. 296. Katsch-Fluss (Steiermark). Schotter-Ablagerungen. VII. 51. Katschni-Vrh (Steiermark). Uebergangs-Gebirg. VIII. 430. Kegel-Bauer (Steiermark). Tegel-Petrefacte. VII. 571. Kehrer Graben (Bayern). Kalkgebilde. IV. 94, 95. Kemencse (Ungarn). Leithakalk-Petrefacte. VII. 813; IX. 509. Kesmark (Ungarn). Magnetische Elemente. I. 429. Kessler Alpe (Vorarlberg). Durchschnitt. VII. 4. Ketion Oros des Ptolomäus. VIII. 268. Keutschach-Thal (Kärnthen). Dioritisches Gestein. VI. 522. Kienberg bei Nikolsburg (Mähren). Tertiäre Petrefacte. I. 675; II. d. 111. Killowen (Irland). Riesenhirsch. VI. 198, 318. Kimpolung (Bukowina). Klippenkalk. VI. 113. Kinitz (Mähren). Tertiäre Petrefacte. V. 753. Király-Helmecz (Ungarn). Trachytgebirg. IX. *V.* 156. Kirchberg an der Bielach (Nieder-Oesterreich). Gebirgszug. IV. 183, 184. Kirchholz-Berg (Salzburg). Monotis-Kalk. II. c. 113. Kirchschlag am Wechsel (Nieder-Oesterreich). Amphibol-Schiefer. V. 489. — Körniger Kalk. V. 499. — Taubenloch (Höhle im körnigen Kalk). V. 500, 501, 502. Kirlibaba (Bukowina). Erzlager. V. 222; VI. 122. Kirnberg (Nieder-Oesterr.). Alterthümliche Werkzeuge. I. 553. Kirnik-Gebirg (Siebenbürgen). Geologischer Bau. II. d. 71, 72; III. c. 61. — Kohlen (goldhältige). II. d. 73. Kirscha (Banat). Gneiss. VI. 230. Kisling-Bach (Böhmen). Granit und Felsit. V. 579, 580. Kissingen (Bayern). Kohlensäure-Gas der Soolsprudel. VII. 828. Kittlitzdorf (Böhmen). Lignit-Schichten. VIII. 504, 505. Kitzbüchl (Tirol). Geologie der Umgebung. IX. *V.* 69. Kladno (Böhmen). Silurisches und Kohlengebirg. X. *V.* 95, 96. Kladrau (Böhmen). Erzgänge. VI. 593. Kladrub (Böhmen). Aphanit und Kalkstein. V. 309. Klagenfurt. Diluvium. VI. 564. — Magnetische Elemente. I. 224. — Sammlungen. VI. 743. — Werner Säcularfeier. II. d. 38. Klana (croatisches Küstenland). Nummuliten-Kalk und eocener Sandstein. IX. *V.* 112. Klattau (Böhmen). Gneisszug. VI. 488, 493. Klattauer Kreis (Böhmen). Geognostische Aufnahme. VI. 172. — — Silur-Formation. VII. 99. Klaus-Alpe (Ober-Oesterr.).

Jurassische Schichten. IV. 764. — Petrefacte. III. a. 184; IV. 765. Klausen (Tirol). Berg-Commissariat. VIII. 189. Klausenburg (Siebenbürgen). Bergbehörden. VIII. 636. — Magnetische Elemente. I. 432. Klauspriel (Nieder-Oesterreich). Durchschnitt. IV. 280. Klavan (Banat). Unterer flötzleerer Sandstein. VI. 231. Kleehübl (Böhmen). Basalt. VIII. 74. Klein-Asien. Foetterle's Bereisung. IX. *V.* 85. — V. Moltke's, v. Vincke's und Dr. Kiepert's Karte. V. 435, 436. — P. v. Tchihatcheff's Reisen und Forschungen. IV. 840; VII. 821; IX. *V.* 123. Klein-Glockner (Tirol). Ansicht. VI. 818. 819. Kleinhann (Böhmen). Gneiss in Platten. VIII. 525. Kleinkogel (Salzburg). Gangverhältnisse. I. 213. Klein-Lochowitz (Böhmen). Aphanit und Porphyr. VI. 617. Klein-Luschenz. Pegmatit in Glimmerschiefer. VI. 781. Klein-Purberg (Böhmen). Tertiäre Pflanzen. IX. 544. Klein-Schüttüber (Böhmen). Braun-Eisenstein. VIII. 475, 476. Klein-Semmering (Steiermark). Kohlenflötze im Tertiären. V. 559, 561. Klein-Skal (Böhmen). Ur-Thonschiefer und Melaphyr. X. *V.* 115. Klein-Zell bei Ofen. Diluvial-Kalktuff. VIII. 331, 332. — Säugthier-Reste. VIII. 332, 333. — Tegel-Petrefacte. VIII. 322. Klemenscheg (Steiermark). Uebergangs-Gebirg. VIII. 419. Klingen (Böhmen). Lignit-Schichten. VIII. 474. — Plastischer Thon. VIII. 484. Klingenfurt (Nieder-Oesterreich). Tertiäre Kohlenflötze. V. 525. Klonai-Berg (Mähren). Tegel-Petrefacte. V. 762. Klostergrab (Böhmen). Erzgänge. IX. 556. Kloster-Thal (Vorarlberg). Profil. VII. 1. Klunka-Berg (Böhmen). Basalt in Gneiss. VI. 802. Knapousche (Krain). Blei-Erzgänge (Quecksilber führende). VIII. 211, 385, 386. Kneschina (Krain). Neogener Süsswasser-Kalk. IX. 372. Knötel-Gebirg (Böhmen). Bergbau. IX. 565. Köflach (Steiermark). Braunkohlen. VI. 872, 873; VII. 550, 554, 555, 556, 559, 560. — Braunkohlen-Flora. VIII. 738, 811; IX. *V.* 3. — Schotter. VII. 597. — Tertiäres. VII. 535. — Uebergangs-Gebirg. VII. 247. Köhegy-Berg bei Ofen. Trachyt-Tuff. VIII. 330. Köhlerberg (k. k. Schlesien). Erloschener Vulcan. V. 103; IX. *V.* 36. Königsbach-Graben (Ober-Osterreich). Lias-Kalke. III. d. 96. Königsberg (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. VIII. 469. — Cypris-Schiefer. VIII. 482. Königgrätzer Kreis (Böhmen). Schürfungen. IX. 239, *V.* 57. Königstein (Böhmen). Granitfelsen. VI. 15. Königswart (Böhmen). Granit. II. b. 29. — Sauerbrunnen. VII. 514. Kössen (Tirol). Brachiopoden. III. a. 180, 181. — Lias-Schichten. III. d. 93; IV. 733, 735. — Petrefacte. V. 165. Körösmező (Ungarn). Petrefacte. X. 414, 415. Körös-Thal (Ungarn). Geologische Beschaffenheit. III. a. 15, 22. — Höhenbestimmungen. III. a. 21. — Topographie. III. a. 16. Kogetitz (Böhmen). Pläner und Trachyt. IX. 429, 430. Kohlgrub-Zeche (Böhmen). Zinn-, Rotheisen- und Mangan-Erzgänge. VIII. 54. Kohlheim (Böhmen). Gebirgsarten und Mineralien. V. 194. Kohlstatt (Bayern). Kalkgebilde. IV. 91. Kojatin-Berg bei Schemnitz. Erloschener Krater. I. 159. Kolimer Hügel (Mähren). Petrefacte. III. a. 167. Kolka-Graben (Steiermark). Durchschnitt. X. 169. Kollinetz (Böhmen). Granit. VI. 27. Kollinkofel (Tirol). Kohlenkalk. VII. 425, 426. Kollnitzer Maierhof (Kärnthen). Basalt. VII. 344. Kolomea (Galizien). Magnetische Elemente. III. a. 38. Kolomeaër Kreis (Galizien). Geologische Aufnahme. X. *V.* 129, 130. — Höhenbestimmungen. III. b. 132; X. 349. Komnia (Mähren). Trachyt. IX. 74. Kommotau (Böhmen). Tertiäre Pflanzen. IX. 548. Končita-Gebirg (Mähren). Wiener Sandstein. IX. 56; X. Anh. 74. Kondrau (Bayern), Mineralwasser. IX. 297. Konradsgrün (Böhmen). Braun-Eisenstein. VIII. 475. — Glimmerschiefer. VII. 507. — Sauerbrunnen. VII. 514. Kopa-Graben (Krain). Lias- und Nummuliten-Kalk. VIII. 225. Kopertsch (Böhmen). Braunkohlen-Flötze. IX. 527. Kopriunig (Krain). Crinoïden-Kalk. IX. 342. — Kupfererze. VIII. 215, 385. Kor-Alpe (Kärnthen). Eklogit. VI. 415. — Krystallinische Schiefer. VII. 341. Kor-Alpe (Steiermark). Krystallinisches Gestein. VII. 231; VIII. 273. — Tertiäres. VIII. 282. Korinth. Tertiäres. IX. *V.* 86. Korytnica (Ungarn). Mineralquellen. IX. *V.* 133. Koschutta-Gebirg (Kärnthen). Diabas. VII. 343, 344. — Kalkgestein. VII. 669. Kositz-Berg (Steiermark). Durchschnitt. X. 180. Kossocice (Galizien). Neocom-Petrefacte. I. 254. Kostenblatt (Böhmen). Tertiäre Flora. II. a. 155. Kostialow-Oels (Böhmen). Kohlenführendes Rothliegendes. IX. 243, 244. Kotnbüchl (Steiermark). Tertiäre Kalk-Breccie auf Uebergangs-Kalk. V. 564. Kotzobenz (k. k. Schlesien). Diabas. IV. 315, 316. Kouk (Krain). Rhynchonellen-Kalk. IX. 353. Kovátsi (Ungarn). Braunkohlen-Flötze. VIII. 329. — Dolomit. X. 505. — Eocenes. X. 506. — Nummuliten-Kalk. VIII. 314, 328. — Süsswasser-Gebilde. VIII. 320. — Tegel. VIII. 318. Kozly (Böhmen). Körniger Kalk. VI. 720, 721. Krain. Berghauptmannschaft. VII. 615. — Bleiglanz der Gailthaler Schichten. X. 165. — Eisenerze, Probe. X. Anh. 18. — Eisen-Industrie. VIII. 773, 774. — Geologische Aufnahme. VII. 629; VIII. 776, 800, 801; IX. *V.* 79, 126; X. *V.* 58. — Höhenmessungen. III. a. 41, 42; VII. 352, 675, 690. — Kohlen. Probe. X. Anh. 54. — Kohlenvorkommen. X. *V.* 49. — Kupfererze, Anal. X. Anh. 27. — Thäler. VIII. 207. — Werfener und Guttensteiner Schichten. VII. 375. — (Inner-). Eocenes. X. 272, *V.* 8. — — Geologische Aufnahme. X. *V.* 6. — (nordwestliches). Geologische Aufnahme. VIII. 171. — (Ober-). Eocenes. VII.

640; VIII. 371. — — Erzvorkommen. VIII. 384, 385. — — Geologische Aufnahme. VIII. 178, 205. — — Geologische Verhältnisse. I. 389. — — Höhenmessungen. I. 409; VI. 909. — — Quellen- und Boden-Temperatur. I. 409. — (östliches). Geologische Aufnahme. VIII. 785. — — Geognostische Karte. II. b. 189. — (Unter-). Eisenstein führende Diluvial-Lehme. IX. 246, *V.* 5, 159. — — Eocenes. X. 272. — — Gailthaler, Trias- und Dachstein-Schichten. IX. *V.* 38. — — Geologische Aufnahme. VIII. 793, 794, 812; IX. 257, 258, 273, A. 60; IX. *V.* 58. — — Höhenbestimmungen. X. 45, 53. — — Karst-Kalk. IX. 275. — — Kreidegebilde. IX. A. 69, 70. — — Neogenes. IX. 366, 367, 374, 386, *V.* 8, 49. — — Neogen-Petrefacte. IX. 396. — — Sedimentäre Gesteine zwischen Trias und Neogen. IX. *V.* 48, 49. Krainburg (Krain). Diluvium. VIII. 233. — Eocenes. VII. 640. — Neogenes. VIII. 226. Krakau. Bergbuch-Regulirung. X. 469, 470. — Berggesetz. IX. 699, 700. — Bernstein. VIII. 177. — Geologie des Gebietes. X. *V.* 100, 101. — Magnetische Elemente. I. 434; III. a. 37. — Mineralogisch-geognostische Sammlungen. X. *V.* 86. — Obere Kreide. I. 242. Krakau-Hintermühlen (Steiermark). Glimmerschiefer. V. 325. Kramerza-Gebirg (Steiermark). Gailthaler Kalk. VIII. 421. Krapina (Croatien). Braunkohlen-Schürfungen. VII. 738; VIII. 161, 613; X. Anh. 53. — Mineralquellen. I. 275, 276; VII. 841; VIII. 805, 806; IX. 229, 276, 277; X. Anh. 70, 71. Kratzau (Böhmen). Phyllitischer Schiefer. X. 381. Kreith (Kärnthen). Magnetische Elemente. I. 225. Kremnitz (Ungarn). Acerotherium incisivum. II. a. 136, b. 161. — Fossile Pflanzen. III. c. 157, 158, d. 127, 128; IV. 157; V. 229, 230. Kremniczka (Ungarn). Fossile Flora. III. c. 157; IV. 157; V. 230. Krems (Nieder-Oesterreich). Höhenbestimmungen. III. c. 102. Krems-Alpe (Kärnthen). Krystallinisches Gebirg. V. 885; VI. 525. — Steinkohlen-Gebilde. VI. 175, 176, 523, 536. Kremser Thal (Böhmen). Serpentin. V. 28, 31. Krems-Graben (Kärnthen). Kalk. IX. 191. — Schotter und Grus. VI. 551. Kremsiger Gebirg (Böhmen). Bergbau. VIII. 589. Kremsmünster (Ober-Oesterreich). Magnetische Elemente. I. 66; III. c. 124. Kren-Alpe (Gebirgssenkung. IV. 475. Kressenberg (Bayern). Alt-Tertäres. II. a. 18, 19. — Petrefacte. II. a. 13. Křetin (Mähren). Eisenerze in Quader. V. 737. Kretschenried (Bayern). Magnetisch-polarer Serpentin. VIII. 659. Kreutz-Berg (Istrien). Oolithischer Kalk. IX. 353. Kreutzberg bei Nagybánya. Erzgänge und Bergbau. IV. 571, 572. Kreuznach (Rhein-Preussen). Magnetischer Porphyr. VIII. 681. Kreutz-Peter (Steiermark). Tegel-Petrefacte. VII. 575. Krikehaj (Ungarn). Braunkohlen-Becken. VII. 609. Krinnel (Salzburg). Thalbildung. V. 797. Kritzendorf bei Wien. Eocener Sandstein. IX. 123, 124; X. 269, 270, *V.* 5, 6. Kronstadt (Siebenbürgen). Geologische Aufnahme. X. *V.* 106, 107, 181. — Hochgebirg. X. *V.* 107. Krosno (Galizien). Magnetische Elemente. III. a. 37. Krottendorf bei Gratz (Steiermark). Dolomit. VII. 238. Krottensee (Böhmen). Fossile Pflanzen. III. d. 126; IX. 547. — Tertiäre Schichten. VIII. 472. Krumau (Böhmen). Granulit. V. 5. — Kalk und Granit. V. 55, 56. Krumbach (Nieder-Oesterreich): Tertiäre Mulde. V. 526. Krumbach (Steiermark). Mineralien. I. 358, 359. Krumecker Graben (Steiermark). Staurolith. V. 333. Küberstein (Böhmen). Basalt. VIII. 75. Küh-Graben (Bayern). Kalk- und Mergel-Gebilde. IV. 92. Künisches Gebirg (Böhmen). Glimmerschiefer-Formation. VI. 89. — Höhenbestimmungen. VII. 143. Kuenlün-Kette (Tibet). Deren Ueberschreitung durch die Brüder Schlagintweit. VIII. 775. Künzler-Spitz (Vorarlberg). Profil. VII. 12. Küstenland (croatisches). Geologische Durchforschung. IV. 177; VI. 417; X. *V.* 75, 76, 120, 121. — — Unterirdische Wasserläufe. VI. 418. — (istrianer). Berghauptmannschaft. VII. 615. — — Eocenes. X. 272. — — Geologische Aufnahme. IX. 324, *V.* 81; X. *V.* 6, 193, 194. — — Kohlenvorkommen. X. *V.* 49. Kumburg (Krain). Dachstein-Schichten. IX. 269. Kuničik (Böhmen). Kalksteine mit Vesuvian. VI. 695. Kupferberg (Böhmen). Bergbau. VIII. 593, 595. Kurowitz (k. k. Schlesien). Aptychen-Kalk des Jura. IX. 43. Kuteshu (Krain). Kreideschichten. X. 326. Kutjevo (Slavonien). Geognostische Untersuchungen. VI. 868. Kutschlin (Böhmen). Süsswasser-Kalk. II. a. 155. Kuttenplan (Böhmen). Granit-Gebiet. VI. 793.

Laak (Krain). Bohnerze. VIII. 222. — Kupfer-Lagerstätte. IV. 863; VIII. 385. — Löss. VIII. 233. — Pflanzen (fossile). VIII. 364; IX. *V.* 18, 19. — Quecksilber-Erze. VIII. 211. — Säugthiere (fossile). IX. *V.* 158, 159. Laborcz (Ungarn). Petrefacte. X. 410, 411, *V.* 22, 23. Lackenhof (Nieder-Oesterreich). Guttensteiner Kalk. IV. 725. Laditzer Jöchel (Tirol). Dolomit in Blöcken. IV. 335, 336. Ladmócs (Ungarn). Trias. X. 408. Längenfeld (Krain). Gypslager. VII. 181, 652; X. Anh. 33. — Werfener Schiefer. VII. 651. Lago Maggiore. Dachstein- uod Kössener-Schichten. IX. 475. — Untere Trias. IX. 457. Lahn (Rhein-Pfalz). Arăoxen. II. d. 169. Lahnbeck-Kogel am Dachstein. Mergel, Anal. IV. 831. Laibach. Berghauptmannschaft. VII. 615. — (Eisenbahn-Durchschnitt zwischen Triest und). IX. *V.* 83. — Gailthaler Schichten. IX. 266, — Magnetische Elemente. I. 227. — Pflanzen (fossile). VIII. 207. — Steinkohlen. VII. 604. — Torflager. VII. 200. Lamm-Berg (Steiermark). Kalkzug. VIII. 421. Landeck (Schlesien). Anda-

lusit. VI. 158. Landeck (Tirol). Magnetische Elemente. I. 73. — Verrucano. X. 89, 90 Landsberg (Steiermark). Schotter (diluvialer). VII. 598. — Tertiäres. VII. 567. Landsberger Alpen (Steiermark). Krystallinisches Gebirg. VII. 223, 228, 229, 230, 237. Landstrass (Krain). Neogene Petrefacte. IX. 382. Langen-Arch (Krain). Neogener Tegel. IX. 381. Lang-Enzersdorf (Nieder-Oesterreich). Brunnwasser, Anal. III. c. 154; X. Anh. 72. Langer Berg (Böhmen). Granit. VI. 20. Langtauferer Thal. Kyanit (pseudomorpher). I. 350. Lankowitz (Steiermark). Braunkohlen. VI. 872, 873. — Krystallinisches Gestein. VII. 227. Lanz (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. VIII. 499. — Lignit-Schichten. VIII. 504. Lapitzfeld (Böhmen). Lignit-Thon. VIII. 474, 480. Lasček-Gebirg (Istrien). Plassenkalk und Stramberger Schichten. IX. 346. Laschitz (Krain). Schwarzer Kalk. IX. 260. Lassenberg (Steiermark). Tegel-Petrefacte. VII. 571, 572. Lassnitz-Thal (Steiermark). Diluvialer Lehm. VII. 601, 602. Latiderer Joch (Tirol). Rauchwacke und Dolomit. VI. 335. Laufen (Ober-Oesterreich). Eocenes. IX. 136. Laufen (Steiermark). Tertiärer Sandstein. VIII. 447. — Terrassen-Diluvium. VIII. 454, 455. 456. Lauterbach (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. VIII. 499. — Lignit-Schichten. VIII. 504. Lavant-Thal (Kärnthen). Braunkohle, Proben. VI. 156. — Tertiäres. V. 889, 890; VII. 334. Lavatsch-Thal (Tirol). Dolomit und Rauchwacke. VI. 343, 344, 350. — Galmeigruben (alte). VI. 349, 350. — Petrefacte des Muschelmarmors. VI. 349. — Raibler Schichten. X. 102. Lavis (Tirol). Dolomit und Porphyr. VIII. 298, 299. Lawrence County (Nord-Amerika). Lagerstätten von kohlensaurem Zink. IX. *V.* 104. Lazur-Berg (Böhmen). Kalk im Amphibol-Schiefer. VI. 804, 805. Lebensbrunn (Nieder-Oesterreich). Serpentin. V. 505. Lecco (Lombardie). Dolomit. IX. 477. — Jura-Schichten. IX. 487. — Lias (oberer). IX. 483. Lech-Thal (Tirol). Algäu-Schichten. X. 109. — Höhenbestimmungen. X. 67. Lehenrott (Nieder-Oesterreich). Gyps. II. a. 29. Lehigh (Nord-Amerika). Anthracit-Bergbau. III. c. 8. Leiding (Nieder-Oesterreich). Reste von Wirbelthieren. I. 166; V. 524. — Tertiäre Kohle. V. 524. Leimbruck (Böhmen). Braun-Eisenstein. VIII. 475. — Quarz im Thonschiefer. VII. 499. Leiter-Graben (Salzburg). Aptychen-Kalkschiefer. II. c. 110. Leiterstein (Böhmen). Granulit (in Platten geklüfteter). V. 17. Leitha-Gebirg (Nieder-Oesterreich). Geologischer Bau. III. a. 93, d. 35, 41, 42. — Höhenbestimmungen. III. c. 107. — Wirbel von Delphinen. III. b. 161. Leithen-Thal (Böhmen). Bleiglanz mit Milch-Opal in Quarz. VIII. 47. Leitmeritzer Kreis (Böhmen). Ausläufer (nördliche) des Mittelgebirgs. IX. 433, 439. — Erzgebirg. IX. 549, *V.* 41. — Geologische Aufnahme. VIII. 776, 792; X. *V.* 60. — Höhenmessungen. X. 40. — Kreidegebilde. IX. *V.* 72; X. *V.* 60. — Vulcanisches Mittelgebirg. VIII. 812, 813; IX. 398. Leitznach-Thal (Bayern). Tertiäres. VI. 439. Lemberg. Bernstein. II. b. 163. — Kreide-Petrefacte. III. a. 194. — Magnetische Elemente. III. a. 37. — Polyparien u. s. w. des Bernstein führenden tertiären Sandes. II. a. 163. — Tertiäres. X. *V.* 104, 124, 125. Lenna (Lombardie). Trias. IX. 137, 469, 470. Leobel-Thal (Krain). Geologischer Bau. VII. 663, 668. Leoben (Steiermark). Aeltere magnetische Beobachtungen. I. 491. — Jahrbuch der k. k. Montan-Lehranstalt. II. b. 171, 172; III. b. 162; IV. 194; VIII. 178; X. *V.* 135. — Pflanzen (fossile). I. 735, 739. — Werner-Säcularfeier. II. d. 37. Leoben-Graben (Kärnthen). Durchschnitt gegen Fladnitz. IX. 225. Leogang-Thal (Salzburg). Eisenerze. V. 373. — Nickel-Bergbau. V. 148, 155, 156, 158, 438. Lepeina (Krain). Eisenstein-Bergbau. VII. 656, 657, 658, 659; IX. *V.* 126. — Tertiärer Schotter. VII. 659. Lercheck (Steiermark). Tertiäres Conglomerat. VII. 549. Lesehze (Krain). Gefaltete Eocen-Schichten. X. 331. Lessig (Böhmen). Turmalin-Schiefer. VIII. 12. Lettowitz (Mähren). Braun-Kalkspath. VI. 98. — Braunkohlen-Lager. IV. 62, 430, — Kreidekohle. V. 730, 731, 732. Lety (Böhmen). Gebirgs-Granit und Phyllit. VI. 716. Leutsch (Krain). Kesselthal. IX. 265. Leutsch (Steiermark). Höhlen. VIII. 459. — Nummuliten-Kalk. VIII. 446, 451, 452. Leutschau (Ungarn). Magnetische Elemente. I. 429. Lhotka (Böhmen). Eisenerze im silurischen Schiefer. VII. 126. Libowitz (Böhmen). Steinkohlen-Pflanzen. X. *V.* 69. 70. Lichtenwald (Böhmen). Basalt. VIII. 605. Lichtenwald (Steiermark). Zink-Lagerstätte. VIII. 169, 170, Lidečko (Mähren). Geologische Beschaffenheit. IX. 53. Liebenau (Böhmen). Kreidegebilde. IX. *V.* 91, 92. — Blei-Bergbau. VIII. 46. Lieboritz (Böhmen). Kreide-Petrefacte. VI. 327. Lieboschitz (Böhmen). Tertiäre Pflanzen. IX. 544, 545. Liebstadtl (Böhmen). Kupferglanz in Anthracit. IX. *V.* 55. Liebstein (Böhmen). Quarzit. VII. 122. Liechtenstein (Fürstenthum). Lias und Trias. VIII. 796; X. 133. Lienz (Tirol). Alpenkalk. VI. 444. — Geologische Verhältnisse. VII. 405, 414. — Höhenbestimmungen. VII. 459. — Magnetische Elemente. I. 67. Lienzer Klause (Tirol). Marmor der Adnether Schichten. VII. 422, 423. Liescha (Steiermark). Tertiäres. VII. 176; VIII. 451. Liesdorf (Böhmen). Erzgänge. IX. 561. Liesen (Böhmen). Basalt-Gebirg. IX. 433. Lietzen (Steiermark). Bunter Sandstein. IV. 470. — Höhenmessungen. II. a. 55. — Magnetische Elemente. I. 66; III. c. 124. Liffay-Graben (Steiermark). Guttensteiner Kalk (Antimon führender).

VIII. 439. Lilienfeld (Nieder-Oesterreich). Bunter Sandstein. II. a. 145. — Geognostischer Durchschnitt. I. 14, 15, 625, 626. Limburg (belgisches). Kreidegebilde. X. *V.* 93. Linz. Cetaceen-Reste. I. 163. — Diluvium. I. 628, 629. — (Eisenbahn-Einschnitt zwischen Wien und). IX. *V.* 94, 95; X. *V.* 36, 37. — Magnetische Elemente. I. 76. Linz (Böhmen). Serpentin. VI. 791. Linzer Kreis (Ober-Oesterreich). Höhenbestimmungen. VIII. 255. Lippa (Banat). Ackererden, Analyse. III. d. 88, 89. Liptauer Comitat (Ungarn). Geologische Aufnahme. IX. *V.* 128, 129. Littengrün (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. VIII. 495. Littenschitz (Mähren). Tertiär Mollusken. IV. 703. Littitz (Böhmen). Steinkohlen-Formation. VII. 260. Loben (Kärnthen). Eisenerz-Lager. VI. 149. Lochotin (Böhmen). Stämme (fossile). VII. 265. Lockenhaus (Ungarn). Eisenerz-Lager. IX. *V.* 149. Löfflbach (Steiermark). Tertiäre Mollusken. V. 565. Lölling (Kärnthen). Eisenerz-Revier. VI. 627. — Skorodit. IX. *V.* 155. Lofer-Alpe (Tirol). Lithodendron-Kalk. IV. 365. — Neocom-Mergel. IV. 733. Logar (Steiermark). Ursprung der Sann. VIII. 455. — Werfener Schiefer. VIII. 436. Loh (Böhmen). Bergbau auf Blei. VIII. 48. Loherbauer (Bayern). Meeres-Molasse. VI. 434, 435. Loibersdorf (Nieder-Oesterreich). Tertiär-Petrefacte. I. 664, 665; II. d. 113. Loipersdorf (Steiermark). Säulen-Basalt. VI. 267. Lokautz (Steiermark). Durchschnitt gegen den Chumberg. X. 178. Lombardie. Berggesetze. VIII. 621, 623, 626, 635, 636. — Flussspath-Gänge. IX. *V.* 33. — Geologische Aufnahme. I. 377, 378; VII. 816, 817, 830, 843; IX. 445; X. *V.* 191. — Geologische Karte. IX. *V.* 79. — Höhenmessungen. II. c. 78, 79. — Literatur (geologische). IX. 446. — Marmor-Sorten. II. a. 95. — Petrefacte. VII. 607; IX *V.* 124. — Schichtgebirge. IX. 445, *V.* 33. — Trias. VI. 887, 888; IX. 137, *V.* 31. — Unterer Lias. IX. 474, 475. — Verrucano. VIII. 183. Lomniczka (Mähren). Petrefacte. II. d. 152; IV. 703, 705, 706. Lomnitz-Bach (Böhmen). Goldhältige Alluvien. VI. 727. Lomnitzer Spitze (Ungarn). Absturz durch Erdbeben. X. *V.* 179. London. Magnetische Abweichung. I. 517. — Moschus-Ochse (fossiler). VI. 874. — (Dr. Hochstetter's Schreiben aus). VIII. 175, 176, 186. — (Naturwissenschaftliche Nachrichten aus). IX. V. 55, 56. — und Umgebung (Geologische Karte von). VIII. 186. Lorenzer Graben (Steiermark). Durchschnitt. IV. 469. Loretto (Nieder-Oesterreich). Hohle Geschiebe im Leitha-Kalk. IV. 670; VI. 653; VII. 157. — Leitha-Kalk. III. d. 50. Losenstein (Ober-Oesterreich). Denkmal für L. v. Buch. VIII. 179. — Kalksteine, Anal. VI. 157. Losoncz (Ungarn). Magnetische Elemente. I. 428. — Sandstein des Rothliegenden. IX. *V.* 93. Lossin (Böhmen). Steinkohlen-Flötze. VII. 262. Lotschnau (Mähren). Krebsscheeren-Sandstein. V. 709. Lubenz (Böhmen). Geologische Beschaffenheit. VII. 373, 374. Lubnitzen (Steiermark). Gailthaler und Werfener Schichten. X. 205. Lubnitzer Graben (Steiermark.) Durchschnitt. X. 212. — Eocene Kohle. VIII. 815. Luciensteig (Graubündten). Durchschnitt. X. 128, 129. Luckau (Mähren). Körniger Kalk. VI. 95, 96. Lučkowitz (Böhmen). Gebirgs-Granit. VI. 728. Lucsky (Ungarn). Mineralquellen. IX. *V.* 133. — Neocomes. X. *V.* 47. Ludwigsthal (k. k. Schlesien). Eisensteine, Probe. X. 574. Lüner Alpe (Vorarlberg). Raibler- und Dachstein-Schichten. X. 118. Luganer See. Dachstein- und Kössener-Schichten. IX. 475. — Untere Trias. IX. 457, 458. Lugos (Siebenbürgen). Tertiäres. VIII. 83. Luhatschowitz (Mähren). Geologische Verhältnisse. IV. 193; VII. 377. — Mineralquellen. IV. 194, 683; X. *V.* 71. — Wiener Sandstein. IX. 55. Lukow-Berg (Mähren). Basalt. IX. 60. Lukowitz (Böhmen). Braunkohlen-Gebirg. IX. 425. Lundenburg (Nieder-Oesterreich). Magnetische Elemente. III. a. 40. Lungau (Salzburg). Eisenerze. V. 384. — Geologische Aufnahme. V. 253, 254, 837. — Krystallinisches Gebirg. V. 837, 849. Lunz (Nieder-Oesterreich). Lias und Keuper. III. b. 61. Lunzer See (Nieder-Oesterreich). Durchschnitt der Grestener Schichten. IV. 740. Lussin (Quarnerische Inseln). Kreide und Eocenes. X. *V.* 100.

Madeira. Physiognomik der Flora. III. a. 186; IX. 588. Madison (Nord-Amerika). Hauptstadt des Staats Wisconsin. VII. 792, 793. Madura (Insel bei Java). Eocener Kalk. IX. 291. Mähren. Bergpech, Ozokerit und Bergtheer im Karpathen-Sandstein. VI. 101. — Bergzehent-Entschädigung (grundherrliche). VII. 390, 391; X. 577, 578. — Dachschiefer-Production. I. 436; VII. 748. — Eisenerze, Anal. VIII. 614, 757; X. Anh. 18. — Eisensorten, Anal. X. Anh. 29. — Geologische Aufnahme. II. d. 152, 153, 154; III. a. 175, 206, b. 167; IV. 1, 424; V. 87, 386, 659, 883; VI. 184, 413; VII. 183, 840; VIII. 184; IX. 17, *V.* 42, 51; X. 219, *V.* 13. — Geologischer Bau des Sudeten-Gesenkes. V. 87, 386. — Grenze gegen Ungarn (geologische Aufnahme der). IX. 38, 53. — Höhenbestimmungen. III. b. 115, d. 128; IV. 12, 29; V. 161; IX. 8, 15; X. 237, 253. — Kohle, Proben. X. Anh. 55. — Marmorbrüche. II. a. 103; VII. 751, 752. — Mineralien und Gebirgsarten, Anal. X. Anh. 4, 10, 12, 33, 44. — Mineralquellen, Anal. X. Anh. 71. — Mineralogische und geognostische Notizen. III. c. 130; VI. 95. — Sphärosiderit, Anal. IX. 506, 507. — Steinbruch-Karte. IV. 431. — Strassen-Nivellements. VII. 295. — Vulcane (erloschene). IX. 1, *V.* 34. — Werner-Säcularfeier. II. d. 30. — Werner-Verein. II. a. 158, d. 151; III. b. 167.

— (mittleres). Höhenmessungen. VI. 72, 185. — (nordöstliches). Geologische Aufnahme. VIII. 184. — — Höhenmessungen. IX. 80. — — (östliches). Höhenmessungen. IX. 80. — (südliches). Fluss-Nivellements. IV. 29. — Geologische Aufnahme. IV. 33. — — Höhenmessungen. IV. 12. — (südwestliches). Geologische Aufnahme. VI. 413; VII. 183; X. 219. — — Höhenmessungen. V. 173. — (westliches). Gebirgsgruppen. IX. 25, 26. — — Geologische Aufnahme. IX. 17, V. 42. — — Höhenbestimmungen. VII. 179, 298; IX. 27. — — Rothliegendes. VII. 840. Mähring (Böhmen). Torfmoor. VII. 534. Mährisch-Neustadt. Bradlstein. IV. 69. Mährisch-Ostrau. Eruptives Gestein im Kohlengebirge. VIII. 162. — Explosion von brennbaren Gasen. III. b. 17. — Fossile Pflanzen. III. d. 119; IV. 434. — Gypslager. II. b. 160. — Steinkohlen, Probe. IV. 154. Mährisch-Trübau. Kohlenflötze. IV. 430; V. 727. Männelsdorf (Böhmen). Grünerde. IX. 435, 436. Magellanische Strasse. Magnetische Declination. I. 519. Magyarád (Ungarn). Mineralquelle. IX. V. 152. Magyarókérek (Siebenbürgen). Bergsturz II. d. 60. Mahrenberg (Steiermark). Krystallinisches und Uebergangs-Gebirg. VIII. 273. Maidanpek (Serbien). Bergbau. II. b. 59. Maierhöfen (Böhmen). Braunkohle. VIII. 497. Mailand. Geologische Gesellschaft. IX. V. 153, 154. — Magnetische Elemente. I. 69. — Naturhistorisches Museum der Herren A. und J. B. Villa. VII. 763. — Städtisches Museum. VIII. 172. Mailberg (Nieder-Oesterreich). Leitha-Kalk. I. 667, 671. Mainz. Dr. Fr. Sandberger's Monographie des tertiären Beckens. VIII. 370. — Tertiäre Flora. IX. 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548. — Tertiäre Petrefacte. IV. 416. Makow (Galizien). Eisenerze, Anal. X. 572. Malčitz (Böhmen). Granit. VI. 373. Malesitz (Böhmen). Kohlen-Sandstein. VII. 257. Malestig (Kärnthen). Schiefer-Sandstein. VII. 647. Mali Vrh (Steiermark). Gailthaler Kalk. VIII. 418. Malli-Hallan (Dalmatien). Magnetische Elemente. I. 232. Malomeřitz (Mähren). Bucht des Wiener Tertiär-Beckens. III. a. 140. — Fossile Mollusken. III. d. 77. — Quarzkugeln. IV. 321. Mals (Tirol). Magnetische Elemente. I. 72. Malta-Thal (Kärnthen). Central-Gneiss. VI. 746. Manchester. Literarisch-wissenschaftliche Gesellschaft. X. V. 81. Manerba (Lombardie). Eocenes und Diluvium. IX. 496. Manetin (Böhmen). Dachschiefer. VII. 466. Mannhartsberg (Nieder-Oesterreich). Geologische Beschaffenheit. III. b. 165. — Tegel-Mollusken. I. 665. Mantscha (Steiermark). Kohlenführendes Tertiäres. VII. 544, 555. Mantua. Magnetische Elemente. I. 69. Marbach (Nieder-Oesterreich). Gneiss. III. c. 37. — Weissstein. III. c. 41. Marburg (Steiermark). Geologischer Bau der Umgebung. VI. 294, 300; VII. 219; VIII. 275. — Magnetische Elemente. I. 226. March (Einfluss der) in die Donau. II. d. 156. — Höhenbestimmungen. III. c. 99. Marcheno (Lombardie). Muschelkalk. IX. 465. Margarethen (Nieder-Oesterreich). Leitha-Kalk. II. d. 120, 121. Mariabrunn bei Wien. Organisation der k. k. Forst-Lehranstalt. III. b. 175. Maria-Eck (Bayern). Nummuliten-Gebilde. II. a. 9. Mariahilf (Vorstadt von Wien). Dinotherium. VIII. 167. Maria-Theresiopel (Banat). Ackererde, Anal. III. d. 86. Mariazell (Steiermark). Gollrader Eisenstein-Lager. III. a. 4. — Gyps. II. a. 32. — Kalkgebilde des Bürger-Alpels. III. a. 195. — Miocenes. I. 108, 109, 110. — Salzquelle im Hall-Thale. I. 120; II. a. 32. Marienbad (Böhmen). Geologische Verhältnisse. II. b. 1; VII. 382. — Mineralmoor. IV. 418, 419. Mark (Grafschaft). Geologische Karte. III. a. 188. — Kohlen-Eisenstein. III. c. 133. Markhausen (Böhmen). Braunkohle. VIII. 473. — Felsit-Porphyr. VIII. 27. Marklowitz (k. k. Schlesien). Aphanit. IV. 316, 317. Markusgrün (Böhmen). Sauerquellen. VII. 514. Marmora-Meers (Geologische Bereisung der Ufer des). IX. V. 85. Marmaros (Ungarn). Berg- und Salinen-Direction. VII. 855. — Eocenes. X. 433, 434. — Geologische Aufnahme. IX. V. 115, 130, 143. 144. — Höhenbestimmungen. X. 345, 348. — Miocenes. X. 457. — Trachyt-Porphyr. X. 466. 467. Marquette (Nord-Amerika). Eisen- und Metall-Industrie. VII. 775. — Erzlager der Jackson-Grube, VII. 775, 776. — Nutzbare Mineralstoffe. VII. 780. — Universität und wissenschaftliche Anstalten. VII. 793, 794. Mars-Gebirg (Mähren). Menilit-Schiefer. IX. 50. Maruzina (Galizien). Neocomer Kalk. VI. 309. Marzali (Ungarn). Ackererden. VII. 361. Marzatitz (Mähren). Duttenmergel. IX. 57. Masetto (Tirol). Dolomit. VIII. 298. Massachussets. Weichthier-Fauna (marine). IX. 605. Matajur-Gebirg (Krain). Dachstein-Kalk. IX. 341. Matko-Alpe (Steiermark). Trias, Lias und Jura. VIII. 436. — Uebergangs- und Werfener Schichten. VIII. 417. Matler Kopf (Vorarlberg). Arlberg-Kalk und Rauchwacke. X. 131. Mattersdorf (Nieder-Oesterreich). Meer-Bivalven im Erratischen. IX. V. 101. Mattsee (Ober-Oesterreich). Eocenes. IX. 117, 119, 120. Matzdorf (Böhmen). Bergbaue (aufgelassene). VIII. 588. — Syenit-Porphyr. VIII. 557. Matzleinsdorf (Nieder-Oesterreich). Quarzgang im Granit. IV. 281. Mauer bei Wien. Mineralquelle. VIII. 154. 155. — Wiener Sandstein. X. V. 4, 5. Mautern (Nieder-Oesterreich) (Gebirgszug zwischen St. Pölten, Mölk und). IV. 164, 264. Mauterndorf (Kärnthen). Radstädter Schiefer. VI. 748. Mauthausen (Ober-Oesterreich). Granit. IV. 253. Maydan (Galizien). Eisenerze, Anal. X. 574. Mayerberg (Steiermark). Porphyr. VIII. 434. Mayersgrün (Böhmen). Kobalt-Manganerz. VII. 492. Meano (Tirol). Untere

Trias und Porphyr. VIII. 299. Media-Graben (Krain). Leitha-Kalk. VIII. 227, 228. Mehadia (Militär-Grenze). Mineralquellen (Hercules-Bäder). II. a. 151, b. 93. Meierhold-Graben (Kärnthen). Kössener Petrefacte. VII. 336. Meissau (Nieder-Oesterreich). Amethyst. 158. — Höhenbestimmungen. III. c. 101. — Tertiäre Petrefacte. I. 662, 663; II. d. 114. Melbourne (Neu-Holland). Wissenschaftliche Thätigkeit. X. *V.* 90. Melnik (Böhmen). Kreidegebilde. X. *V.* 84. Mendrisio (Lombardie). Lias-Kalk (rother). IX. 482. Menina-Gebirg (Steiermark). Kalkgebirg. VIII. 431. — Uebergangs-Gebilde. VIII. 429. Mentau (Böhmen). Polierschiefer. IX. *V.* 35. Meran (Tirol). Grauwacke. II. c. 6. — Magnetische Elemente. I. 68. Mére (Ungarn). Travertin. IX. *V.* 153. Merklin (Böhmen). Granit. VI. 589, 590. — Steinkohlen, Proben. VI. 159. — Steinkohlen-Becken. VI. 164; VII. 266, 275. Messendorf (Mähren). Erloschener Vulcan. IX. 13, *V.* 35. Mettnitz (Kärnthen). Magnet-Eisenerz. VI. 520. — Schotter des Diluviums. VI. 556, 558. — Tertiäres. VI. 559. Mezzoldo (Lombardie). Verrucano und Porphyr. IX. 460. Michaëlsberg (Mähren). Bergbau auf Blei und Silber. IV. 435. Michigan (Nord. Amerika). Eisen- und Kupfer-Gebiet. IV. 408. Micholup (Böhmen). Kreide-Petrefacte. VII. 327. Michzen (Böhmen). Trachyt-Conglomerat. IX. 410. Mies (Böhmen). Bergbau. VI. 593. — Ur-Thonschiefer. VI. 591. Miesbach (Bayern). Cyrenen-Schichten. VI. 436. — Molasse. VI. 433, 434. Mies-Fluss (Böhmen). Flussgebiet. VI. 585. — Höhenbestimmungen. VII. 146, 147. Miklosberg (Ungarn). Braunkohlen-Grube. IV. 143. Milčin (Böhmen). Pegmatit mit Granat und Turmalin. IX. 687. Milin (Böhmen). Granit. VI. 404. Militärgrenze. Höhenmessungen. IV. 543. — Verordnung über Berg-Gerichtsbarkeit. IV. 867. — Verordnung über Steinkohlen-Bergbau. X. 469. — (Roman-Banater). Eisenerze und Kohlen. VII. 382, 383. — — Mineralien- und Gebirgsarten. VII. 607. Miltigau (Böhmen). Braunkohle. VIII. 472. Milwaukee (Nord-Amerika). Neue Stadt. VII. 792. Mincsol-Gebirg (Ungarn). Karpathen-Sandstein. X. 419. Minnesota (Nord-Amerika). Bauholz-Industrie. VII. 800, 801. — Eingeborne Stämme. VII. 803. — Geologische Aufnahme. IV. 841; VII. 78. — Geräthe (steinerne). IV. 407. — Kupfer (Bergbau auf). VII. 786, 787. — — (gediegenes). IV. 406. 411, 412; VII. 784, 785. — Stadt (neu gegründete). VI. 800. Minoga (Galizien). Jura-Kalk. I. 253. — Kreide-Petrefacte. I. 244. Miröschau (Böhmen). Steinkohlen-Mulde. VI. 411, 412; VII. 272. Mirotitz (Böhmen). Geologischer Bau der Umgebung. VI. 682. Mirowitz (Böhmen). Durchschnitt. VI. 737. — Erz-Vorkommen. VI. 727. — Kalk und Serpentin. VI. 719, 720. Mislin (Böhmen). Durchschnitt. VI. 716. Misling (Steiermark). Diluvialer Schotter. VIII. 454. — Guttensteiner Kalk und Dolomit. VIII. 440. — Tertiäres. VIII. 281, 287. Missouri (Nord-Amerika). Erz-Vorkommen. IX. 14, 104, 105. — Geologische Aufnahme. VII. 822, 823. Mittagsspitz (Bayern). Profil. IV. 349. Mittelberg (Böhmen). Gneiss und Glimmerschiefer. VIII. 539, 540. Mittelgebirg (Böhmen). Lagerstätten der Pyrope. VII. 844, 845. Mittelgebirg des Leitmeritzer Kreises. Südwestliche Ausläufer. IX. 437, 439. — (krystallinisches und sedimentäres). IX. 429, *V.* 72. — (quartäres). IX. 430. — (tertiäres). IX. 428. — (vulcanisches). X. 398. Mittelmeer. Weichthier-Fauna. IX. 589. Mitterberg (Salzburg). Uralter Kupfer-Bergbau. I. 197. Mitterdorf (Kärnthen). Kalk und Kalkschiefer. VII. 684. Mittrowitz (Banat). Ackererde, Anal. III. d. 85, 86. Mixnitz. (Steiermark). Höhle im Kalkstein. V. 553, 554. Mlakier Wiese (Ungarn). Brachiopoden und Cephalopoden. X. 415. — Kalkstein-Blöcke in Diorit. X. 414, 415. Mlynowka (Galizien). Alabaster. IX. 154. Modena. Petrefacte (sub-apenninische). IV. 638. Modereck-Alpe (Ober-Oesterreich). Thone mit Bohnerzen. V. 198. Modrea (Istrien). Woltschacher Kalk. IX. 351. Mödling bei Wien. Geologischer Bau des Eichkogels. IX. *V.* 160; X. 25. Mölk (Nieder-Oesterreich). Bank von Astrea fimbriata. X. *V.* 37. — Magnetische Elemente. I. 66, 222. — Sand-Terrassen. IV. 282. — (Gebirgsgruppe zwischen St. Pölten, Mautern und). IV. 164, 264, 279. Möll-Thal (Kärnthen). Thalbildung. II. b. 40. Möll-Thal (Tiroler) in der Umgebung von Lienz. VII. 405. Möllersdorf (Nieder-Oesterreich). Tegel. II. d. 105. Moel Trafern (Wales). Schotter und Sand mit glacialen Meer-Schalthieren. IX. 619. Möttlinger Boden (Krain). Jüngere Süsswasser-Becken. IX. 371, 395. — Kreidegebilde. IX. *V.* 69, 70, 71. — Lignitflötze. IX. 395. Möttnig (Steiermark). Braunkohlen-Zug. X. 185. Mogyoros (Ungarn). Braunkohlen-Bergbau. IV. 145; X. 491, 501, 502. Moldau (Böhmen). Bergbau (aufgelassener). VIII. 584. — Porphyrzug. VIII. 555, 556, 558. Moldau-Fluss (Böhmen). Gefälle. VII. 149. Moldowa (Banat). Kalkspath-Krystalle. IV. 680, 838; VII. 611. Moldowa-Thal (Bukowina). Klippenkalk. VI. 110. — Terrassen des Alluviums. VI. 114. Moletein (Mähren). Grünsand. V. 740. Molt (Nieder-Oesterreich). Tertiäres. I. 666. Moltra-Thal (Lombardie). Fucoïden-Schichten. IX. 494. Mombello (Lombardie). Neocomes. IX. 489. Monfalcone bei Triest. Geologie der Umgebung und Warmquellen. IX. 497, *V.* 99, 121. Monsberg (Steiermark). Profil gegen Rohitsch. X. 215. Montavon (Vorarlberg). Durchschnitt. X. 121. Monte Azzarini (Lombardie). Thonschiefer der Stein-

kohlen-Formation. IX. 455. Monte Bolca (Venetien). Fossile Fische. I. 696, 698. — — Pflanzen. VI. 886; X. 142. Monte Germula (Venetien). Ueberkippung der kohlenführenden Schichten. VII. 440. Monte Kuk (Istrien). Conglomerat-Kalk. IX. 347. Monte Misma (Lombardie). Majolica. IX. 484, 490. — Wetzschiefer. IX. 484. Montenegro. Geol. Bau. X. *V.* 23, 24, 25, 26, 27. Monte di Nese (Lombardie). Majolica. IX. 490. — Unterbrechung des rothen Ammoniten-Kalkes. IX. 483. Monte Orfano (Lombardie). Eocenes Conglomerat. IX. 495. Monte Promina (Dalmatien). Asphalt-Gesteine. VII. 761, 762. — Fossile Wirbelthiere. VI. 184, 185. — Kohlengebilde. II. d. 139; III. a. 192, 193; VI. 184. Monte San Martino (Lombardie). Dachstein-Kalk. IX. 475. Monte Santo (Görz), Nummuliten Gestein. IX. 355. Monte Scol (Istrien). Eocenes und Kreide. X. 295. Monte Tinnizza (Venetien). Muschelkalk. VII. 453. Monte Tomatico (Venetien). Schall-Phänomen. IV. 559. Monte Venercolo (Lombardie). Thonschiefer der Steinkohlen-Formation. IX. 455. Monzoni-Berg (Tirol). Pseudomorphosen. II, c. 163; IV. 161, 162. — Vorhauserit. VIII. 358. Moosseedorf (Schweitz). Alterthümer und organische Reste im Torf. VIII. 778. Moravitza (Banat). Eisenerz-Lagerstätten. II. b. 151. Mortantsch-Bach (Steiermark). Schuttanhäufung. V. 534. Moskau. Semisäcular-Feier der kaiserl. Gesellschaft der Naturforscher. VII. 182. Moslaviner Gebirg (Croatien). Geologischer Bau. III. a. 171, b. 92. Motschütz (Böhmen). Steinkohlen-Becken. VII. 271, 272. Mraulag-Berg (Steiermark). Werfener Schiefer. VIII. A. 279. Mucsony (Ungarn). Austernbank im Mergel. VII. 699. Mühlbach (Böhmen). Lignit. VIII. 474. Mühlbach (Salzburg). Erzstufen und Gebirgsarten. I. 161. Mühlbach-Thal (Salzburg). Aeussere Gestaltung. V. 805. Mühlberg (Böhmen). Granit. II. b. 1, 2. Mühlen (Kärnthen). Diluvialer Schotter. VII. 65. Mühlen (Steiermark). Geologie der Umgebung. V. 340. — Kalk und Dolomit. V. 344. Mühllacken (Ober-Oesterreich). Aphanit. IV. 261. München. Diluvium am Ufer der Isar. II. a. 2. Münisch (Banat). Serpentin. VI. 224. Mürzsteg (Steiermark). Dolomit. I. 115. Muggenau (Steiermark). Leitha-Kalk. VII. 590. Munkács (Ungarn). Alaunstein. IX. *V.* 117. — Magnetische Elemente. I. 430. — Tuff mit Eisenerzen. X. 453. Munkendorf (Krain). Eocener Kalk. IX. 376. Murau (Steiermark). Geröll. VII. 57. — Höhenbestimmungen. VII. 706, 710. — Rothe Schiefer. V. 359, 361, 362. — Tertiäres (kohlenführendes). V. 202. — Uebergangs-Gebirg. V. 344, 345, 356, 357. Mureck (Steiermark). Geologischer Bau der Umgebung. VI. 294, 299, 301. Mur-Thal (steirisches). Höhenmessungen. VII. 706, 707, 715, 716. — Kohlen-Ablagerungen. IV. 172. — Krystallinische Schiefer. I. 29. — (oberes). Schotter-Ablagerungen. VII. 39, 46, 585, 593. Muschelberg bei Nikolsburg. Tertiäre Petrefacte. II. d. 110. Musky-Berg (Böhmen). Basalt auf Pläner. X. *V.* 115. Mutěnitz (Böhmen). Mineralien. IV. 695. Muthmannsdorf (Nieder-Oesterreich). Kohlenpflanzen. I. 161. Muszay (Ungarn). Alaunstein. IX. *V.* 117. Muttersdorf. Alter Bergbau auf Kupfer. VI. 792. — Syenit. VI. 785. Mutzgern (Böhmen). Lager von Graphit. IV. 133.

Naass (Steiermark). Rothe Schiefer-Breccie. V. 547. Naessundholm (Norwegen). Frictions-Erscheinungen. VI. 884. Nagelschmid-Bau (Salzburg). Eisenerze. V. 371. Naglern (Nieder-Oesterreich). Eocener Wiener Sandstein. IX. 122. Nagorzany (Galizien). Petrefacte. IX. *V.* 54. Nagyág (Siebenbürgen). Erz-Lagerstätten. VIII. 114. — Geognostische-bergmännische Skizze des Bergamts-Bezirkes. VIII. 82, 113, 709, 721; IX. *V.* 3, 15. — Production und Geldgebarung. III. a. 70. — Werner-Säcularfeier. II. d. 37. Nagybánya (Siebenbürgen). Berg- und Hüttenwerke. IV. 568, 571, 583, 806, 823, 824. — Magnetische Elemente. I. 430. — Miocenes. X. 457. — Werner-Feier. II. d. 36, 37. Nagy-Kallo (Ungarn). Salpeter-Production. I. 456, 467. Nagy-Mihály (Ungarn). Miocenes. X. 450, 451. Nagy Vögy (Ungarn). Tertiäres unter Bimstein-Tuff. VII. 697. Namaqua-Land am Cap der guten Hoffnung. Bergbau-Unternehmungen. IX. 24. Naklem-Berg (Mähren). Braunkohlen-Ablagerung. IV. 47. Nanosiza (Krain). Eocenes Gebiet. X. 286. Nantes (Frankreich), Künstlicher Düngstoff. VII. 378. Napagedl (Mähren). Geologische Aufnahme. IX. 38. — Schotter (Oker führender). IX. 61. Na Planine (Krain). Durchschnitt. IX. 360. Nassau. Hüttenproducte und Schlacken. IV. 647. — Marmor. IV. 58. — Mineralien. IV. 837, 838. — Sericit-Schiefer. IV. 837. — „Versteinerungen des Rheinischen Schichten-Systems“ von G. und Fr. Sandberger. VII. 386. Nassenfuss (Krain). Turritellen-Mergel. IX. 377, 378. Na Stole (Krain). Dachstein- und rother Jura-Kalk. IX. 364. Natterer Graben (Nieder-Oesterreich). Erratisches mit Meer-Bivalven. IX. *V.* 101. Nauheim (Hessen). Kohlensaures Gas des Soolsprudels. VII. 828. Naurod (Nassau). Himmelblauer Barytspath. III. d. 26. Nebelstein (Nieder-Oesterreich). Granit. III. c. 49. Nebraska (Nord-Amerika). Petrefacte. VIII. 182. Neckenmarkt (Ungarn). Fossile Pflanzen. IX. *V.* 148. Nedwies (Böhmen). Kohlenflötze im Rothliegenden. IX. 242, 243. Nehodiw (Böhmen). Kalkstein im Gneiss. VI. 501. Nembro (Lombardie). Majolica. IX. 490. — Rother Lias-Kalk. IX. 483. Nemesey (Siebenbürgen). Tertiäre Petrefacte. IV. 192, 193. Nenzing (Vorarlberg). Partnach-Schichten. X. 100, 134.

POLITECHNIKA GDAŃSKA ZAKŁAD GEOLOGII

— (Parallel-Profile zwischen Bludenz und). X. 135. Neograder Comitat (Ungarn). Braunkohlen-Flötze. X. *V.* 65. — Geologische Aufnahme. IX. *V.* 129, 130. Nepomuk (Böhmen). Geologischer Bau der Umgebung. VI. 453. — Granit. VI. 470, 479. Neschowa (Böhmen). Basalt. VI. 609. Neu-Amsterdam (Insel). Arbeiten der Novara-Commission. IX. *V.* 26, 28. Neubaiern (Bayern). Marmor und Nummuliten-Gestein. II. a. 12, 15, 16. Neuberg (Nieder-Oesterreich). Lager von Eisenspath. I. 119. — Schlacken und Eisenerze, Anal. III. a. 157, 158. Neuberg (Steiermark). Gosau-Petrefacte. IX. *V.* 75. Neuburger Wald (Bayern). Gebirgsarten. II. d. 144. Neudeck (Böhmen). Bergbaue (aufgelassene). VIII. 58. — Eisenerze im Amphibol-Gestein. VIII. 62. — Erzführender Granit. VII. 366, 367. — Felsit-Porphyr. VIII. 27. Neudeck (Steiermark). Thonschiefer. V. 353. Neudegg (Krain). Kalkstein mit Ammoniten. IX. 275. — Tertiäres mit Lignit. VII. 842; IX. 394. Neudorf (Mähren). Pläner. V. 725, 726. — Schichten des Braunkohlen-Gebirgs. IV. 49. Neudorf (Nieder-Oesterreich). Tertiärer Sand. I. 676, 677; II. d. 116. Neudorf (Steiermark). Molasse. VII. 577, 578. Neu-England (Prof. Hitchcock's Ichnologie von). X. *V.* 189. Neufeld (Nieder-Oesterreich). Tertiäre Kohlenflötze. II. d. 47. Neugedein (Böhmen). Granit. VI. 589. — Höhenbestimmungen. VII. 145. Neugeschrei (Böhmen). Bergbaue (eingegangene). VIII. 582. — Glimmerschiefer und Gneiss. VIII. 541. — Quarzit. VIII. 567. Neu-Gradiska (Militär-Grenze). Magnetische Elemente. III. c. 122. Neuhammer (Böhmen). Bergbau auf Mangan und Zinn. VIII. 55, 58. Neuhaus (Steiermark). Fossile Flora. I. 552. — Nulliporen-Kalk. VIII. 446, 450. — Warmquelle. VIII. 460. Neu-Holland. Fossile Marsupialien. X. *V.* 177. Neu-Hurkenthal (Böhmen). Granit, VI. 25. Neu-Kinsberg (Böhmen). Plastischer Thon. VIII. 485. Neukirchen (Böhmen). Braunkohle. VIII. 469. Neulbach (Krain). Trias und Tertiäres. VIII. 228. Neulengbach (Nieder-Oesterreich). Braunkohlen-Flötze. IX. 134, 135. — Erratischer Granit. IX. 110. Neumarkt (Böhmen). Diorit. VI. 592. — Glimmerschiefer. VI. 590. — Höhenbestimmungen. VII. 145. Neumarkt (Kärnthen). Diluvialer Schotter. VII. 59. — Niederung. VII. 63. Neumarkt (Steiermark). Höhenbestimmungen. VII. 706, 708. — Schiefer-Gebirg. V. 344, 345, 349. Neumarkt (Tirol). Secundäres und Porphyr. VIII. 296. Neu-Metternich (Böhmen). Bleiglanz. VII. 491. — Quarzit. VII. 481, 491. Neu-Moldowa (Banat). Kalkspath-Krystalle. VII. 611. — Manganerze. VII. 609. Neunkirchen (Nieder-Oesterreich). Bunter Sandstein. II. a. 145. — Geologischer Durchschnitt. I. 14. Neurath (Steiermark). Leitha-Kalk. VII. 590. Neuraz (Böhmen). Aphanit. VI. 477. Neuschloss (Mähren). Devonischer Kalk. VIII. 616. Neu-Seeland (Dr. Hochstetter's geologische Aufnahmen in). X. *V.* 50, 66, 75, 178. Neu-Sinka (Siebenbürgen). Ueber-Schwefelblei. VI. 1, 876. Neusohl (Ungarn). Hüttenwerke. IV. 794, 803, 824. Neustadtl (Böhmen). Granit. VI. 793, 794. — Vitriolschiefer. VI. 604. Neustadtl (Krain). Geologische Aufnahme. VIII. 794. — Magnetische Elemente. I. 227. — Turritellen-Mergel. IX. 377, 378. Neustift. Polyparien des Nummuliten-Mergels. II. a. 162. Neutitschein (Mähren). Augitische und Amphibol-Gesteine. III. c. 130. — Diorite. IX. 51, 52, *V.* 51. — Geologische Aufnahme. IX. 38. — Grünstein. IX. *V.* 50, 51. — Jura-Kalk. IX. 41. — Neocom-Petrefacte. IX. 42. Neutitscheiner Kreis (Mähren). Höhenbestimmungen. IX. 27. Neutraër Comitat (Ungarn). Geologische Aufnahme. IX. *V.* 112; X. *V.* 55, 76, 78. Newotnik (Böhmen). Krystallinischer Kalk. VI. 111. Nezdenitz (Mähren). Trachyt. IX. 73. Nieder-Beerbach (Hessen). Magnetisch-polarer Serpentin. VIII. 806. Niederlande Geologische Durchforschung. IV. 187; VIII. 773, 798. Nieder-Oesterreich, siehe unter „Oesterreich (Nieder-)". Nieder-Rhein. Tertiäre Flora. IX. 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548. Niederschöna (K. Sachsen). Kreide-Flora. III. d. 125. Niederthörl (Salzburg). Dachstein-Kalk. II. c. 114. Niederwald (Salzburg). Grauwacken-Schiefer. V. 815. Niemes (Böhmen). Quader-Sandstein. IX. *V.* 81. Niemtschitz (Böhmen). Gneiss. VI. 487. Niemtschitz (Mähren). Haarförmiger Glasquarz. VI. 100. Niklasberg (Böhmen). Erzgebirg. VIII. 165, 793; IX. 558, 559. Nikolai-Berg (Steiermark). Leitha-Kalk. VII. 591, 592. Nikolai-Graben (Steiermark). Profil. X. 186. Nikolsburg (Mähren). Sandsteine und Mergel (jurassische). III. d. 129. — Tertiäre Petrefacte. I. 675; II. d. 110. Nikolschitz (Mähren). Menilit-Schiefer. IV. 50; IX. 104, 127. Nisko (Galizien). Magnetische Elemente. I. 433. Nöckelberg (Salzburg). Nickel-Bergbau. V. 148, 437, 438. Nord-Amerika, siehe unter „Amerika (Vereinigte Staaten von Nord-)". Nordsee. Sinken der Inselkette. IX. *V.* 104. Norwegen. Mineralien. VI. 884. Nova-Hora (Mähren). Jurassischer Kalk. III. a. 143; IV. 73. Nussdorf bei Wien. Elephas primigenius. VIII. 790. — Tertiäres. II. d. 107. — Wiener Sandstein. X. 262, 273, 464, *V.* 5.

Obdach (Steiermark). Geologische Aufnahme. VII. 219. Oberalm (Salzburg). Kalk- und Mergel-Schichten. V. 595, 597. — Kugel-Concretionen. V. 595, 596. Oberburg (Steiermark). Eocenes. VIII. 445, 450. — Geologie der Umgebung. VIII. 403, 788. — Kalk und Feldstein-Porphyr. VIII. 431. Oberdorf (Steiermark). Dolomit mit chloritischem

Schiefer. VII. 249. Oberer See (Nord-Amerika). Eisengebiet. IV. 415; VII. 776, 777, 779. — Kupfergebiet. IV. 178, 406, 408, 411; VII. 772, 775, 783, 787, 789. — Nutzbare Mineralien. VII. 780, 781. — Städte. VII. 781, 782, 783. Ober-Graupen (Böhmen). Zinnerze im grauen Gneiss. IX. 562. Obergrund (k. k. Schlesien). Eisensinter. III. c. 131. — Gold-Bergbau. II. c. 91. Oberhals (Böhmen). Glimmerschiefer. VIII. 541. — Roth-Eisenstein. VIII. 597. Ober-Hart (Nieder-Oesterreich). Lignit-Formation. V. 519, 520. — Säugthier-Reste. V. 521. Ober-Kritzendorf bei Wien. Wiener Sandstein (eocener). X. 269, 270. Ober-Langenau (Böhmen). Knochenhöhle im krystallinischen Kalk. VIII. 169. Ober-Lapugy (Siebenbürgen). Korallen (fossile). III. d. 125. Ober-Leitensdorf (Böhmen). Mineralquelle. IX. 535. Ober-Lischnitz (Böhmen). Erzgänge im Diorit. VI. 401. Ober-Mädele (Vorarlberg). Algäu-Schiefer und oberer Dolomit. VII. 28. Ober-Mureck (Steiermark). Leitha-Kalk. VI. 301. Oberndorf (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. IX. 529. — Cypris-Schiefer. VIII. 479. — Granit, VIII. 549, 551. — Süsswasser-Quarz. IX. 521. Ober-Neugrün (Böhmen). Körniger Kalk. VIII. 27. Obernsee (Kärnthen). Graphit. VI. 515. Ober-Politz (Böhmen). Bau auf Braunkohle im Basalt. IX. 426. Ober-Pořitz (Böhmen). Grobkörniger Granit. V. 303. Ober-Priesen (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. IX. 528, 529. Oberreuth (Böhmen). Basalt. VII. 532. Oberrietz (Steiermark). Diluvialer Lehm. VIII. 459. Ober-Rosswald (Steiermark). Thonschiefer. VIII. 416, 417. Ober-Sandau (Böhmen). Glimmerschiefer. VII. 507. Ober-St. Veit bei Wien. Unterer Lias. X. V. 4, 5. Ober-Schönbach (Böhmen). Zinnober-Bergbau (alter). VII. 530. Ober-Skallis (Steiermark). Glanzkohle. VIII. 448. Ober-Sulzbach (Salzburg). Gletscher. V. 800. Ober-Tenzel (Böhmen). Basaltische Tuffe. IX. 402. Ober-Tirnau (Nieder-Oesterreich). Kalk- und Schieferschichten (umgekippte). III. c. 43. Oberweis (Nieder-Oesterreich). Nummuliten-Gestein. IX. 116. Ober-Wildon (Steiermark). Leitha-Kalk. VII. 585. Oberwölz (Steiermark). Granat-Glimmerschiefer. V. 329. — Höhenbestimmungen. VII. 706, 711, 712. — Kalk und Dolomit im Glimmerschiefer. V. 330. — Kalk-Conglomerat. VII. 54. — Krystallinisches Gebirg. V. 322, 328, 329. Ober-Zeyring (Steiermark). Blei- und Eisen-Lagerstätten. V. 335. Obeznitz (Böhmen). Eisenkiesel-Pisolith. VII. 194, 606. Ober-Berg (Kärnthen). Megalodus-Kalk. VII. 337. Obora (Mähren). Alaunschiefer und Kohlenflötz. V. 733. — Tegel. V. 761. Oeblarn (Steiermark). Bleispeise, Anal. I. 343; X. 3 Anhang. Oedenburg (Ungarn). Blattabdrücke. IX. V. 55. — Magnetische Elemente. III. c. 123. — Pflanzen (fossile). IX. V. 148. Oedthal (Dorfener). Ansicht der obersten Stufe. V. 803. Oekörmező (Ungarn). Lagerstätte der sogenannten Marmaroser Diamanten. IX. V. 116; X. 429. Oeregkő (Ungarn). Dachstein-Kalk und rother Marmor. X. 491. Oesterreich (Inner-). Geognostisch-montanistischer Verein. I. 170. — Geologische Karte. IX. V. 109, 137. — Marmor-Arten. II. a. 97, 99. Oesterreich (Kaiserthum). Bau-Materialien auf der Pariser Ausstellung von 1855. VII. 747. — Bergbaue (Franz v. Hauer's und Foetterle's Uebersicht der) VI. 193; VII. 364. — Bergbau-Betriebes (Verordnung über Beaufsichtigung des). III. b. 173. — Bergbau- und Hütten-Statistik. VII. 846, 848. — Bergbehörden (Organisation der). IX. 700. — Berg- und hüttenmännische Versammlung. IX. V. 46, 80. — Braun- und Steinkohlen (Untersuchung der). I. 367, 609. — Erdbeben vom 15. Jänner 1858. IX. V. 29, 30, 31, 37. — Forst-Gesetz vom 3. December 1853. III. d. 151. — Geognostische Skizze mit Rücksicht auf Steinkohlen führende Formationen. II. c. 95. — Geologische Karten für die Pariser Ausstellung 1855. VI. 193, 904. — Geologischen Untersuchung (Plan zur). I. 7. — Geographische Aufnahms-Commission. I. 380. — Goldwäschereien. II. b. 164. — Franz v. Hauer's „Beiträge zur Paläontographie". IX. V. 75, 76; X. V. 46. — Höhenmessungen. III. b. 7. — Ingenieur-Geographen-Corps. IV. 238. — Kohlen-Statistik. III. a. 106, 107, 108; VII. 847. — Literatur für das Jahr 1854 (Dr. v. Wurzbach's Uebersicht der). VII. 183. — Magnetische Local-Beobachtungen (Dir. Kreil's). III. c. 124, 125. — Marmor-Arten. II. a. 89, 93. — Maschinen und Bauwesen im Jahre 1851 (Beobachtungen u. s. w. im berg- und hüttenmännischen). III. d. 131. — Metalle (Fundstätten seltener). VI. 882. — Metallurgische Gasfeuerung. VII. 173. — Major Scheda's General-Karte. VI. 870; VIII. 783. — Stahl-Fabrication. III. b. 196. — Tertiäre Floren. I. 679; IX. 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548. — Topographische Aufnahme. IV. 286, 287, 289, 299. — Wirbelthiere (fossile). X. V. 51. — Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen (Freih. v. Hingenau's). IV. 171. — V. v. Zepharovich's „Mineralogisches Lexikon". VI. 885; IX. V. 124. Oesterreich (Nieder-). Aptychen-Schiefer. III. a. 169, c. 1; V. 439, 440. — Eisenerze, Anal. X. 21 Anh. — Eocen-Gebilde (Verbreitung der). V. 879, 897; IX. 103. — Erdarten, Anal. X. 47 Anh. — Gebirgsarten, Anal. X. 44 Anh. — Geologische Aufnahme. I. 560, 617, 625; II. b. 193, d. 152, 153; III. a. 91, 99, 101, 169, 182, 189, b. 165, d. 56, 57. — Geologische Karte. III. a. 169, 170, 182, 183, 189, b. 165, 169, 189; IV. 845; V. 196; VIII. 178. — Gyps-Brüche. II. a. 27. — Höhenbestimmungen. I. 522, 524; II. d. 155, 156; III. c. 94, d. 128. — Höhenkarte. VI. 185. — Jura-Kalk. II. d. 166, 167. — Kohlen, Proben. X. 59 Anh. — Kreidegebilde. IV. 170. — Marmor-Arten. II.

a. 103, 104, 105. — Schiefer und Massen-Gesteine (krystallinische). III. c. 35. — Thonsorten, Anal. X. 44 Anh. Oesterreich (Ober-). Alpen (Geologische Notizen aus den). III. b. 44. — Aptychen-Schichten. V. 439, 440. — (Ehrlich's Beiträge zur Paläontologie und Geognosie von). VII. 163. — Eocen-Gebilde (Verbreitung der). V. 879, 897; IX. 103. — Gebirgsarten, Anal. X. 37 Anh. — Geognostisch-montanistischer Verein. I. 170. — Geologische Aufnahme. I. 561, 628, 647, 651, 653, 657; III. a. 101, 189, 191, b. 171, d. 62, 70, 73, 74. — — Karten. III. a. 189, 190; IV. 431, 845; V. 196. — Höhenbestimmungen. I. 522, 536; VI. 842, 846; VIII. 256, 259, 265. — Höhenkarte. VI. 185. — Kohle, Proben. X. 58 Anh. — Marmor-Arten. II. a. 105. — Massen- und Schiefer-Gesteine (krystallinische). III. c. 35; IV. 232. — Petrefacte. I. 162. — Relief-Karte. VI. 190, 191. — Tertiär- und Quartär-Gebilde. III. d. 147. — Torf, Proben. X. 67 Anh. Oetscher-Berg (Nieder-Oesterreich). Durchschnitte. III. b. 49, 51. Oetz-Thal (Tirol). Profil. II b. 36, 37. Ofen. Deák's Cement-Fabrik. VII. 757. — Eocenes. VIII. 313. — Geologie der Umgebung. VIII. 308, 771. — Höhenbestimmungen. IX. 164. — Magnetische Elemente. I. 428. — Neogenes. VIII. 319, 320. Off-Berg (Steiermark). Glimmerschiefer (erzführender). VIII. 274. Offenburg (Baden). Fossile Flora. VIII. 334. — Steinkohlen-Formation. VIII. 334. Ogaschu Perilor (Banat). Syenit und Gneiss. VI. 224. Oharnach (Kärnthen). Orthoceratiten-Marmor. VII. 427, 428. — Schiefer der Steinkohlen-Formation. VII. 424. Oiss-Thal (Nieder-Oesterreich). Diluvium. III. b. 79, 86. — Keuper und Lias. III. b. 57, 61, 71, 74, 83. Oistrizza-Gebirg (Steiermark). Aeussere Bildung. VIII. 407, 408, 409, 411. — Alpenkalk. VIII. 406, 437. Olâhpian (Siebenbürgen). Geognostische Verhältnisse. IV. 484. Oliero (Venetien). Intermittirende Quelle. IX. *V.* 65. Ollang (Salzburg). Thalbecken. II. b. 46. Olmütz. Höhenbestimmungen. IX. 15, 16. — Magnetische Elemente. I. 426. Olomuczan (Mähren). Ammoniten-Kalk. V. 682, 684. — Devon-Kalk. V. 654. — Eisenerze. V. 686, 687, 698. — Hornstein. V. 683. — Jurassische Gebilde. V. 680, 681, 685. — Kiesel-Concretionen. V. 688, 689. — Petrefacte. V. 682, 684, 690, 694, 695. — Scyphien-Schichten. V. 682. — Unterer Quader. V. 684, 739. Ontonagon (Nord-Amerika). Epidot-Gestein mit gediegenem Kupfer. IV. 413. — Stadt und Umgebung. VII. 792, 793. — Steinerner Hammer aus einem alten Bergbau. IV. 407. Oplotnitz (Steiermark). Durchschnitt. X. 203, 219. Oppa (weisse). Grenzscheide von Gebirgsarten und Formationen. V. 388. Orawicza (Banat). Hüttenarbeit. IV. 807, 808. — Meteorit von Kakowa. IX. *V.* 110. Orecca (Krain). St. Cassian-Schichten. IX. 335. Orgiof (Mähren). Erloschene Vulcane. IX. 1, 3, 67, *V.* 34. — Höhenmessungen. IX. 9. — Lava. IX. 71, 74, 75. — Trachyt. IX. 73. Orino (Lombardie). Majolica. IX. 489. Orle (Krain). St. Cassian-Schichten. IX. 271. Orlich-Berg (k. k. Schlesien). Eisen-Lagerstätte. V. 391. Ormes Head (Wales). Werkzeuge in alten Bergbauen. I. 368. Orpus (Böhmen). Glimmerschiefer und Gneiss. VIII. 541, 543. — Magnet-Eisenerz. VIII. 591, 592. Ortles-Spitze. Alpenhütten. IX. *V.* 53. Osser-Berg (Böhmen), Glimmerschiefer. VI. 32, 33. — Höhenbestimmungen. VII. 137. Osser Kogel (Steiermark). Uebergangs-Kalk. V. 548. Ossiacher See (Kärnthen). Diluvium. VI. 553. Osterwitz (Steiermark). Kohlenbecken (tertiäres). X. 185. — Rutil und Apatit im Quarz. VII. 231. Ostindien (Niederländisches). Bergwesens-Ingenieure (Wirksamkeit der). IX. 277, 281, 283, *V.* 122. — Braunkohlen, Probe. IX. 173; X. 66 Anh. Ostralhotta (Mähren). Karpathen-Sandstein. IV. 52. Ostrau (Mähren). Kalkspath-Drusen in Steinkohle. VII. 387. — Werner-Säcularfeier. II. d. 30. Ostroschna (Steiermark). Tertiärer Sand und Sandstein. VIII. 449, 450. Otterberg (Nieder-Oesterreich). Dolomit. V. 508. Ottersbach (Steiermark). Schotter und Lehm. VII. 542. Otter-Thal (Nieder-Oesterreich). Grauwacken-Schiefer. V. 506. Ottetstift (Böhmen). Serpentin. V. 39. Ottnang (Ober-Oesterreich). Tertiäre Petrefacte. IV. 190. Ottocaz (Militärgrenze). Magnetische Elemente. III. c. 123. Ouszor-Berg (Bukowina). Nummuliten-Kalk. VI. 112.

Paak-Fluss (Steiermark). Gailthaler Kalk. VIII. 422. — Verlauf. VIII. 413, 414; X. 200, 201. Paal-Graben (Steiermark). Conglomerat. V. 369. Pacharschnig-Kogel (Steiermark). Secundäres Conglomerat auf Thonschiefer. VIII. 279. Padesch (Steiermark). Bleiglanz in Gailthaler Schichten. X. 163, 165, 166. Padochau (Mähren). Steinkohlen-Gebirg. V. 226. Padua. Cristofoli's Fabrik von künstlichem Marmor. VII. 757. — Magnetische Elemente. I. 229. Palic-See (Banat). Wasser, Anal. VII. 360, 361; X. 69 Anh. Palkowitz (Mähren). Erdpech. VI. 101. Palocsa (Ungarn). Jura-Gebilde. X. 411. Pamietitz (Böhmen). Gneiss-Glimmerschiefer. VI. 358. Pamietitz (Mähren). Leitha-Kalk auf Tegel. V. 755. Panjaska-Thal (Banat). Granit. VI. 227, 228. — Gneiss. VI. 229. Paris. Agricultur- und Industrie-Ausstellung von 1855. VII. 182, 198, 364, 376; IX. *V.* 9, 10. — Einsendungen der k. k. geologischen Reichsanstalt zur Ausstellung von 1855. IV. 192, 904. — Magnetische Declination. I. 517. Parschlug (Steiermark). Geologie der Umgebung. IV. 171. Passail (Steiermark). Tertiäres. V. 556, 562. Passau (Durchschnitt des Alpen-Gebietes vom Adriatischen Meere bis). VI. 419, 859, 881. — Geologische

Beschaffenheit der Umgebung und Petrefacte. II. b. 189 — Krystallinische Gesteinslager bei Hals. IV. 262. Passy bei Paris. Kind's Brunnenbohrung. VII. 206. Patscha-Loch (Steiermark). Höhle im Uebergangs-Kalk. V. 552, 553. Patzau (Böhmen). Geologie der Umgebung. IX. 661. Paulushütte (Böhmen). Granulit. VI. 763. Pavia. Magnetische Elemente. I. 69. Peč (Kärnthen). Kohlenkalk und Trias. VII. 645. Pechgraben (Nieder-Oesterreich). Erratische Blöcke. IX. 110. — Geologischer Durchschnitt. I. 15. — Nummuliten-Gestein. IX. 115. Pechöfen (Böhmen). Erz-Lagerstätten des Ur-Thonschiefers. VIII. 41. Pécska (Ungarn). Erdbohrungen. X. *V.* 109. Peggau (Steiermark). Knochenhöhle (Badel-Höhle). V. 551, 554, 555. — Serpentin in Thonschiefer. V. 546. Peisenberg (Bayern). Molasse. II. a. 4, 8. Peklenicza (Croatien). Bergtheer. VII. 740; VIII. 161. Peninen-Gebirg (Galizien). Geologischer Ban. X. *V.* 120, 121. Pennsylvanien. Anthracit-Gebiet. III. a. 138, 167, 179, 193, c. 7. — Anthracit-Production und Absatz. III. c. 30, 31. — Sigillaria cuspidata. III. a. 166. Perchau (Steiermark). Diluvialer Schotter. VII. 61. — Krystallinisches Gestein. V. 340. — Lager von Eisenglanz. V. 342. Perg (Ober-Oesterreich). Tertiärer Kalk-Sandstein. IV. 189. Perkupa (Ungarn). Feldspath-Talk-Kalk-Breccie. VII. 702. Perschaba (Bukowina). Eisenspath und Kupferkies. VI. 124, 125. Persien (Grewingk's Werk über das nördliche). IV. 842. — (Reisebericht aus). III. b. 105. Perticara (Kirchenstaat). Schwefellager. IX. *V.* 105. Peru. Magnetisch-polare Gesteine. VIII. 653. Pesariis (Venetien). Bunter Sandstein. VII. 441. Pestere (Ungarn). Höhle. III. a. 31. Pesth. Preise der Bergproducte. I. 756; II. a. 173, b. 200, c. 180, d. 190; III. a. 220, b. 194, c. 176, d. 188; IV. 204, 459, 665, 881; V. 251, 464, 657, 913; VI. 216, 431, 663, 922; VII. 217, 402, 626, 864; VIII. 200, 399, 644, 827; IX. 183, 307, 517, 711; X. 153, 363, 477, 585. Pesther Comitat. Höhenbestimmungen. X. 69. Petersdorf bei Wien. Gas aus einer Mineralquelle. IV. 630. Peterswald (k. k. Schlesien). Steinkohlen-Flötze. IV. 649. Petrile Dumnui (Bukowina). Klippenkalk. VI. 111. Petrinia (Militärgrenze). Magnetische Elemente. III. c. 122. Petschoje (Steiermark). Tertiäre Kohlenablagerung. X. 182. Petschounig (Steiermark). Kalk und Dolomit. X. 171. — Kohlenbecken (tertiäres). X. 183. Pettau (Steiermark). Diluvial-Terrassen. VI. 303. Pettneu in Tirol (Profil von Rattenberg bis). VII. 23. Petzel (Steiermark). Zink-Erze. VIII. 169, 170. Petzen-Berg (Kärnthen). Kalk und Dolomit. VIII. 406, 440, 451. Pezzaze-Thal (Lombardie). Geologischer Bau. IV. 889. Pfaffengrün (Böhmen). Granitzug. VIII. 5, 11, 18. Pfahl (böhmischer). Quarzfels-Lager. VI. 768, 769, 772. Pfarr-Weinzel (Steiermark). Molasse-Petrefacte. VII. 580. Pfarrwiese (Böhmen). Phonolith. VIII. 606. Pfennigberg bei Linz. Granit und Gneiss. IV. 250. Pfitsch-Thal (Tirol). Zirkon. IV. 836. Pfonser Joch (Tirol). Aptychen-Kalk. VII. 730. Pfrauen-Berg (Böhmen). Granitischer Gneiss. VI. 756. Philadelphia (Nord-Amerika). Prof. Wagner's Stiftung „Free Institute of Science". VII. 199, 200. Pian d'Erba (Lombardie). Rother Kalkstein. IX. 480. Piave-Fluss (Istrien). Höhenbestimmungen. VII. 459, 464. Pichelhofen (Steiermark). Eisenglanz). V. 338. Piemont. Fossile Wirbelthiere (Gastaldi's Werk über). X. *V.* 18. Piesting (Nieder-Oesterreich). Marmor (Isocardien-Kalk). II. a. 108. — Relief-Plan. VIII. 815, 816. Pietra Bajce (Siebenbürgen). Kieselschiefer und Kalkstein. VI. 126. Pilgram (Böhmen). Geologie der Umgebung. IX. 661, 663, 669. Pilsen (Böhmen). Steinkohlen-Becken. VII. 251. — — -Flora. VII. 264, 265. — — -Probe. VII. 275; X. 51 Anh. — Vitriolschiefer. VI. 601. — Zinkblende in Sphärosiderit. VII. 610. Pilsener Kreis (Böhmen). Beiträge zu dessen Geologie. V. 271; VI. 452. — — Höhenmessungen. V. 316, 317; VI. 503; VII. 163, 275, 276. — — Steinkohlen-Formation. VII. 249, 251. Pinguente (Istrien). Kreide- und Nummuliten-Gebilde. IV. 225, 226. Pinzgau (Salzburg). Geologische Aufnahme. V. 253. — — Thalbildung. V. 254, 794. — (oberes). Central-Alpen. V. 766. Pirawart (Nieder-Oesterr.). Mineralquelle. IV. 425. — Tegel-Petrefacte. IV. 426, 427. Pirken (Böhmen). Süsswasser-Quarz. IX. 521. Pirkhof (Steiermark). Knollenmergel. VII. 564. Pisarowina (Croatien). Sauerquelle. VII. 201, 203. Pischainovetz (Krain). Tertiäres und Trias. VIII. 228. Pitten (Nieder-Oesterreich). Bergbaue (verlassene). V. 518, 519. — Conglomerat und Geröll (tertiäres). V. 523, 524. — Eisenerz-Lagerstätten. V. 515. — Geritztes erratisches Geschiebe. I. 356; V. 527, 528. — Gneiss (erzführender). V. 482. — Krystallinischer Kalk. V. 477, 498. — Löss (gelber) mit Schnecken. V. 527, 528. — Rauchwacke und Dolomit. V. 495, 496, 497, 498. — Tertiäre Flora. I. 745. Pitulat (Banat). Brachiopoden. III. d. 129. — Petrefacte. VI. 249. Pitznig-Hube (Kärnthen). Trias-Petrefacte. VIII. 157. Pižaje (Krain). Kupfererze. III. a. 162, b. 161; IV. 863. Plan (Böhmen). Körniger Kalk. VI. 804. — Krystallinischer Schiefer. VI. 802, 803. — Magnetische Elemente. III. a. 41. — Schotterzüge. VI. 798. Planina-Thal (Kärnthen). Durchschnitt. IX. 360. — Raibler Schichten. IX. 339; X. A. 59. — Tertiärer Schotter. VII. 659. — Trias. VII. 655; IX. 336. Planitz (Böhmen). Geologie der Umgebung. VI. 453, 489. — Gneiss. VI. 489, 493. Planitzen (Steiermark). Krystallinischer Kalk. V. 357. — Sericit-Schiefer.

V. 359. Plankenwart (Steiermark). Tertiäres Kalk-Conglomerat. V. 563. Plan-Kogel (Steiermark). Uebergangs-Kalk. V. 549. Planschitza (Krain). Braunkohlen-Flötz. VIII. 229. Planskér Gebirg (Böhmen). Granat. V. 11. — — Granulit. V. 5, 10, 13. — — Höhenbestimmungen. VII. 138. — — Kyanit. V. 12. — — Turmalin-Granit. V. 15. Platsch-Berg (Steiermark). Tertiäres und Leitha-Kalk. VIII. 285. Platten (Böhmen). Eisenerz-Zug. VIII. 69. — Erzgänge. IX. 572, 573. — Felsit-Porphyr. VIII. 27. — Granitstock des Gross-Plattenberges. VIII. 3, 18, 22, 24. — Phyllit. VIII. 13. — Turmalin-Schiefer. VIII. 12. — Zinn-Bergbaue (aufgelassene). VIII. 56, 59, 60. Plattenberg (Böhmen). Basalt. VII. 531. Platten-See (Ungarn). Gebirgsarten und Petrefacte. VI. 652. — Geologische Beschaffenheit der Ufer. VII. 196, 197. Plauen bei Dresden. III. d. 122. Plavnicza (Ungarn). Stramberger (Neocom-) Schichten. X. 416. Plawutsch (Steiermark). Fucoïden-Abdrücke. IX. *V.* 77, 78. — Lehm-Ablagerungen. VIII. 602. — Uebergangs-Gestein. V. 549; VII. 238. Plerge (Kärnthen). Kalk und Schiefer der Steinkohlen-Formation. VII. 425. Pless-Berg (Böhmen). Basalt. VIII. 75. Pleschnitz-Gebirg (Steiermark). Kalk und Dolomit. VIII. 406, 411, 451. Pleschivetz (Steiermark). Krystallinisches Gestein. VIII. 415, 416. Pleschowitz (Böhmen). Opale. V. 26. — Serpentin. V. 25. Plischkowitz (Böhmen). Serpentin. VI. 719. Plöckenstein-Berg (Böhmen). Granit. VI. 12, 13. — Höhenmessungen. VII. 137. Počepitz (Böhmen). Kalkstein im Phyllit. VI. 697. Pochlowitz (Böhmen). Lignit. VIII. 473. — Tertiäre Flora. IX. 547. Podberda (Krain). Fucoïden-Abdrücke. IX. *V.* 77. — Steinkohlen-Formation. IX. 333. Podbolzera (Kärnthen). Tertiäre Pflanzen. VIII. 364. Podčap (Böhmen). Phyllit, grüne Schiefer und Diorit. VI. 716. Podhajce (Galizien). Tertiäres. IX. 152. Podhorec (Galizien). Tertiäre Schichten. X. *V.* 128. Podhorje (Galizien). Braunkohlen, Proben. X. 53, 54 Anh. Podhorn-Berg (Böhmen). Schiefergestein und Syenit. II. b. 10. Podjarkow (Galizien). Tertiäre Schichten. X. *V.* 129. Podkamnik (Steiermark). Kohlenbecken (tertiäres). X. 184. Podkraj (Krain). Eocener Kalk. IX. 353. — Nummuliten-Conglomerat. IX. 355. Podlong (Krain). Gailthaler Thonschiefer. VIII. 208. Podmeus (Krain). Plassenkalk-Gebirg. IX. 331, 332, 346, 362. — St. Cassian-Schichten. IX. 362. — Trias. IX. 334. Podobnig-Sattel (Krain). Gailthaler Schichten. VIII. 210. — Trias (obere). VIII. 216. Podolien (Russisch-). Gyps-Formation. IX. 150. Podsused (Croatien). Tertiäres. VI. 173. Pöckau (Kärnthen). Terrassen-Diluvium. VII. 646. Pöllau (Steiermark). Eisenerze. V. 538. — Krystallinische Schiefer. V. 353, 356, 531, 532. — Schotterdamm (diluvialer). V. 566. Pöls-Fluss (Steiermark). Gneiss. V. 339. Pöls-Thal (Steiermark). Schotter und Grus. VII. 56. — Tegel und Sand. VII. 565. Pötzleinsdorf bei Wien. Tertiärer Sand. I. 677; II. d. 115. Pohara (Mähren). Kalkstein des Rothliegenden. V. 677. Pojana-Gebirg bei Nagyág (Siebenbürgen). VIII. 95, 96, 113. Poik-Fluss (Krain). Eocenes. X. 275, 276, 278, 284, 286. — Höhlen und Alluvien. IX. 357, 358. Pokluka (Krain). Terrassen-Diluvium. VII. 688. Pola (Istrien). Magnetische Elemente. I. 230. Polane Huty (Galizien). Adnether Schichten (rother Lias-Kalk). VIII. 143. Polau (Mähren). Jura-Kalk. IV. 54. Polehrad (Böhmen). Basalt-Tuff. IX. 439. — Braunkohlen-Schichten. IX. 441, 527. Polen (Russisch-). Tertiäre Petrefacte. IV. 857. Polen-Berg (Böhmen). Körniger Kalk, Phyllit und Pegmatit. IX. 685. Pollinig (Kärnthen). Steinkohlen-Formation. VII. 425, 427. Polnisch-Ostrau (k. k. Schlesien). Steinkohle, Proben. X. 56, 57 Anh. Polschitza (Krain). Eocenes. VIII. 223. — Terrassen-Diluvium. I. 393. Polsterer Berg (Steiermark). Magnetische Elemente. I. 223. Pomáz bei Ofen. Leitha-Kalk. VIII. 325, 330. — Neogenes. VIII. 320, 321, 323. — Trachyt. VIII. 330. Pongau (Salzburg). Geologische Aufnahme. V. 253. Ponigl (Steiermark). Plateau von Gailthaler Kalk. VIII. 432. Ponkva-Fluss (Steiermark). Unterirdischer Abfluss. VIII. 414. Pontafel (Tirol). Anthracit, Probe. VII. 604. — Werfener Schiefer. VI. 744. Ponte alto (Lombardie). Kalk und Mergel. IX. 485, 486. Poratsch (Ungarn). Fahlerz, Anal. III. d. 98. Pore (Venetien). Lithographischer Stein. IV. 637. Porstendorf (Mähren). Tegel. V. 761. — Tertiäre Petrefacte. IV. 188; V. 746, 747, 762. Porto Mandoler (Dalmatien). Asphalt-Gestein. VII. 761. Porto Venere bei Nizza. Marmor. VIII. 364. Portugal. Steinkohlen. III. a. 135. Poschorita (Bukowina). Kiesel- und Glimmerschiefer. VI. 117. — Klippenkalk. VI. 113. — Kupferkiese. VI. 119, 120. Posruk-Gebirg (Steiermark). Durchschnitt. VIII. 287. Possendorf (K. Sachsen). Petrefacte. VIII. 157. Po-Thal (lombardisches). Quartäre Gebilde. VII. 830. Prachatitz (Böhmen). Gneiss-Gebiet. V. 63, 64. — Granulit. V. 3, 43, 46, 48. Prachiner Kreis (Böhmen). Geologische Aufnahme. VI. 172. Prag. Fossile Pflanzen im National-Museum. II. d. 165. — Preise der Bergproducte. I. 756; II. a. 173, b. 200, c. 180, d. 190; III. a. 220, b. 194, c. 176, d. 188; IV. 204, 459, 665, 881; V. 251, 464, 567, 913; VI. 216, 431, 663, 922; VII. 217, 402, 626, 864; VIII. 201, 399, 644, 825; IX. 183, 307, 517, 711; X. 153, 363, 477, 585. — Seehöhe der Sternwarte. VIII. 171, 172. — Silurische Colonien. X. 479, 481, *V.* 175. Prakowitz (Böhmen). Tertiäres. V. 315. Pramenhof (Böhmen). Gneiss. VI.

761. Prasberg (Steiermark). Diorit-Tuff. VIII. 405, 447. — Glanzkohle und Sphärosiderit. VIII. 446. — Guttensteiner Kalk und Dolomit. VIII. 438. — Höhlen im Dolomit. VIII. 459. — Nummuliten-Kalk. VIII. 446, 451. — Quelle (laue) von Okonina. VIII. 462. — Thal der Sann. VIII. 457. — Uebergangs-Gebirg. VIII. 432. Preang (Niederländisch-Indien). Schürfungen auf Kohlen. IX. 291. Predazzo (Tirol). Metamorphosirter Idokras. IV. 160. — Trias. X. 81. Preding (Steiermark). Tertiäres. VII. 563, 566. Predlitz (Steiermark). Diluvium und älteres Alluvium des obern Mur-Thales. VII. 46, 47. — Krystallinisches Gestein. V. 327, 328. Preinsfeld (Nieder-Oesterreich). Gyps. II. a. 28. Prerau (Mähren). Geologische Aufnahme. IX. 38. Pressburg. Chlorit-Glimmer im Granit. IV. 636. — Granit mit Chlorit und Granat. II. c. 42. — Magnetische Elemente. I. 427. — Verein für Naturkunde. VII. 187, 364. Pressburger Comitat (Ungarn). Höhenmessungen. IX. 161. Pressnitz (Böhmen). Basalt. VIII. 603. — Bergbaue (eingegangene). VIII. 580. — Erzgänge. IX. 572, 573. — Lehm mit Geröllen von Basalt. VIII. 606. — Magnet-Eisenerz. VIII. 590, 592. Prettauer Kees (Salzburg). Gletscher. V. 789. Preussen. Generalstabs-Karte. IV. 290, 298. — Versuche über Erschöpfung des Ackerbodens. I. 143. Prewald (Krain). Kalkschutt. IX. 357. — Kesselthal (eocenes). X. 286. — Nummuliten-Conglomerat. IX. 355. Přibram (Böhmen). Geologie des Erz-Gebietes. V. 884; VI. 254. — Hatchettin. V. 898. — Höhenbestimmungen. VI. 262. — Hüttenprocess. VII. 171. — Jahrbuch der k. k. montanistischen Lehranstalt. VIII. 178. — Magnetische Beobachtungen. I. 502. — Mineralien. II. d. 135; III. c. 156; X. *V.* 176. — Mineral-Species und Pseudomorphosen. VI. 46. — Niveau-Verhältnisse und Wasserwirthschaft. VII. 177. — Production und Geldgebarung von 1750—1849. I. 310. — Quarz-Krystalle. II. d. 170. — Silber-Extraction auf nassem Weg. I. 573; II. c. 52. — Uran-Pecherz. IV. 105. — Werner-Säcularfeier. II. d. 28. Prilauza (Krain). Neogenes. IX. 384. Pristawa-Thal (Kärnthen). Dolomit auf Steinkohlen-Schiefer. VII. 656. Pristova-Thal (Steiermark). Geognostische Skizze. VIII. 288. — Profil. VIII. 292. Priszlin (Croatien). Braunkohlen-Schichten. VII. 738; VIII. 161. Pritschappel (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. IX. 528. Prohn (Böhmen). Phonolith. IX. 439. Promontor bei Ofen. Leitha-Kalk. VIII. 325, 326. — Neogen-Sand. VIII. 320, 323. Propeln (Böhmen). Sandstein mit Anodonten. IX. 428. — Trachyt-Gänge. im Basalt. IX. 419. Prügglitz Nieder-Oesterreich). Eisenspath, Anal. IX. 505. Przemisl (Galizien). Magnetische Elemente. I. 433. Prybislawic (Galizien). Jura-Schichten. I. 253, 254. Przyschow (Böhmen). Basalt. VII. 260. Pubacher Graben (Steiermark). Secundäres Conglomerat auf Thonschiefer. VIII. 280. Puchers (Nieder-Oesterreich). Granitblöcke (schwebende). III. c. 50. Puchow (Ungarn). Klippenkalk. X. *V.* 69. Püllna (Böhmen). Bittersalz-Schichten. IX. 441. Pulgarn (Ober-Oesterreich). Gang-Granit. IV. 250. Pulle (Krain). Neogener Kalkmergel. IX. 385, 390. — Tegel mit Braunkohle und Piauzit. IX. 392, 394. Pulsnitz-Thal (Böhmen). Basaltstock. IX. 409. — Erosions-Wände. IX. 401. — Quartärer Lehm. IX. 432. Punschau (Böhmen). Amphibol-Schiefer. VI. 759. Pur-Berg (Böhmen). Phonolith auf Basalt. IX. 439. Pusiano (Lombardie). Rother Ammoniten-Kalk. IX. 483. Pusterwald (Steiermark). Krystallinisches Gestein. V. 334, 339, 340.

Qualisch (Böhmen). Kohlenflötze. IX. 240. Quarnerische Inseln. Geologischer Bau. X. 332, 335, 339, 340, 343, *V.* 85, 99, 100, 193.

Raab (Ungarn). Bos priscus. IX. *V.* 88. Raab-Fluss. Aufstauungen im Mortantsch-Thale (Steiermark). V. 533. Raach (Nieder-Oesterreich). Dolomit und Rauchwacke. V. 507. Rabel-Loch (Steiermark). Höhle im Uebergangs-Kalk. V. 552. Rabenstein (Böhmen). Dachschiefer. VII. 466, 467, 470. Rabenstein (Steiermark). Bleiglanz. V. 547. Rabenwald (Steiermark). Granit. V. 539. Rachel (Böhmen). Kalkmergel an Basalt-Tuff. IX. 436. Radács (Ungarn). Petrefacte des Schwinka-Thales. III. b. 87. Radel (Steiermark). Secundäres Conglomerat. VIII. 279, 280. Radenthein (Kärnthen). Krystallinisches Gebirg. V. 885. — Thal. VI. 552. Radhaus-Berg (Salzburg). Magnetische Beobachtungen. I. 487. Radina-Berg (Böhmen). Kieselschiefer. VI. 599. Radkersburg (Steiermark). Braunkohle. VI. 299. — Geologie der Umgegend. VI. 294. — Tertiärer Conchylien-Sand. VI. 296. — Tertiärer Sandstein. VI. 298. Radlowitz (Böhmen). Steinkohlen-Schichten. VII. 262. Radmannsdorf (Krain). Neogenes. VIII. 226. Radmer (Steiermark). Braun- und Spath-Eisenstein. V. 183. Radnitz (Böhmen). Steinkohlen-Mulde. III. a. 188; VI. 411, 412, 597; VII. 268. — — Pflanzen. III. d. 123; VII. 274. — — Probe. VI. 159; VII. 275; X. 51 Anh. Radoboj (Croatien). Boden- und Quellen-Temperatur. I. 278. — Fossile Fauna und Flora. I. 364, 374, 682, 683; II. a. 141, 142. — Geologische Verhältnisse. I. 268. — Höhenbestimmungen. I. 279. — Strontianit. I. 606. — Tertiäre Insecten. II. a. 141, 142; III. a. 187; IV. 648; VII. 831. — — Weichthiere. II. a. 141. Radowenz (Böhmen). Steinkohlen-Zug. IX. 241. — Versteinerter Wald. VIII. 725; IX. *V.* 1. Radstadt (Salzburg). Nordseite der Tauern. V. 808. — Thonschiefer. V. 812, 823, 834, 835, 844, 846, 849. — Tauern-Kalk. V. 444, 811, 813, 823, 833, 845, 846, 847. Radula-

Bach (Krain). Turritellen-Mergel. IX. 377, 378. Radusch-Graben (Steiermark). Neogenes. VIII. 453. Raffings (Nieder-Oesterreich). Quarzschiefer in Glimmerschiefer. III. c. 46. Ragusa (Dalmatien). Magnetische Elemente. I. 232. Raibl (Kärnthen). Crustaceen der bituminösen Schiefer. IX. *V.* 40. — Fauna (fossile). IX. *V.* 32, 33, 40. — Geologische Verhältnisse. I. 255; VII. 638; X. 102, 103. Raitz (Mähren). Tertiäres. V. 762, 763. Rakasdiana (Banat). Bohnerze. VI. 247. Rakos (Siebenbürgen). Quarz-Sandstein. VIII. 790. Ramingstein (Steiermark). Braun-Eisenstein in Kalk. IX. 188. Ranigsdorf (Mähren). Grünsand. V. 739, 740. — Kalk-Concretionen im Pläner. V. 717. Rank (Ungarn). Miocenes Becken. X. 440. Ranna. Graphit, Probe. X. 49 Anh. Ranten (Steiermark). Diluvium und Alluvium. VII. 51. — Granat-Glimmerschiefer. V. 327. — Serizit-Schiefer. V. 358. Rapitz (Böhmen). Eisenkies-Krystalle. IX. *V.* 64, 65. Rathsam (Böhmen). Thon mit Lignit. VIII. 472. Ratischkowitz (Mähren). Braunkohlen-Schichten. IV. 47, 48. — — Probe. X. 57 Anh. Ratschach (Kärnthen). Neogenes und Diluvium. VIII. 776. — Werfener Schichten. VII. 681, 682. Ratschberg (Böhmen). Quarzit. VI. 612. Ratschütz (Böhmen). Sandstein-Felsen. VII. 257. Rattenberg (Tirol). Magnetische Elemente. I. 74. Raudnitz (Böhmen). Kreidegebilde. VIII. 776. Rauhkofel (Tirol). Dolomit und Kalk. VI. 447. Raune (Krain). Miocenes Becken. I. 394, 395, 396. — Thonschiefer der Gailthaler Schichten. VIII. 208. Rauris (Salzburg). Geologische Aufnahme. V. 229. Rauschenburg (Bayern). Gervillien-Kalk und Dolomit. IV. 342, 344; V. 896. Raussnitz (Mähren). Tertiäre Petrefacte. V. 209, 210. Rautenberg (k. k. Schlesien). Basalt. V. 102. — Braun-Eisenstein. V. 391, 392. — Blei (metallisches). X. *V.* 53. — Erloschener Vulcan. IX. 11, *V.* 34, 35. — Gediegen Blei in Basalt. X. *V.* 53. — Höhenmessungen. IX. 15. Rautka (Mähren). Unterer Quader. V. 722. Raveo (Venetien). Grauer und Porphyr-Sandstein. VII. 441. — Muschelkalk. VII. 451. Rawa-Ruska (Galizien). Magnetische Elemente. III. a. 38. Rebra (Krain). Trias und Tertiäres. VIII. 228. Recca-Fluss (Krain). Kreide- und Tertiär-Mulde. X. 298, 302, 323, 324, 326. — Unterirdischer Lauf. II. a. 146. Récsk (Ungarn). Gebirgsarten. II. a. 134. — Gediegen Kupfer. I. 145. Redelschlag (Nieder-Oesterreich). Thonschiefer. V. 492. Regoledo (Lombardie). Untere Trias. IX. 459, 460. Rehberg (Böhmen). Granit. VI. 24. — Vulcanische Gebilde. VII. 493. Reichenau (Nieder-Oesterr.). Eisenerze und Gebirgsarten. II. b. 148. — Werner-Säcularfeier. II. d. 18. Reichenbach (Böhmen). Blei-Bergbau. VII. 511. Reichenberg (Krain). Eisen-Lagerstätte. IX. *V.* 126. Reichenburg (Steiermark). Bryozoën-Kalk. II. a. 163. Reichersdorf (Böhmen). Schieferthon (tertiärer). VIII. 481. Reiffnik (Steiermark). Magneteisen im Granit. VIII. 275. Reihen (Böhmen). Dolomit. VIII. 564. — Eklogit. VIII. 560. — Grünstein. VIII. 559, 561. — Serpentin. VIII. 566. Rein (Steiermark). Rothes Conglomerat. VII. 550. — Süsswasser-Becken. IV. 433; V. 556, 562, 563; VII. 537, 543; VIII. 283. Reissengrün (Böhmen). Ur-Thonschiefer. VII. 503. Reizsen (Siebenbürgen). Schlamm-Vulcane. IV. 169. Reit im Winkel (Tirol). Neocom und Alpenkalk. IV. 353, 355. Rells-Thal (Vorarlberg). Durchschnitt. X. 118. — Trias. X. 90. Rene (Böhmen). Porzellanerde. VII. 129. Reps (Siebenbürgen). Tertiär-Petrefacte. X. *V.* 191. Reschitza (Banat). Fossile Pflanzen. III. b. 170. Rettenbach (Nieder-Oesterreich). Chloritschiefer. V. 493, 494. Rettenberg in Tirol (Profil von Petneu bis). VII. 23. Reutte (Tirol). Algäu-Schichten. X. 111. — Verrucano und Muschelkalk. VIII. 801; IX. *V.* 16. Rév (Ungarn). Thongruben. III. a. 25, 26. Rézbánya (Banat). Caledonit und Linarit. II. b. 78; III. a. 191. Rezes-Gebirg (Ungarn). Glimmerschiefer. III. a. 34. Rhätikon. Geologischer Bau. X. 114, 125, 132. Rheinegg am Bodensee. Geschiebe mit Eindrücken. V. 897, 898. Rhein-Preussen. Achat-Mandeln. IX. *V.* 55. — Geschiebe mit Eindrücken. IV. 672. Rhein-Thal (Vorarlberger). Profil. VII. 15. — Verrucano. X. 89. Rhön-Gebirg. Baumstamm (riesiger) im Lignit. V. 898. Richterhof (Böhmen). Serpentin. V. 39. Riedegg (Ober-Oesterreich). Granit. IV. 250. Riegersburg (Böhmen). Basalt-Tuff. VI. 282. Riesengebirg (böhmisches). Krystallinische Schiefer. IX. *V.* 17. — Kupfererze. Anal. X. 466, 572. — Rothliegendes. VIII. 180. — (nordwestliches). Geologischer Bau. X. 364, *V.* 15. Rigi-Berg. Geschiebe mit Eindrücken. IV. 672. Rigolato (Venetien). Schaalstein. VII. 438. Rima-Szombat (Ungarn). Knochenhöhle. IX. *V.* 147. Rinegg (Steiermark). Tertiäres (kohlenführendes). V. 202. Rinka-Fall (Steiermark). Ursprung des Sann-Flusses. VIII. 410. Rinsennock (Kärnthen). Grüne und graue Schiefer. VI. 528. Riss-Thal (Tirol). Geologischer Bau. VI. 333. Rist (Böhmen). Granit. VI. 465. Rittberg bei Olmütz. Devon-Petrefacte. VIII. 367, 780. Ritterkampf (Nieder-Oesterreich). Porphyr, Granit durchsetzend. III. c. 52. Rittner Horn (Tirol). Panorama. IX. *V.* 15. Ritzing (Ungarn). Braunkohlen-Petrefacte. VI. 407, 413; IX. *V.* 149. — Kohlen-Bergbau. IX. *V.* 149; X. 64 Anh. Riva (Tirol). Magnetische Elemente. I. 68. Rochlitz (Böhmen). Erzvorkommen. IX. *V.* 91; X. 10. Rodaun bei Wien. Alpenkalk. III. a. 96. Röhrlkogel (Steiermark). Basalt-Tuff und Conglomerat. VI. 278. Röthelstein (Steiermark). Amphibol-Gneiss. V. 542. — Eisenspath. IV. 468.

Rötschach (Steiermark). Durchschnitt des Donau-Thales. X. 209. — Glanzkohle der Kreide. VIII. 281. — Neogenes. VIII. 451. — Rudisten-Kalk. VIII. 443. Rötz (Nieder-Oesterreich). Gneiss-Granit. III. c. 47. Rogatz-Berg (Steiermark). Porphyr. VIII. 435. — Uebergangs-Gesteine. VIII. 429, 431. Roggendorff. Mineralwasser, Anal. IV. 154; X. 73 Anh. Rohitsch (Steiermark). Braunkohlen, Probe. X. 140. — Mineralquelle. VI. 39, 165; X. 79 Anh. — Profil gegen Monsberg. X. 215. — Thon (feuerfester), Anal. VIII. 361. Rohrwald (Nieder-Oesterreich). Eocener Wiener Sandstein. IX. 108, 122. Rokitzan (Böhmen). Eisenerze, Anal. IV. 399. — Silur-Petrefacte. VII. 162, 355, 372. Romano (Venetien). Lithographischer Stein. IV. 637. Ronach (Salzburg). Kalkzug der Central-Alpen. V. 786. — Torflager. V. 791. Ronca (Venetien). Eocene Pflanzen. VI. 886. Rongstock (Böhmen). Phonolith- und Trachyt-Tuffe und Conglomerate. IX. 416, 419. — Syenit. IX. 430. — Trachyt-Gänge in Basalt. IX. 419. Ronsperg (Böhmen). Gabbro. VI, 783, 784. — Geologie der Umgebung. VI. 177, 781. — Hercinit. VI. 785. — Serpentin. VI. 791. Rosalien-Gebirg (Nieder-Oesterreich). Geologischer Bau. II. b. 194; III. a. 94; IV. 173, 174; V. 465. — Höhenmessungen. III. c. 107. Rosenau (Ungarn). Steinkohlen-Petrefacte. VI. 405. Rosenbach-Graben (Kärnthen). Werfener Schiefer. VII. 649. Rosenthal (Böhmen). Braunkohle. VII. 365. Rosenthal (Steiermark). Braunkohle, Proben. X. 61 Anh. Rossfeld (Salzburg). Neocome Schichten. II. c. 110; V. 592. Rossmeissel (Böhmen). Amphibolit. VIII. 30. — Glimmerschiefer-Zone. VIII. 9. — Gneiss. VIII. 17. — Hatchettin. V. 898. Rossitz (Mähren). Steinkohlen. V. 869, 870; VI. 139, 418, 419; X. 57, 58 Anh. — Tegel. V. 749. — Tertiäre Mollusken. IV. 703, 710. Rosstrappe (Harz). Magnetisch-polare Gesteine. VIII. 657. Rothenhaus (Böhmen). Grünstein-Gänge im Gneiss. VIII. 562. Rother Graben (Krain). Grestener- und Hallstätter-Schichten. VIII. 218. Rothe Wand (Vorarlberg). Algäu-Schiefer. VII. 17. Rothkofel (Kärnthen). Conglomerat und grauer Schiefer. VI. 540. Rothrasten (Kärnthen). Zinnober im grünen Schiefer. VI. 536. Rothwasser (Mähren). Torf. X. 231, 232. Rottenmann (Steiermark). Braunkohlen-Gebilde. VII. 39, 40. Route (Krain). Terrassen-Diluvium, I. 393. Roveredo (Tirol). Geologische Aufnahme der Umgebung. VIII. 787. — Städtisches Museum. VIII. 774. Rovigo (Venetien). Magnetische Elemente. I. 229. Rožmital (Böhmen). Geologie der Umgebung. VI. 453; VII. 99. — Silurische Gebilde. VII. 99. Rozwadow (Galizien). Aelteres Tertiäres. IX. 152. Ruckenstein (Krain). St. Cassian-Schichten. IX. 271. Rude (Croatien). Eisenwerk. VI. 166. Rudelsdorf (Böhmen). Basalt-Tuffe. IX. 439. Rudenza-Berg (Krain). Tertiäres. IX. 344. Ruditz (Mähren) Devon-Kalk. V. 684. — Eisenerze. V. 685, 686, 698. — Faserkalk-Concretionen. V. 691, 692, 693. — Jura- und Quader-Schichten. V. 683, 684. — Thon (feuerfester). V. 690, 691. Rudnig (Krain). Fossile Pflanzen. IX. 266. Rudolfstadt (Böhmen). Erz-Lagerstätte. V. 107. Rudolfsthal (Nieder-Oesterreich). Eisen-Bergbau. VI. 406. Rudolfsthurm bei Hallstatt. Keltische Grabstätten. I. 553. Ruhpolding (Bayern). Alpenkalk. IV. 84, 86. Ruhstadt (Böhmen). Quarzitschiefer. VIII. 14. — Ur-Thonschiefer. VIII. 20. Rumburg (Böhmen). Geologischer Bau der Umgebung. X. 365, 389, V. 16. Rusaja (Bukowina). Magnet-Eisenstein. VI. 118. Ruskberg (Banat). Kreide-Pflanzen. VIII. 157. — Spath-Eisenstein. Anal. VII. 362. Russland. Euklas. IX. V. 29. — Fortschritte der Geologie. I. 307; VII. 821, 822. — Fossile Fische (Pander's Werk über). X. V. 18, 19. — Steinkohlen. III. a. 136, 137. Ruster Gebirg (Ungarn). Geologischer Bau. III. a. 93, d. 35, 53. Rzeszow (Galizien). Elephas primigenius. II. d. 158. — Magnetische Elemente. I. 433.

Saal-Gebiet (Salzburgisches). Kalk-Alpen. IV. 862; V. 116. Saazer Kreis (Böhmen). Erzgebirg. VIII. 516. — Geologische Aufnahme. VII. 375, 376. — Steinkohlen, Probe. VIII. 362; X. Anh. 51, 52. — Tertiäres Becken. IX. 519, 530. Sabnitz (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. IX. 527, 528. Sachsen (Königreich). Prof. Geinitz's Werk über Steinkohlen-Formation. VII. 829. — Granulit-Formation. VII. 766, 834. — Kreide-Petrefacte. VIII. 810, 811. — Steinkohlen-Petrefacte. VI. 174, 407. Sadschitz (Böhmen). Mineralquellen. IX. 441, 442, 535. Saffendorf (Nieder-Oesterreich). Tertiärer Sand. IV. 275. Sagor (Krain). Braunkohlen-Gebilde. VIII. 230, 231, 232; X. Anh. 54, 55. — Organische Reste. VIII. 227; IX. V. 49. — Tertiäre Pflanzen. II. b. 185, 188. Sagradja (Banat). Sandstein mit Keuper-Pflanzen. VI. 226. Salbrechtsgupf (Kärnthen). Eisenerze. VI. 545. Salcano (Görz). Geologische Verhältnisse. IX. 346; X. 298. Salesl (Böhmen). Braunkohle. IX. 419, 420. Saltrio (Lombardie). Marmore und Kalksteine. IX. 476. Salzach (Bayerische Alpen zwischen der Isar und). VIII. 146. Salzach-Thal (Salzburg). Tertiäres. V. 206. — Thon-Glimmerschiefer. V. 838. Salzburg. Ankerit. IV. 827; X. Anh. 22. — Arsenik-Erze, Anal. X. Anh. 15. — Braunkohle, Proben. X. Anh. 59. — Durchschnitte der Alpen. II. c. 108. — Eocene Gebilde. IX. 103. — Erratische Blöcke des Ach-Thales. IX. 110. — Flussgefälle. V. 438, 614, 616, 623. — Geologische Aufnahme. I. 561, 562, 657; II. b. 165; III. d. 147; IV. 846, 862; V. 229, 253. — Geologischer Durch-

schnitt über Werfen. I. 16. — Geologische Karte. IV. 176, 846, 856. — Gosau-Pflanzen. IV. 168. — Grauwacke und Eisensteine. V. 369. — Höhenbestimmungen. I. 522, 543. — Hügel in der Umgebung der Stadt. II. a. 22. — Kalk und Dolomit, chemische Anal. II. b. 67. — Magnetische Elemente. I. 74; III. c. 124. — Marmor. II. a. 97, 98, b. 173; VII. 752. — Nickel- und Kobalt-Erze, Proben. X. Anh. 26, 28. — Petrefacte. II. b. 170, 173. — Salz-Ablagerungen (alpine). I. 234. — Schiefergebirg. I. 602. — Secundär-Gesteine (Reihenfolge der). X. 81. — Werner-Säcularfeier. II. d. 38. Salzhausen (Hessen). Braunkohlen-Lager. X. 521, *V.* 108. Salzkammergut. Erratisches Diluvium. II. a. 153, b. 159. — Geologische Karte. IV. 431, 432. — Höhenbestimmungen. V. 198. — Kalk-Alpen (Profile der). IV. 433. — Luft-Temperatur. II. a. 148. — Modelle der Salz-Bergbaue. II. b. 177. — Schichtungsverhältnisse der Gebirgsmassen. I. 748. — Seen (Profile der). II. b. 170. Sambor (Galizien). Magnetische Elemente. III. a. 37. Samina-Thal (Rhätikon). Geologischer Bau. X. 129, 130. Samobor (Croatien). Eisenwerk Rude. VI. 166. St. Agnes (Steiermark). Braunkohlen-Becken. X. 184, 205. St. Barbara (Steiermark). Tertiäres. VI. 299, 300. St. Benigna (Böhmen). Eisenkiesel-Pisolith. VII. 194, 607. St. Briz (Steiermark). Eisenstein-Lagerzug. VIII. 422, 425. St. Canzian (Krain). Tertiäres. IX. 368, 387, *V.* 9. St. Cassian (Tirol). Geognostische Stellung der dortigen Schichten. III. c. 134; IX. 141; X. 22, 81. St. Christoph (Vorarlberg). Magnetische Elemente. I. 73. St. Daniele (Istrien). Kreide- und Nummuliten-Schichten. X. 295. St. Egidy (Steiermark). Tegel. VI. 353. St. Eufemia (Lombardie). Jurassisches Gestein. IX. 487. St. Florian (Steiermark). Sand und Tegel. VII. 192, 567, 578. — Tertiäre Flora. VII. 579. St. Gallen (Steiermark). Pseudomorphosen nach Steinsalz. IV. 102, 103, 104. St. Georgen im Attergau. Magnetische Elemente. III. c. 124. St. Gertraud (Steiermark). Profil. X. 179. St. Günther (Böhmen). Granit. VI. 25. St. Ilgen (Kärnthen). Neogenes. VI. 562. St. Johann (Nieder-Oesterreich). Serpentin in Grauwacke. V. 477, 490, 506. St. Johann (Steiermark). Granitischer Gneiss. V. 338. St. Johann (Tirol). Magnetische Elemente. I. 74. St. Johann im Thal (Krain). Neogen-Petrefacte. IX. 380, 384, 385. St. Iván (Ungarn). Kohlensäure-Quelle. X. *V.* 36. St. Kathrein (Steiermark). Magnesit. VII. 611. St. Kunigund (Steiermark). Porphyr und Kalk. VIII. 433, 434, 435. St. Lambrecht (Steiermark). Magnetische Elemente. I. 224. — Schotter-Ablagerungen. VII. 57. — Uebergangs-Gebirg. V. 344, 354. St. Lélek (Ungarn). Trachyt. X. 516. St. Louis (Nord-Amerika). Melonites. VIII. 182. St. Magdalena (Steiermark). Braunkohlen-Becken. X. 184, 185. St. Margarethen (Krain). Neogenes. IX. 379. St. Margarethen (Steiermark). Leitha-Kalk. VII. 587. St. Maria (Lombardie). Magnetische Elemente. I. 71. St. Martin (Steiermark). Porzellanerde. IX. *V.* 49. — Süsswasser-Kalk. VII. 544. St. Michele bei Tüffer (Steiermark). Porphyr. X. 195. St. Miklos (Ungarn). Magnetische Elemente. I. 429. St. Nikolai (Steiermark). Leitha-Kalk. VII. 590, 591, 592. St. Oswald (Steiermark). Bergsturz. VIII. 269. — Braunkohlen-Gebilde. VII. 39. — Tegel mit Kohlenspuren. VII. 546. St. Pangratz (Steiermark). Conglomerat. VIII. 279, 280. St. Pangratz (Ober-Oesterreich). Eocenes. IX. 119, 120. St. Paul (Kärnthen). Basalt. VII. 344. — Magnetische Elemente. I. 225. St. Paul (Nord-Amerika). Neu gegründete Stadt. VII. 804. St. Paul (Dr. Scherzer's Bericht über die Insel). IX. *V.* 26. St. Pellegrino (Lombardie). Raibler Schichten. IX. 472. St. Peter-Fluss (Nord-Amerika). VII. 802. St. Petersburg. Geographische Gesellschaft. IV. 294. St. Pölten (Nieder-Oesterreich). Gebirgsgruppe. IV. 164, 264. St. Rochus (Steiermark). Neogenes. VIII. 452. St. Salvator (Kärnthen). Eisen-Bergbau. VI. 519, 520. St. Sévère (Frankreich). Severit. IV. 826. St. Stefano (Istrien). Geologie der Umgebung. IX. *V.* 127; X. *V.* 38. — Schwefel-Warmquelle. IX. 689, *V.* 100, 127; X. Anh. 71. St. Veit in Kärnthen. Krystallinisches Gebirg. VIII. 415, 416. St. Veit (Krain). Profil. X. 297. St. Veit an der Triesting. (Nieder-Oesterreich). Reste von Mastodon. IV. 711. St. Veit bei Wien. Aptychen-Schichten. III. c. 4. St. Vinzenz (Steiermark). Eklogit. VIII. 273. St. Wolfgang (Ober-Oesterreich). Fische der Gosau-Mergel. II. d. 166. — Gosau-Schichten. II. d. 58. — Hippuriten-Kalk. II. d. 59. — Lehm. IV. 153. — Torf. IV. 152. Sandecer Kreis (Galizien). Erdöhl. X. *V.* 183. Sann-Fluss (Steiermark). Diluvium. VIII. 454, 455, 456, 457; X. 198, 199. — Gefäll. VII. 170. — (Geologie der Gegend östlich vom). X. 155, *V.* 13. Sanok (Galizien). Magnetische Elemente. III. a. 37. Saône (Departement der obern). Durchlöcherte Gesteine und Nerineen. II. c. 47. Sapetschnig-Berg (Steiermark). Kalk auf Thonschiefer. VIII. 281. Sappada (Venetien). Grünstein. VII. 445, 446, 449. Sardinien (General de la Marmora's Beschreibung von). IX. *V.* 4. Sarisáp (Ungarn). Kohlenflötze. X. 500, 501. Saroser Comitat (Ungarn). Eocenes. X. 432. — Gebirgsarten und Petrefacte. II. d. 135. — Geologische Aufnahme. IX. *V.* 84, 94, 96, 97, 143. Sattnitz (Kärnthen). Einrisse in das Diluvium. VI. 563, 564. Sau-Alpe (Kärnthen). Eklogit. VI. 415. — Halb-krystallinische Schiefer. VI. 194; VII. 341, 342. Saucats (Frankreich). Faluns. I. 593. Saudny-Berg (Böhmen). Ur-Thonschiefer. VI. 733. Sauerecknock

(Kärnthen). Conglomerat. VI. 539. Sauersack (Böhmen). Torfmoore. VIII. 81. — Zinn-Bergbau. VIII. 54. Saulenspitz (Rhätikon). Dolomit. X. 122. Sauris (Venetien). Bunt-Sandstein. VII. 453. — Kesselthal. VII. 435. — Rauchwacke. VII. 450. Sausal-Gebirg (Steiermark). Uebergangs-Gestein. VII. 244, 245. — Tertiäres. VIII. 282, 284, 285. Sauwinkel bei Ofen. Dolomit der Nummuliten-Gebilde. VIII. 314; X. 495. Sava (Krain). Eisenstein-Bergbau. X. *V.* 59. — Trias-Kohle, Probe. VI. 852; X. Anh. 55. Save-Fluss. Eocenes. VIII. 223. — Höhenbestimmungen. VII. 675, 690. — (Kalk-Alpen südlich vom). VII. 678, 690. — Neogenes Conglomerat. VIII. 226. — Waschgold. IX. *V.* 16. Save-Gebirg (Krain). Neogene Süsswasser-Gebilde. IX. 393. Schärding (Ober-Oesterreich). Magnetische Elemente. I. 75. Schäsburg (Siebenbürgen). Magnetische Elemente. I. 431. Schafberg (Ober-Oesterreich). Panorama. I. 374. Schall-Thal (Steiermark). Lignit. VIII. 448. Schallendorf (Nieder-Oesterreich). Tertiäre Petrefacte. I. 671. Schambje (Krain). Kreidekalke. X. 327. Scharditz (Mähren). Braunkohlen-Flötze. IV. 47. — Braunkohlen, Proben. X. Anh. 58. Scharfenstein-Mühle (Böhmen). Basalt. IX. 409. Schattwald (Vorarlberg). Profil. VII. 30. Schauerleithen (Nieder-Oesterreich). Fossile Pflanzen. I. 163. — Tertiäre Kohle. V. 525; IX. 172. Schaufelgraben (Steiermark). Fossile Flora. VI. 287, 288, 289. — Leitha-Kalk. VI. 291. Schaumburg. Schloss und Museum Seiner kaiserlichen Hoheit Erzherzogs Stephan). VIII. 607. Scheft (Böhmen). Basalt. VIII. 73. Scheibbs (Nieder-Oesterreich). Kalktuff. I. 376. Scheibel-Berg (Bayern). Profil gegen Unken. IV. 358. Scheibelberger Kamm (Böhmen). Basalt in rothem Gneiss. VIII. 602. Scheibenberg (Sachsen). Magnetisch-polares Gestein. VIII. 658. Scheiblingkirchen (Nieder-Oesterreich). Krystallinische Schiefer. V. 469, 473, 475, 476. — Kalk. V. 511. — Terrassen-Diluvium. V. 528. Scheiblingstein (Nieder-Oesterreich). Durchschnitt. III. b. 49, 61. Scheifling (Steiermark). Schotter-Ablagerungen. VII. 61. Schemnitz (Ungarn). Anatas. I. 155. — Anthracit vom Theresia-Gang. IV. 163. — Behandlung der gold- und silberhältigen Geschicke. IV. 731. — Berghauptmannschaft. X. 469. — Erzgewinnung. IV. 820. — Jahrbuch der Akademie. X. *V.* 135. — Magnetische Elemente. I. 428. — Mineralien und Pseudomorphosen. IV. 183, 835. — Porphyr und vulcanische Schlacken. I. 159. — Säugthier-Reste. II. b. 160, 161. — Süsswasser-Quarz. I. 360. — Werner-Säcularfeier. II. d. 35, 36. — Zinnober. V. 223. Scherawitz (Mähren). Braunkohlen-Flötze. IV. 46. Schibaut (Steiermark). Thonschiefer mit Kalk und Quarz. VIII. 418, 419. Schilborn (Steiermark). Granat-Glimmerschiefer. V. 329. Schildbach (Steiermark). Tertiäre Petrefacte. V. 565. Schiltern (Steiermark). Leitha-Kalk. VI 303. Schio (Venetien). Kreide und Tertiäres. I. 192, 193. Schittbořitz (Mähren). Menilit-Schiefer. IV. 50; IX. 104, 127. Schlackern (Böhmen). Aphanit-Gang im Kalk. IV. 261, 263. — Kalk, Gneiss und Diorit. IV. 131, 132. Schlaggenwald (Böhmen). Gangverwerfung. VII. 172. — Zinn-Bergbau. IV. 190, 191; VIII. 50. Schlan (Böhmen). Fossile Pflanzen. X. *V.* 69, 70. Schlatten-Bach (Nieder-Oesterreich). Grauwacke. V. 512, 513. Schleinitz (Steiermark). Gneiss. VIII. 276. Schleissheim bei München. Torfmoor. III. a. 197. Schlesien (k. k.). Basalt. V. 103; VI. 318; IX. *V.* 49, 50. — Bergzehent-Entschädigung. X. 577, 578. — Dachschiefer. I. 436. — Eisenerze, Anal. X. Anh. 23. — Geologische Aufnahme des nordwestlichen Theiles. IV. 3. — Höhenbestimmungen. I. 77, 314; III. b. 115, 128; IX. 80. — Neocom der Nord-Karpathen. VI. 310. — Nord-Karpathen. III. c. 135. — Oestliche Ausläufer der Sudeten. V. 386. — Steinbrüche. V. 394. — Steinbrüche. V. 394. — Steinkohlen-Becken. IV. 649. — Thone, Anal. X. Anh. 44. Schlesien (preussisch). Braunkohle, Proben. X. Anh. 66. Schlösselwald (Böhmen) Granit. VI. 24. Schmölnitz (Ungarn). Amalgamir-Silber (ausgeglühtes). I. 150. — Behandlung der Silbergeschicke. IV. 807. — Fahlerze. III. d. 98. — Quecksilber-Gewinnung aus Fahlerz. III. c. 148. Schnals (Tirol). Gletscher. VI. 190. Schnappen-Berg (Bayern). Kalk und Dolomit. IV. 98. Schneeberg (Nieder-Oesterreich). Höhenbestimmungen. III. c. 106. Schneeberg (Königreich Sachsen). Mineralien und Pseudomorphosen. V. 433, 644, 894. Schneekoppe. Phyllit, Glimmerschiefer und Granit. X. *V.* 116, 117. Schneiderrang (Böhmen). Granit. II. b. 25. Schoberweissbach-Graben (Salzburg). Tertiäres Conglomerat. V. 139. Schöba-Berg (Böhmen). Basalt und Tuffe. IX. 435. Schöckel-Berg (Steiermark). Thonschiefer. V. 545. — Uebergangs-Kalk. V. 535. Schöderwinkel (Steiermark). Kalktuff. VII. 65. Schönau (Mähren). Pikrolith. VI. 100. — Torf. X. 231, 232. Schönberg (Mähren). Eisenglanz und Granatgestein. III. c. 130. 131. Schönficht (Böhmen). Alter Bergbau. VII. 510, 511. Schöninger-Berg (Böhmen). Granulit. V. 5, 17. Schönleiten-Joch (Tirol). Dolomit. VII. 730. Schönstein (Steiermark). Guttensteiner Kalk. VIII. 438. — Warmquelle. VIII. 461. Schöttlgraben (Steiermark). Thon aus zersetztem Glimmerschiefer. V. 332. Schottland. Fauna der Jetztzeit. IX. 584, 598. — Flora der Jetztzeit. IX. 580. — Steinkohlen-Faunen. VII. 184. — — Statistik. III. a. 122. Schottwien (Nieder-Oesterreich). Breunnerit- (Magnesitspath-) Fels. III. d. 145. — Dolomitischer Kalk. V. 507. — Grüner Schiefer. V. 869. — Gypsbrüche. I. a. 31.

— Magnetische Elemente. I. 222. — Tertiäres Conglomerat. V. 520. Schröcken-Thal (Vorarlberg). Profil. VII. 12. Schwaben (Prof. Quenstedt's Werk über den Jura in). VIII. 168. Schwabenberg bei Ofen. Diluvium. VIII. 331. — Neogenes. VIII. 327. Schwadowitz (Böhmen). Fossile Baumstämme. IX. *V.* 64, 105. Schwanberg (Steiermark). Braunkohlen-Ablagerungen. VIII. 386, 387. — Tertiäres und Diluvium. VII. 535, 567, 568; VIII. 266. Schwanberger-Alpen (Steiermark). Krystallinisches Gestein. VII. 223, 228. Schwarzachen-Thal (Bayern). Geologischer Bau. IV. 89. Schwarzau (Nieder-Oesterreich). Geologische Verhältnisse. III. a. 188; V. 475, 476, 521, 523. Schwarzbach (Böhmen). Kalkstein- und Graphit-Lager. III. d. 145; IV. 126; V. 266. — Graphit. V. 201; X. Anh. 49. — Quarz-Zug. VIII. 69. Schwarzawa-Fluss (Mähren). Nivellements. IV. 30. Schwarzenbach (Kärnthen). Blei-Bergbau. VI. 169. — Petrefacte. VIII. 179. Schwarzenbach (Nieder-Oesterreich). Amphibol-Schiefer. V. 489. — Kalk mit Granaten. V. 500. — Serpentin. V. 505. Schwarzenberg (Bayern). Nummuliten-Schichten. II. a. 12, 13. Schwarzenberg (Königreich Sachsen). Mineralien und Pseudomorphosen. V. 433, 644, 894; VI. 884, 885. Schwarzwasser (Böhmen). Steinkohlen, Proben. X. 138. Schwatz (Tirol). Rother Sandstein der Trias. X. 92. Schweden. Eisenerze. IX. *V.* 157. Schweiz (Prof. Heer's Werk über die tertiäre Flora der). V. 232; IX. *V.* 134. — Molassen-Flora. IX. 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548. — Studer's und Escher's geologische Karte. IV. 841. — Trias- Lias- und Jura-Gebilde (Gliederung der). IV. 784. Schwimminger Irrgang (Böhmen) Bergbau. VII. 41, 65. — Granit. VIII. 6. — Ur-Thonschiefer. VIII. 13. Scesa plana (Rhäticon). Dolomit. X. 121. — Durchschnitt. X. 117, 120. Scibořice (Galizien). Plänerkalk. I. 251. Sebastiansberg (Böhmen). Grauer Gneiss. VIII. 531. — Rother Gneiss. VIII. 520, 523, 526. Sebenico (Dalmatien). Magnetische Elemente. I. 232. Sebranitz (Mähren). Rothliegendes. V. 675. — Tegel. V. 759. Sedlaska-Thal (Istrien). Brachiopoden des Dachstein-Kalkes. IX. 351. Sedlitz (Böhmen). Granit und Gneiss. VI. 459, 487. — Ur-Thonschiefer. VI. 732. See (Steiermark). Schotter. VII. 64. Seebach (Steiermark). Krystallinisches Gestein. V. 324, 325. Seebenstein (Nieder-Oesterreich). Dolomitischer Kalk und Rauchwacke. V. 497. — Säugthier-Reste. II. d. 154; V. 227, 527. Seefeld (Tirol). Asphaltgestein. VII. 196. — Fossile Fische. I. 696. Seegraben (Steiermark). Braunkohlen-Pflanzen. I. 735. Seegrund (Böhmen). Zinngänge im Felsit-Porphyr. IX. 564, 565. Seeham (Ober-Oesterreich). Eocenes. IX. 119. Seehaus (Bayern). Profil gegen den Haselberg. IV. 339. Seekor (Tirol). Dolomit. VII. 730. Seeland (Kärnthen). Beckenthal. VII. 669, 670. — Erze im Kohlenschiefer. VII. 672. Seethal-Alpen (Steiermark). Bergbau. V. 343. — Geologische Beschaffenheit. V. 322, 343. — Höhenbestimmungen. VII. 709. Seewand-Berg (Böhmen). Oberflächen-Gestaltung. VI. 454. Seewiesen (Steiermark). Gypsbrüche. II. a. 32. Seferspitz (Vorarlberg). Vilser Kalk. VII. 31. Seifen (Böhmen). Ur-Thonschiefer. VIII. 13. — Zinn-Bergbau. VIII. 59. Seile (Tirol). Metamorphe Guttensteiner Kalke. VII. 718. Seisser Alpe (Tirol). Schichtenfolge. X. 81, 82. Sello (Krain). Kalkgestein. IX. 274, 275. Semil (Böhmen). Melaphyr. VIII. 706. Semlin (Militärgrenze). Magnetische Elemente. III. c. 121. Semmering (Steiermark). Höhenbestimmungen. III. c. 106. — Magnesit-Spath. III. c. 154; VI. 69. — Tunnel. I. 375, 577; II. a. 133. Senftenberg (Böhmen). Magnetische Elemente. I. 434. Senosetsch (Istrien). Kreide und Eocenes. IX. *V.* 93. — Steinkohle (vermeintliche). X. *V.* 45. Seraing (Belgien). Eisen- und Cokes-Fabrication. III. a. 200. Serbien. Bergbau-Betrieb. II. b. 57. — Erzproben. II. b. 174; X. Anh. 16, 23, 27. Serlos (Tirol). Metamorphe Guttensteiner Kalke. VII. 718. Setzka-Berg (Böhmen). Granulit. VI. 361. Seyersberg (Steiermark). Dolomit. VII. 240, 243. Siebenberge (Böhmen). Granit. VI. 800. Siebenbürgen. Geologische Aufnahmen. IX *V.* 131, 132; X. *V.* 87, 88, 105. 106, 107, 130, 131, 132. — Goldführendes Diluvium und Alluvium. V. 236, 237. — Höhenbestimmungen. V. 586. — Hütten-Production im Jahre 1847. IV. 825. — Kupfererze, Proben. X. Anh. 27. — Marmor. II. a. 101. — Sand- und Mergel-Concretionen. IV. 175. — Steinkohlen. VI. 409; X. Anh. 59. — Tertiär-Petrefacte. II. b. 173. — (nördliches). Gänge im Trachyt und Basalt. VI. 129. — (östliches). Uebersichts-Karte. X. *V.* 180, 181. Siebengebirg am Rhein. Mineralien. V. 643. Siegersdorf (Nieder-Oesterreich). Eocenes. IX. 108. — Erratische Blöcke. IX. 109, 110. Sila-Wirth (Krain). Grestener- (Lias-) Schichten. VIII. 218. Sillian (Kärnthen). Chloritische Schiefer. VII. 412. — Geologie der Umgebung. VI. 167, 168. — Glimmerschiefer. VII. 411. Singapore (Nachrichten von der Novara-Expedition aus). IX. *V.* 89. Silberberg-Elischau (Böhmen). Bergbau im Granit. V. 301; VI. 482. Silbergrün (Böhmen). Porphyr. VIII. 26. Skal (Böhmen). Amphibol-Gneiss. V. 283. Skaupy (Böhmen). Körniger Kalk mit Phyllit und Thonschiefer. VI. 695, 696, 732. — Steinkohlen-Becken. VII. 271. Skiritz (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. IX. 441. — Erdbrände. IX. 534. Skoffle (Istrien). Steinkohle. VIII. 814. Skole (Galizien). Magnetische Elemente. III. a. 39. Slanik (Böhmen). Gneiss und krystallinischer Kalk. V. 291. Slatina (Böhmen). Granitblöcke. VI. 469, 470. Slauper Höhle (Mähren). Auf-

nahme und Plan. II. a. 146. — Höhlenbär. I. 364; II. a. 136, 159. Slavonien. Eisenerze, Anal. X. Anh. 17. — Höhenbestimmungen. IV. 534, 543. — (südliches). Geognostisch-bergmännische Notizen. IV. 493. Slivje (Krain). Durchschnitt der eocenen Schichten. X. 324. Smrekoutz-Gebirg (Kärnthen). Kalk-Plateau. VIII. 411. — Massengesteine. VII. 365. Smrkowetz (Böhmen). Gneiss. VI. 485. Sobiesak (Böhmen). Aphanit. VI. 476. Sobietitz (Böhmen). Gneiss mit Amphibolit und Granat. VI. 490. Sobotka (Böhmen). Pläner. X. A. 113, 114. Sohler Comitat (Ungarn). Geologische Aufnahme. IX. *V.* 128; X. *V.* 33, 55. Solislau (Böhmen). Porphyr. VI. 608. Solstein (Tirol). Oberer Alpenkalk. VII. 721, 729. Sondrio (Lombardie). Magnetische Elemente. I. 70. Sonkolyos (Ungarn). Höhle. III. a. 30. Sonnenberg (Böhmen). Alter Bergbau. VIII. 582. Sonnenwirbel-Berg (Böhmen). Glimmerschiefer und Gneiss. VIII. 539, 540. — Quarz. VIII. 567. Sonntags-Horn (Tirol). Profil. IV. 363, 364. Sonnwendstein (Nieder-Oesterreich). Eisenstein-Lager. V. 518. Sonthofen (Tirol). Arlberg-Kalk. X. 100. — Hallstätter Kalk. X. 97. Soos (Böhmen). Kieselguhr. VIII. 488. — Mineralmoor. VIII. 487, 489, 490. Soóvar (Ungarn). Steinsalz-Gebirg. X. 440. Sorgenthal (Böhmen). Magnet-Eisenerz. VIII. 587. — Roth-Eisenerz. VIII. 598, 599. Sotzka (Steiermark). Fossile Pflanzen. I. 175; IX. *V.* 134. — Tertiäre Kohlenlager. VIII. 445, 450. Spalato (Dalmatien). Magnetische Elemente. I. 232. Spalenice-Wald (Böhmen). Aphanit. VI. 474. Spanien. Geschiebe mit Eindrücken. IV. 671. — Steinkohlen-Statistik. III. a. 105, 135. Spatzreith (Bayern). Nummuliten-Kalk. II. a. 10. Speising bei Wien. Tertiärer Meersand. X. *V.* 48. Spekau (Böhmen). Gneiss und Granit. VI. 361. Sperlgraben (Salzburg). Thon-Eisenstein. V. 385. Speschau (Mähren). Eisenerze des Grünsandes. V. 738. Spiegel-Berg (Nieder-Oesterreich). Tertiäre Schichten. IV. 274. Spielfeld (Steiermark). Tertiäres. VI. 298, 299; VII. 581; VIII. 284. — Unterer Tegel. VI. 354. Spitalwald (Böhmen). Basalt. VIII. 79. Spitzberg (Böhmen). Basalt. VIII. 79. Srbitzer Wasser (Böhmen). Conglomerat der Kohlengebilde. VII. 267. Srnin (Böhmen). Serpentin. V. 24. Stainz (Steiermark). Diluvial-Schotter. VII. 598. — Krystallinisches Gebirg. VII. 228. — Meeres-Tegel und Sand. VII. 563, 564. — Sauerquelle. VII. 233; IX. *V.* 133. — Walkererde. VII. 565. Stampf-Berg (Böhmen). Basalt. VII. 513. Stang-Alpe (Steiermark). Anthracit-Formation. IX. 185, 211, 212, 214, 216, 227; X. Anh. 61. — Arkose. VI. 538. — Pflanzenschiefer. VI. 540. — Steinkohlen- und Uebergangs-Gebirg. V. 363; VI. 175, 176, 523, 524, 536; IX. 185. Stangendorf (Mähren). Pläner. V. 710. Stangnock (Kärnthen). Eisenspath. VI. 540, 541. Stanislau (Galizien). Magnetische Elemente. III. a. 39. Stankowitz (Böhmen). Tertiäre Schichten. IX. 522, 523. Stanzer-Thal (Tirol). Profil. VII. 23. Starhemberg (Ober-Oesterreich). Dachstein-Kalk und Starhemberg- (Lias-) Schichten. IV. 730. Stary Swetlau (Mähren). Trachyt. IX. 64, 71, 73, 76, 77. Starzing (Nieder-Oesterreich). Braunkohlen-Flötze. III. a. 189, b. 40, 41; IX. 134, 135. — Eocenes Conglomerat. IX. 108. Staufenspitz (Vorarlberg). Profil. VII. 15. Stebnik (Galizien). Ozokerit. VI. 652. Stefanau (Mähren). Eisenerze. I. 355. Stehlowitz (Böhmen). Amphibol-Schiefer. VI. 362. Steierdorf (Banat). Durchschnitte. VI. 220, 232, 253. — Fossile Pflanzen. I. 357; III. a. 194, b. 170. — Grubenbrand. III. d. 143. — Jura- und Kreide-Kalke. VI. 247, 249. — Keuper-Kohle. III. a. 187; VI. 225, 234, 239, 240, 905. — Kohlen-Bergbau. I. 706; II. b. 167; VI. 239. — Porphyr. VI. 242, 245. — Sphärosiderit. VI. 340, 345, Steiermark. Arsenik- und Blei-Erze, Anal. X. Anh. 15, 16. — Bergbau-Statistik. X. *V.* 194, 195. — Braunkohlen, Proben. VI. 850, 851; VII. 157, 158; X. Anh. 59. — Eisenerze, Proben. X. Anh. 23. — Foraminiferen, Bryozoën und Ostrakoden (tertiäre). VI. 351. — Gebirgsarten, Anal. X. Anh. 40. — Geognostisch-montanistischer Verein. IV. 428; V. 228, 885; VI. 170; VII. 177. — Geologische Aufnahme. I. 561, 625, 644, 646; III. a. 91, d. 56, 62, 70; IV. 848; V. 529, 885; VI. 170, 265; VII. 219; VIII. 266, 401. — Höhenbestimmungen. II. c. 64. — Leitha-Kalk. I. 349. — Magnesit-Fels. VI. 68. — Marmor. II. a. 97. — Miocen-Molasse. I. 347, 365. — Tertiäres und Diluvium. VII. 535. — Thone, Anal. X. Anh. 45. — Torf, Proben. X. Anh. 68. — Walderde, Anal. X. Anh. 47. — Zinkerze, Proben. X. Anh. 28, 31. — (Mittel-). Geologische Aufnahme. VII. 219. — (Nord-). Geologische Verhältnisse. I. 99; IV. 848. — — Höhenbestimmungen. I. 123; IV. 528, 529. — — Kreidegebilde. IV. 170. — — Quellen- und Boden-Temperatur. I. 123. — (nordöstliches). Jüngere Ablagerungen. IV. 185. — (Ober-). Geognostische Aufnahme des südwestlichen Theiles. V. 322. — Höhen-Bestimmungen. VII. 706. — — Höhenkarte. VI. 194. — — Schotter-Ablagerungen. VII. 39, 46. — (südliches). Geognostische Aufnahme. V. 885. — (Unter-). Geologische Aufnahme. VIII. 401; X. 155, 200, *V.* 13, 75. Stein Krain). Fossile Pflanzen. I. 393. — Lias und Eocenes. VIII. 225. — Tertiäre Petrefacte. VIII. 227. Steinach (Steiermark). Tertiäre Pflanzen. IV. 478. Steinabrunn (Nieder-Oesterreich). Tertiäre Petrefacte. II. d. 109; IX. *V.* 67. Stein am Anger (Ungarn). Magnetische Elemente. I. 233. Steinbach-Thal (Nieder-Osterreich). Durchschnitt. III. b. 51. Steinberg (Böhmen). Basalt. VIII. 606. — Erdbrände. VIII. 506, 507. — Fossile Flora. IX. 543. Steinberge (Steiermark).

Orthoceratiten und Clymenien. VII. 241. — Säulen-Basalt. VI. 275. — Tertiäre Kalk-Breccien. V. 563, 564. Steinbrück (Steiermark). Bleiglanz in Gailthaler Sandstein. X. 165. — Leitha-Kalk. X. 173. — Tertiäres. X. 172. Steinhau (Böhmen). Granit. II. b. 1. Steinhöhe (Böhmen). Basalt. VIII. 78. Steinhof (Böhmen). Plastischer Thon. VIII. 483. Steinknochen-Gebirg (Böhmen). Bergbau (alter). IX. 563. Steinschloss (Steiermark). Grüner Schiefer. V. 350. Sternberg (Mähren). Pinguit. VI. 99. Sternberg (Mecklenburg). Petrefacte. VII. 839, 840. Sterzing (Tirol). Bergholz. IV. 630, 631. Steyer (Stadt). Höhenbestimmungen. II. a. 47. — Gebirge zwischen Weyer und). IV. 421. Steyrowitz (Mähren). Eocener Wiener Sandstein. V. 897. Stiepanowitz (Böhmen). Granit und Silurisches. VI. 458. Stifter Bauer (Steiermark). Crinoïden-Kalk. VIII. 421. Stikelberg (Nieder-Oesterreich). Gelber Lehm mit Quarz. V. 487. — Quarzfels. V. 514. Stilfser Joch (Tirol). Magnetische Elemente. I. 71. Stiringen (Nassau). Erdbohrungen. I. 747. Stockauer Gebirg (Böhmen). Gneiss-Formation. VI. 754. Stockerau bei Wien. Eocenes. IX. 129. Stollberg (Nieder-Oesterreich). Aptychen-Schiefer. III. c. 2, 3. — Hydraulischer Kalk. II. d. 154; III. c. 1; X. Anh. 42. Stolzenhann (Böhmen). Dolomit. VIII. 563. Stoppenwies (Salzburg). Kohlenschiefer im Kalk. V. 839. Stou-Gebirg (Kärnthen). Diabas. VII. 343, 344. — Dolomit des obern Kohlenkalkes. VII. 666. Stradonitz (Böhmen). Steinkohlen-Flora. III. d. 123, 129. Strakonitz (Böhmen). Geologische Verhältnisse. V. 271. — Krystallinischer Kalk. V. 288, 291. — Mineralien und Pseudomorphosen. IV. 635, 695. — Tertiäres. V. 314. Stramberg (k. k. Schlesien). Jurassische Schichten. IX. *V.* 57, 59. Strassin (Böhmen). Granit und krystallinischer Kalk. V. 294. Strassburg (Kärnthen). Thonschiefer. VI. 518. Strassgang (Steiermark). Kohlenführende Süsswasser-Ablagerung. VII. 543, 544; VIII. 283. Stražowitz (Mähren). Eisenerze und Gesteine, Anal. VII. 807, 808; VIII. 151; IX. 507; X. Anh. 19. Střebomislitz (Böhmen). Aphanit. VI. 476. Streitseifen (Böhmen). Zinn-Bergbau. VIII. 60. Střepsko (Böhmen). Bergbau (alter). VI. 731. — Geognostische Verhältnisse der Umgegend. VI. 682. Strunkowitz (Böhmen). Gang-Granit. V. 313. Strup (Krain). Tertiäre Conglomerate. IX. 376. Stry (Galizien). Magnetische Elemente. I. 433. Stubach-Thal (Salzburg). Amphibol-Schiefer. V. 777, 802. Stubenbach (Böhmen). Höhenbestimmungen. VII. 143. — Urwälder. VI. 170, 171. Stubennock (Kärnthen). Dolomit. VI. 539. — Eisenerz-Lager. VI. 538. — Kalk und Conglomerat. VI. 525. Stubitza (Croatien). Mineralquelle. VII. 603, 838; X. Anh. 70. Stüdtenhof (Nieder-Oesterreich). Rhinoceros tichorhinus. I. 667. Stuhlfelden (Salzburg). Krystallinische Schiefer. V. 787. Stuhlweissenburg (Ungarn). Tertiäre Petrefacte. VIII. 185, 186. Stunez-Berg (Galizien). Adnether Schichten. VIII. 143, 145. Sturmousche (Krain). Untere Trias. VIII. 213, 215, 216. Suchodoll (Steiermark). Dolomit und Eocenes. X. 216. Suchodolnig (Krain). Durchschnitt. IX. *V.* 127. Suczawa (Bukowina). Magnetische Elemente. I. 432. Sudeten. Höhenbestimmungen. VII. 279, 281, 293; X. 237. — Strassen-Nivellements. VII. 295. — (mährische). Geognostische Verhältnisse. V. 87. — (mährisch-schlesische). Oestliche Ausläufer. V. 386. Suditz (Mähren). Leitha-Kalk und Tegel. V. 755. Sudoměřitz (Böhmen). Tertiäres. VI. 362. Suello (Lombardie). Rother Ammoniten-Kalk. IX. 483. Suesser Bries (Hannover). Pflanzen der Wealden-Formation. II. b. 156, 157; III. a. 178. Sulzbach (Steiermark). Gailthaler Gebilde. VIII. 420. — Intermittirende Quelle. VIII. 460. — Sauerquelle. VIII. 463. — Uebergangs-Gebirg. VIII. 417. — Werfener Schiefer. VIII. 437. Sulzbach-Thal (Steiermark). Geologischer Bau. VII. 169; VIII. 406, 407, 408. Sulzbach-Thäler (Salzburg). Gletscher und Moränen. V. 799, 800. Sulz-Berge (Steiermark). Basalt-Tuff und Conglomerat. VI. 276, 278. Sulzdorf (Steiermark). Mineralquelle. IX. *V.* 133. Sumatra. Erz-Lagerstätten. IX. 272. Surinam. Geologische Beschaffenheit. VI. 867. Svinica (Militärgrenze). Cephalopoden. II. a. 147. — Kupfererze im Rothliegenden. IX. *V.* 46. Swětly (Mähren). Leitha-Kalk. V. 752. Swina (Böhmen). Steinkohlen-Becken. VII. 271. Swoszowice (Galizien). Schwefelflötze. I. 235, 350, 351. Sydney (Neu-Holland). Briefe der Novara-Expedition. X. *V.* 3, 4. Syrmien. Hydraulischer Thonmergel, Anal. X. Anh. 43. Szabolcser Comitat (Ungarn). Geologische Aufnahme. IX. *V.* 143. Szadellö (Ungarn). Felsschlucht. VII. 703. Szakadat (Siebenbürgen). Tertiäre Flora. III. d. 134, 135. Szántó (Ungarn). Sauerquelle. IX. *V.* 152. Szaszka (Banat). Mangan-Erze. VII. 609. — Mineralien. VII. 611. Szegedin (Ungarn). Magnetische Elemente. III. c. 120. Szentes-Berg (Ungarn). Trachyt. IX. *V.* 157. Szerednye (Ungarn). Miocenes Becken. X. 452. Szathmár (Ungarn). Magnetische Elemente. I. 430. Szthamárer Comitat (Ungarn). Geologische Aufnahme. IX. *V.* 143. Szliács (Ungarn). Mineralquellen. VI. 314; X. Anh. 73. — Rhinoceros tichorhinus. V. 887. Szöllesko (Ungarn). Trias. X. 408. Szöny (Ungarn). Magnetische Elemente. I. 427. Szolnok (Ungarn). Magnetische Elemente. III. a. 40. — Salpeter-District. I. 461. Szolyva (Ungarn). Karpathen-Sandstein. X. 417, 418.

Tabor (Böhmen). Geologie der Umgebung. VIII. 784; IX. 661. — Granit. VIII. 784; IX. 678. Taborer Kreis (Böhmen). Höhenbestimmungen. X. 37. Tachau (Böhmen). Gneissgebiet. VI. 757, 759. — Granit- und Amphibol-Schiefer. VI. 759, 760. — Quarzlager (sog. „Pfahl"). VI. 760, 771, 772, 795. — Serpentin. IV. 752. Tännen-Gebirg (Salzburg). Orographische und geognostische Schilderung. II. a. 79. — (Bunt-Sandstein und Grauwacke südlich vom). III. d. 144. Tagliamento-Fluss (Venetien). Höhenbestimmungen. VII. 459, 465. — Verlauf. I. 183. Tahiti und Taiarapu (geologische Notiz über). X. 570, *V.* 188. Taja-Bach (Steiermark). Diluvialer Schotter. VII. 57. — Krystallinische Schiefer. V. 349, 350. Tajova (Ungarn). Silber-Extraction. II. a. 109; V. 406. Tamitschau (Böhmen). Grünstein. VIII. 561. Taninge (Savoyen). Anthracit-Formation. VI. 185; IX. *V.* 48. Tann-Berg (Nieder-Oesterreich). Tertiäres. V. 520, 523; IX. 118. — Wiener Sandstein. IX. 118. Tannenberg (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. VIII. 471. Tannhausen (Steiermark). Granit. V. 539. Tappenkar (Salzburg). Breccien-Gestein. V. 814. Tarnopol (Galizien). Magnetische Elemente. III. a. 38. — Schichtenfolge. X. *V.* 129. Tarnow (Galizien). Magnetische Elemente. I. 434. Tarnowaner Wald (Krain). Plassen-Kalk und Stramberger Schichten. IX. 346. Tarvis (Kärnthen). Miocenes. I. 261. Tataros (Ungarn). Erdpech. III. a. 27, 28; VII. 742 Anmerk. Tatobit (Böhmen). Rothliegendes. IX. 242, *V.* 57. Tatra-Gebirg (Ungarn und Galizien). Adnether Schichten. VIII. 143. — Löss. II. a. 76. — (Galizisches). Geologischer Bau. X. *V.* 120. Tattenitz (Mähren). Kreide. X. 230. Taubenloch (Nieder-Oesterreich). Höhle im körnigen Kalk. V. 501, 502. Tauchen (Nieder-Oesterreich). Amphibol-Schiefer. V. 471, 472. Tauern (Salzburger und Kärnthner). Quellen-Temperatur. I. 293, 294. — Radstädter Kalk und Schiefer. V. 444, 812, 833, 834, 844, 847, 849; VI. 543. — (Geologische Verhältnisse der Nordseite der Radstädter). V. 808. Taunus-Gebirg. Sericit-Schiefer. V. 201, 358, 359. Tefferecken-Thal (Tirol). Fächerschichtung. VII. 413. Telgar (Ungarn). Werfener Schiefer. IX. *V.* 128. Telkibánya (Ungarn). Trachytisch-vulcanisches Gebiet. IX. *V.* 98, 150; X. 442, 443. Tellnitz (Böhmen). Basalt in Granit. IX. 571. Temenitz-Bach (Krain). Unterirdischer Lauf. IX. 264, 265. Temescher Bezirk (Banat). Ackererden, Anal. III. d. 88, 89. Temesvár (Banat). Magnetische Elemente. III. c. 120. Tepl-Thal bei Karlsbad. VI. 906. Teplitz (Böhmen). Felsit-Porphyr. IX. 431. — Fossile Flora. II. a. 154; IX. A. 548. — Phonolith. IX. 414. — Tertiäre Bucht. IX. 519, 530. — Warmquellen. IX. 432. Tereske (Ungarn). Cerithien- und Congerien-Schichten. IX. *V.* 120. Terglou-Gebirg (Krain). Dachstein-Kalk. IX. 341. — Trias. IX. 340. Tergove (Militärgrenze). Erz-Lagerstätten. VII. 848, 849. Ternberg (Nieder-Oesterreich). Gneiss. V. 483. — Grauwacke. V. 512. — Höhenbestimmungen. II. a. 50. — Rauchwacke. V. 496, 513. Ternitz (Nieder-Oesterreich). Eisenerz, Anal. IX. 505, 506; X. Anh. 21. Teschen (k. k. Schlesien). Grünsteine. IV. 173, 311, 312, 319. — Magnetische Elemente. I. 426. — Neocom-Schichten (obere). III. c. 139, 140; VI. 310; IX. 42, 43. Teschener Kreis (k. k. Schlesien). Höhenbestimmungen. I. 87, 314. Tétény bei Pesth. Cerithien-Schichten und Leitha-Kalk. VIII. 325, 326. Tetschen (Böhmen). Oberflächen-Gestaltung. X. 365. Teuchen (Kärnthen). Diluvialer Schotter. VI. 552. Teufelsteine (Mähren). Wiener Sandstein. IX. 55, 56. Teufenbach (Steiermark) Diluvium. VII. 59. — Krystallinische Schiefer. V. 349, 350; VII. 59. Thal (Steiermark). Letten mit Chara. VII. 545, 546. Thalheim (Siebenbürgen). Tertiäre Flora. III. d. 133, 134. Thallern (Nieder-Oesterreich). Braunkohlen-Bergbau. IV. 277, 278. Than (Nieder-Oesterreich). Eisenerze, Anal. IX. 505; X. Anh. 21. Thannheimer-Thal (Tirol). Durchschnitt gegen Vils. VII. 31. Thaur (Tirol). Kalkschiefer. VI. 331. — Kieslager. VI. 333. — Sandstein (bunter). VI. 332. Thaurer Joch (Tirol). Durchschnitt. IX. *V.* 101. Theiss-Fluss (Ungarn). Goldwäschereien. IX. *V.* 16. Theissholz (Ungarn). Knochenhöhle. IX. *V.* 147. Theusau (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. VIII. 505. Thiemendorf (Böhmen). Glimmer-Trapp. VIII. 536. Thomasdorf (Krain). Neogener Tegel. IX. 378, 379. Thorn (Preussen). Gediegen Eisen. IV. 647. Thüringer Wald. Gebirgsarten, Mineralien und Petrefacte. VII. 811. Thurmberg (Salzburg). Eisenglanz. V. 379. Thurótz (Ungarn). Geologische Aufnahme. IX. *V.* 129; X. *V.* 78. Tihány (Ungarn). Tertiäres und Basalt-Tuff. VI. 652; VII. 197. Tjiletuk-Bai (Java). Eruptive Gesteine. IX. 291, 292. Tillen-Berg (Böhmen). Aeussere Gestaltung. VII. 480. — Glimmerschiefer. VII. 482, 489. — Pseudomorphosen nach Andalusit. VII. 484. — Torfmoore. VII. 494. Tinnye (Ungarn). Tegel. IV. 405; X. 569. — Tertiäres. X. 567. Tirol. Geognostische Karte. VI. 185; IX. *V.* 74. — Höhenbestimmungen. II. a. 59, b. 133; VI. 899; X. 59. — Kupfer- und Nickel-Erze, Anal. X. Anh. 27, 28. — Marmor. II. a. 95. — Mineralien. III. b. 158. — Nördliche Kalk-Alpen. VII. 717, 851. — Pseudomorphosen. IV. 160. — Trias. IX. 466; X. 87, 92. — Werner-Säcularfeier. II. d. 38, 39. — (nördliches). Geologische Aufnahme. VIII. 785, 787, 795, 801, 802; IX. *V.* 59, 131. — — Kalk-Alpen. X. 72. — — Unterer Lias. IX. 474. — (nordwestliches). Geognostische Beschaffenheit VII. 1.

— (südliches). Contact-Wirkungen des Syenites. VIII. 164. — — Geologische Aufnahme. VII. 841; VIII. 777, 787, 788, 796. — — Kalksteine, Anal. I. 779; X. Anh. 41. — — Quarz-Porphyr. IX. *V.* 7. — (südwestliches). Erratische Blöcke. II. b. 74. — (Prof. Pichler's „Beiträge" zur Geognosie von). X. *V.* 45. — (trigonometrische Höhenbestimmungen an der Grenze zwischen Bayern und). IX. 309. Tirschnitz (Böhmen). Cypris-Schichten. VIII. 479. Tiszkur-Gebirg (Siebenbürgen). Profil. IV. 489. Tlumacz (Galizien). Geologische Aufnahme. II. a. 84. Tobiesenreuth (Böhmen). Basalt. VII. 531, 533. Tócs-Berg (Krain). Kalkschiefer der Trias. VII. 684. Toggiana (Modena). Datolith. IV. 168. Tokaj (Ungarn). Magnetische Elemente. III. a. 40. — Miocenes. X. 438. — Tertiäre Pflanzen. II. d. 166; III. a. 169; V. 202. Tokod (Ungarn). Braunkohlen-Gebilde. I. 737; IV. 142, 404, 405; VIII. 796, 797; X. 499. Tokorcin-Berg (Galizien). Tertiäres. X. *V.* 129. Tolmein (Istrien). Isonzo-Gebiet. IX. 346, 347. Tolna (Ungarn). Magnetische Elemente. III. c. 123. Tominska-Thal (Istrien). Kreidegebilde. IX. 363, 364. Topel-Bad (Steiermark). Warmquellen im Kalkgebirg. VII. 243, 244. Topolschitz (Steiermark). Warmquelle. VIII. 461. Torgola (Lombardie). Flussspath-Gang. IX. *V.* 33. Torontaler Comitat (Ungarn). Ackererde, Anal. III. d. 87, 88. Toscana. Fossile Pflanzen. IX. *V.* 135. — Marmor. II. a. 92. — Mineralien und Petrefacte. V. 430. — Schichtenfolge der secundären Gesteine. IV. 782, 784. — Verrucano. IX. 456. Totis (Ungarn). Geologische Beschaffenheit. X. 483, *V.* 57, 58. Totterfeld (Steiermark). Leitha-Kalk. V. 565. Toulouse (Denkschriften der Akademie zu). X. *V.* 17. Tóváros (Ungarn). Diluvialer Schotter von Quarz und krystallinischen Schiefern. X. 513. Tragöss-Thal (Steiermark). Magnesit. V. 68; VIII. 366. — Spath-Eisenstein. VII. 611; VIII. 365, 616, 617; X. Anh. 23, 24. Tratten (Steiermark). Krystallinische Schiefer. V. 356. — Quarz-Schwielen. V. 360. Trattnik (Steiermark). Tertiäre Kohle. VIII. 453. Traunstein (Bayern). Molasse. II. a. 3. Traun-Thal (bayerisches). Alpenkalk-Gebiet. IV. 80, 83, 84, 99. — Reihenfolge der Formationen. IV. 393, 394. Travedona (Lombardie). Nummuliten-Kalke. IX. 494. Trawnik (Mähren). Braunkohle des Quaders. IV. 62, 63; V. 730, 731. — Fossile Farne. VI. 102. Trebendorf (Böhmen). Cypris-Schichten. VIII. 478. Treffen (Krain). Krystallinisches Gebirg. VI. 514. — Pferdezahn in diluvialem Lehm. IX. 249. Tregnano (Venetien). Höhlen im Jura. II. a. 137. Tremersfeld (Steiermark). Profil. X. 167. Tremitz (Böhmen). Cypris-Schiefer. VIII. 481. Trente (Venetien). Terebratel-Kalk. I. 187. Trentschin (Ungarn). Magnetische Elemente. I. 427. Trentschin-Teplitz (Ungarn). Schwefel-Warmquelle. IX. *V.* 132; X. 1. Tribuše-Thal (Istrien). Raibler Schichten. IX. 339, 340. — Schwarze Kalke. IX. 339. Trient (Tirol). Fersina-Thal. VIII. 300. — Magnetische Elemente. I. 68. — Marmor. II. a. 95. — (Geognostische Notizen aus der Gegend von). VIII. 295, 296. Triesener Kulm (Vorarlberg). Durchschnitt. X. 130. Triest. Eisenbahn-Durchschnitt gegen Laibach. IX. *V.* 82. — Höhenbestimmungen. III. a. 41, 50. — Magnetische Elemente. I. 230. — Novara-Expedition. VIII. 369, 372, 373. — Preise der Bergwerks-Producte. I. 388, 572, 756; II. a. 173, b. 200, c. 180, d. 190; III. a. 220, b. 194, c. 176, d. 188; IV. 204, 459, 665, 881; V. 251, 464, 657, 913; VI. 216, 431, 663, 922; VII. 217, 402, 626, 864; VIII. 200, 399, 644, 827; IX. 183, 307, 517, 711; X. 153, 363, 477, 585. — Steinkohlen der Umgebung. VIII. 814. Triestacher See (Tirol). Bunter Sandstein und schwarze Kalke. VII. 423. Trifail (Steiermark). Abbau der Braunkohle. X. 191. — Braunkohlen-Becken. X. 175, 176, 177, 181. — Braunkohle, Anal. X. Anh. 54, 61. Trinidad (West-Indien). Verkieselung der Bäume. VIII. 736. Trofajach (Steiermark). Tertiäre Flora. IV. 424, 425. Trojaka-Gebirg (Bukowina). Göldische Kiesgänge. VI. 125. Troppau (k. k. Schlesien). Magnetische Elemente. I. 426. Troppauer Kreis (k. k. Schlesien). Geologische Aufnahme. IV. 3. — — Höhenbestimmungen. I. 81, 314. Trubitsch (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. IX. 528. Tržebinya (Galizien). Bernstein. VIII. 177. Tscheitsch (Mähren). Braunkohlen-Schichten. IV. 45; VII. 152. — Braunkohlen, Anal. X. Anh. 58. Tschekowitz (Böhmen). Tertiäre Pflanzen. IX. 545. Tschemoschna (Böhmen). Schichten der Steinkohlen-Gebilde. VII. 264. Tschermich (Böhmen). Fossile Flora. IX. 544. Tschernembl (Krain). Braunkohle. VII. 152; IX. 395, 396; X. Anh. 55. — Eisenerze. VII. 153; IX. 256. — Neogenes Becken. IX. 371, 372, 395, 396. Tschernoschin (Böhmen). Metamorphischer Amphibol. VI. 155. Tschernowitz (Böhmen). Fossile Pflanzen. IX. 544. Tschitscher Boden (Istrien). Geologische Beschaffenheit. IX. *V.* 93. — Geologische Karte. X. *V.* 6. — Rudisten-Gestein. X. *V.* 11. Tuchheim (Krain). Neogene Petrefacte. VIII. 227. Tuckech (Ungarn). Klippenkalk. X. *V.* 68. Tüffer (Steiermark). Durchschnitt gegen Lokautz. X. 178. — Jüngere Tuffe. X. 195, 196. — Piauzit. VII. 91, 617. — Warmquelle. VIII. 460, 461; X. 199. Türkensprung (Nieder-Oesterreich). Dolomitischer Kalk und Rauchwacke. V. 510. Türnau (Mähren). Tertiäres. V. 749. Türnitz (Nieder-Oesterr.). Marmor. II. a. 106. Türrmaul (Böhmen). Grünstein. VIII. 562. Tulbing (Nieder-Oesterreich). Erratische Blöcke. IX. 109. — Neocome Aptychen-Schichten. IX. 133.

Tulln (Nieder-Oesterr.). Tertiäres Becken. III. a. 98, 188. Tupfbad (Tirol). Porphyr. VII. 421. Turia-Wald (Kärnthen). Diluviales Conglomerat. VI. 562, 563. Turin. Denkschriften der Akademie. III. d. 130. Turrach (Kärnthen). Anthracit, Anal. X. Anh. 61. — Conglomerate. IX. 207. — Eisenerze. IX. 195, 196, 201. — Geologische Verhältnisse der Umgebung. IX. 185. — Kalklager (erzführendes). V. 364, 368; IX. 190, 199. — Krystallinische Schiefer. IX. 186. — Pflanzenschiefer. V. 366, 367; VI. 540; IX. 210. — Uebergangs- und Steinkohlen-Gebirg. V. 363; VII. 175, 185. Turracher See (Kärnthen). Grüne Schiefer. VI. 528, 529. Tysmienica (Galizien). Gyps. IX. 148.

Uddevalla (Schweden). Glaciale Schalthiere. IX. 601, 602, 603. Udine (Venetien). Magnetische Elemente. I. 228. — Petrefacte im dortigen Gymnasial-Museum. VI. 743. Uhrissen (Böhmen). Grünstein. VIII. 562. Ujhély (Ungarn). Alluvium und Miocenes. X. 448. Uj-Kemencze (Ungarn). Vilser Kalk. X. 413. Ullersloh (Böhmen). Granit. VIII. 9. Ullitz (Böhmen). Porphyr. VI. 608. Umschuss-Berg (Nieder-Oesterreich). Grauwacken-Schiefer. V. 506. Ungarisch-Brod (Mähren). Trachytische Berge. IX. V. 34. Ungarisch-Hradisch (Mähren). Geologische Verhältnisse. IX. 53. Ungarn. Ackererden, Anal. X. Anh. 47. — Braun- und Steinkohlen, Proben. X. Anh. 62. — Eisenerze, Anal. X. Anh. 24. — Erz-Lagerstätten (edle) des Trachyt-Gebirges. X. V. 71, 72. — Gebirgsarten, Anal. X. Anh. 41, 42. — Geologische Aufnahme. IV. 850; VIII. 766, 771, 778, 796, 797, 802; IX. V. 83, 84, 94, 95, 96, 97, 98, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 128, 130, 131, 156; X. 535, V. 20, 27, 55. — Geologische Gesellschaft. I. 378; IV. 432. — (Geologische Studien aus). VIII. 303, 771; X. 483. — Höhenbestimmungen. IV. 528, 535; IX. 160, 161; X. 69, V. 78, 79. — Hüttenwerke (Production der). IV. 825. — Kupfer- und Zink-Erze, Anal. 27, 28. — Marines Diluvium der Ebene. X. 459. — Marmor. II. a. 102. — Mineralien. IV. 835. — Mineralwässer, Anal. X. Anh. 73. — Rechte der Grundherren auf fossile Brennstoffe. VIII. 191. — Salpeter-Gewinnung. I. 316, 324, 453, 461, 562; II. b. 166, 186, 187; III. a. 164; X. Anh. 78. — Süsswasser-Diluvium und Alluvium. X. 463, 464. — Thone, Anal. X. Anh. 45. — Trachyt, Analysen. X. V. 135. — Trachyt-Porphyr, Perlstein und Mühlstein-Porphyr. X. V. 36. — (mittleres). Braunkohlen-Ablagerungen. X. V. 64. — (nördliches). Höhenbestimmungen. X. 555. — (nordöstliches). Geologische Aufnahme. X. 399, 405, 535. — — Geologische Karte. IX. V. 143. — — Jurassische Kalke. X. V. 46. — — Karpathen-Sandstein. X. V. 67. — — Liassische Gebilde. X. V. 21. — — Literatur. X. 400, 535. — (nordwestliches). Geologische Aufnahme. X. V. 55. — — Klippenkalk des Waag-Thales. X. V. 67, 68. — — Wassergebiet der Waag. X. V. 27, 76. Unghvár (Ungarn). Alluvien. X. 451. — Geologische Aufnahme. IX. V. 115, 116; X. 424, 425. — Karpathen-Sandstein. X. 424. — Magnetische Elemente. I. 430. Uniow (Russisch-Polen). Gyps. IX. 146. Unken (Tirol). Dachstein-Kalk. V. 128, 129. — Durchschnitte. IV. 357, 358, 360. — Soolenquelle. V. 142. — Tertiäres. V. 140. Unnütz-Berg (Tirol). Oberer Alpenkalk. VII. 727. Unter-Aspang (Nieder-Oesterreich). Glimmerlager mit Quarz. V. 486. Unter-Drauburg (Steiermark). Gneiss. VIII. 273. Unter-Etrach (Steiermark). Glimmerschiefer in Blöcken. V. 325. Unter-Lhotta (Mähren). Pläner. V. 716. Unter-Lungitz (Steiermark). Tertiäres. V. 557. Unter-Mannhartsberg (Viertel). Geologische Verhältnisse. III. d. 17. Unter-Nerestetz (Böhmen). Körniger Kalk. VI. 719. Unterort (Kärnthen). Kohle des Tegels. VII. 178. Unter-Petzen (Kärnthen). Blei-Bergbau. VI. 169. — Gasteropoden. VIII. 157, 158. Unter-Pilsmerseuth (Böhmen). Braun-Eisenstein. VII. 530, 531. Unter-Reichenau (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. VIII. 497. Unter-Rothau (Böhmen). Arsenik-Kiese. VIII. 60. — Glimmerschiefer. VIII. 9, 11. Körniger Kalk. VIII. 27. Unter-Sandau (Böhmen). Granit. VII. 508. — Quarzgang. VII. 499. Unter-Tirnau (Nieder-Oesterreich). Gewundene Kalk- und Schiefer-Schichten. III. c. 43. Unzmarkt (Steiermark). Diluvium. VII. 46, 47. — Glimmerschiefer-Gebiet. V. 340, 341. Urabsche (Krain). Sandstein und Nummuliten-Kalk. X. 297. Ural-Gebirg. Euklas. IX. V. 29. Urschelau (Bayern). Mittlere Kreide. IV. 335, 340. Ursprung (Nieder-Oesterreich). Tertiäres. IV. 275. Uschoutze (Krain). Neogenes. VIII. 227, 228. Ushova (Steiermark). Werfener Schiefer. VIII. 436. Usküb (Klein-Asien). Melaphyr. IX. V. 86. Uslawa-Bach (Böhmen). Silurische Schiefer. VII. 115. Utigsdorf (Mähren). Kohlenflötze des Quaders. V. 727, 728.

Vaduz (Liechtenstein). Eocener Flysch. X. 133. — Verrucano. X. 89, 90. Val Brembana (Lombardie). Raibler Schichten. IX. 471, 472. — — Scaglia. IX. 491. — — Verrucano. IX. 460. Val Camonica (Lombardie). Guttensteiner Kalke. IX. 464. Val Cavallina (Lombardie). Oberer Lias. IX. 484. — — Scaglia. IX. 491. Val Gandina (Lombardie). Unterer Trias-Kalk. IX. 464. Val Sassina (Lombardie). Guttensteiner und Werfener Schichten. IX. 459. — — Rauchwacke. IX. 464. Val Seriana (Lombardie). Kössener Petrefacte. IX. 478. — — Raibler Schichten. IX. 471, 472. — — Verrucano. IX. 461. Val Trompia (Lombardie). Obere Trias. IX. 465. — — Servino. IX. 457. Vallalta (Venetien). Quecksilber-Bergbau. IX. 443, V. 122. Varenna (Lombardie). Conglomerat

der untern Trias. IX. 459. — Dachstein-Kalk. IX. 469. — Dolomit. IX. 477. Varese (Lombardie). Subapenniner Thon. IX. 496. Vareser See (Lombardie). Obere Kreide. IX. 492. Vassas (Ungarn). Steinkohlen-Pflanzen. I. 356. Velber-Thal (Salzburg). Chrysotil. V. 777. — Seebecken (altes). V. 801. Velka Planina (Krain). Untere Trias. VIII. 214. Velka-Sucha (Kärnthen). Hallstätter Schichten. VII. 338. Vellacher Kotschna (Kärnthen). Gailthaler Schichten. VII. 340. — — Kalk-Alpen. VII. 169. Veltlin (Lombardie). Geologische Literatur. IX. 449. Venediger Berg. Johannes-Hütte. IX. *V.* 53. — (Central-Alpen zwischen dem Hoch-Golling und dem). V. 818. Venetianisches Königreich. Ackererden, Anal. X. Anh. 48. — — Ammoniten-Kalk (rother). III. c. 126. — — Berggesetz. VIII. 621, 623, 626, 635, 636. — — Blätter-Abdrücke. IV. 113. — — Bohrbrunnen. I. 378. — — Braunkohle, Proben. X. Anh. 65. — — Geologische Aufnahme. I. 377; VII. 850. — — Höhenbestimmungen. II. c. 78, 87; VIII. 249, 250. — — Kalksteine und Dolomite. Anal. VII. 810; X. Anh. 42. — — Marmor. II. a. 94. — — Petrefacte. X. *V.* 91. — — Säugthier-Reste in Höhlen. I. 194. — — Schichtengebilde der Alpen. I. 181, 367; IV. 780. — — Tertiäre Pflanzen und Fische. III. b. 171. Vent (Tirol). Thalbecken. II. b. 38, 39. Venus-Berg (Mähren). Vulcanisches Gestein. V. 104; IX. 13, 14, *V.* 34. Veretzke (Ungarn). Magnetische Elemente. III. a. 39. Vermaga (Siebenbürgen). Karpathen-Sanstein. VIII. 111 Anmerk., 113. Verona. Crustaceen des Grobkalkes. V. 886. — Magnetische Elemente. I. 69, 229. — Naturwissenschaftlicher Verein „Ibis“. VIII. 168. — Säugthier-Reste in Höhlen. I. 194; II. a. 137. Vesuv. Zweiaxiger Glimmer. V. 852, 863; VII. 822. Vicenza (Venetien). Braunkohlen. VII. 809. — Crustaceen des Grobkalkes. V. 886. — Magnetische Elemente. I. 229. Victoria (Neu-Holland). „Philosophical Institute.“ X. *V.* 90. Vigaun (Krain). Geologie der Umgebung. VII. 660. Vihorlat-Gebirg (Ungarn). Miocenes. X. 450. Villach (Kärnthen). Krystallinisches Gebirg. V. 585; VI. 514. — Schotter des Diluviums. VI. 561. Vils-Thal (Tirol). Durchschnitt. VII. 31. — Kalkgebilde. VII. 30. Vintl-Alpe (Tirol). Bunt-Sandstein. VI. 332. Vintschgau (Tirol). Schnalser Gletscher. VI. 190. Virgloria-Pass (Vorarlberg). Kalk über rothem Sandstein. X. 93, 94. Visp-Thal (Schweiz). Erdbeben. VI. 876. Vissegrad (Ungarn). Trachyt. VIII. 778; X. 483, 508, 509, 510, 519, *V.* 57, 58. Vites (Nieder-Oesterreich). Gneiss-Granit. III. c. 48. Vlence (Böhmen). Thongeschirr aus dem Diluvium. X. *V.* 113. Vöklabruck (Ober-Oesterreich). Magnetische Elemente. I. 75. Vöröspatak (Siebenbürgen). Aufbereitung. II. d. 88. — Geologie der Umgegend. II. d. 65, 66; III. 54, 55, 61. — Gold-Berghau. II. d. 64, 77, 86; III. c. 54, 63, 64. — Verkieseltes Holz. II. d. 73, 74. Vörösvagas (Ungarn). Opale. VIII. 176. Vörösviz (Ungarn). Erz-Lagerstätten IV. 574; IX. *V.* 84. Vöslau bei Wien. Tegel. II. d. 105. — Warmquelle. I. 57. Vogel-Berg (Krain). Kreide-Conglomerat. VIII. 221. Vogelsberg Braunkohlen-Flötze. X. 521. — Magnetisch-polare Gebirgsarten. VIII. 686. Vogesen (Departement der). Jura- und Trias-Petrefacte. II. b. 144, 145. Voiska (Krain). Durchschnitt. VIII. 216. Voitsberg (Steiermark). Braunkohlen-Becken. VI. 872, 873; VII. 550, 557, 560; VIII. 283. — Braunkohlen, Probe. X. Anh. 62. — Glimmerschiefer. VII. 233, 236. — Uebergangs-Gebirg. VII. 247. Vomper-Thal (Tirol). Alpen-Kalk. VII. 726. Vorarlberg. Algäu-Schichten. X. 109. — Geognostische Karte. VI. 185. — Höhenbestimmungen. II. a. 75, b. 143; X. 67. — Kalk-Alpen. X. 72, 135. — Kreidegebilde. VIII. 809, 810. — Lias (unterer). IX. 474. — Reihenfolge der secundären Gesteine. IV. 784; V. 881. — Trias und Lias. VIII. 796. — (Beiträge zur geognst. Kenntniss von). VII. 1. Vorder-Nessel (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. IX. 425. Vornasser Spitz (Vorarlberg). Profil. VII. 13. Vrem (Krain). Süsswasser-Gebilde (eocene). X. *V.* 9, 10. Vulcan-Pass (Siebenbürgen). Magnetisch-polarer Serpentin. VIII. 658. — Steinkohle. VI. 409.

Waag-Fluss (Geologische Aufnahme des Wassergebietes). IX. *V.* 82; X. *V.* 27. — Goldsand. IX. *V.* 16. — Wasserscheide gegen die March. IX. 55. Waag-Thal (Ungarn). Geologische Aufnahme. IX. *V.* 113. — Kreide und Tertiäres. X. *V.* 76. Wällisch-Birken (Böhmen). Körniger Kalk. V. 289. — Welliger Gneiss. V. 279. Wagrain (Salzburg). Schotter-Terrassen. V. 816. — Tertiäres. V. 206. Waidhofen (Nieder-Oesterreich). Granitit in Blöcken. IX. 110. Waidring (Tirol). Hallstätter und Guttensteiner Schichten, V. 121, 124. — Kössener Schichten. V. 125. — Rother Kalk des Lias. V. 130. Waitzen (Ungarn). Durchbruch der Donau durch den Trachyt. X. 485, 486. Walchow (Mähren). Alaunschiefer. V. 734. Walditz (Böhmen). Verwerfungsspalte im Rothliegenden. VIII. 708. Waldl (Böhmen). Süsswasser-Quarz. VIII. 494. Waldschach (Steiermark). Cerithien-Schichten. VII. 576, 577. Waldstein (Steiermark). Tertiärer Letten. VII. 545, 546. Wales. Gebirgs-Flora der Jetztzeit. IX. 580. — Kohlen-Formation. III. a. 121. Wallsee (Ober-Oesterreich). Cetaceen-Reste. III. d. 120. Walpersbach (Nieder-Oesterreich). Eisenführender Gneiss. V. 516. — Tertiäres. V. 524. Waltiře (Böhmen). Nephelin-Dolerit. IX. 412. Waltsch (Böhmen). Pflanzen des Basalt-Tuffes. IX. 403, 547. Wand bei Wiener-Neustadt. Kohlenflötze der Kreide. II. a. 144, b. 107. — Kohlen-Flora. II. a. 157.

Wanowitz (Mähren). Kreidekohle und Sphärosiderit. V. 735. — Kreide- (Pläner-) Sandstein. V. 736. Warasdin (Ungarn). Eisenerze. Anal. X. Anh. 19. — Magnetische Elemente. I. 233. Warasdin-Teplitz (Croatien). Geognostische Skizze. III. d. 13. — Schwefelquelle. IX. 165; X. Anh. 70. Warschau. Paläontologische Sammlungen. IV. 857. Wartstein-Berg (Ober-Oesterreich), Nummuliten-Gestein. IX. 118. Warwaschau (Böhmen). Granit-Porphyr. VI. 393. Wasch-Berg (Nieder-Oesterreich). Erratische Blöcke von krystallinischem Gestein. IX. 109. — Nummuliten-Gestein. IX. 112, 113. Washington „Smithsonian Institution" (Sendungen der) an die k. k. geologische Reichsanstalt. IV. 842; VI. 903; VIII. 782; IX. *V.* 145, 146. Watawa (Böhmen). Augit. VI. 154. Watawa-Fluss (Böhmen). Gneiss-Gebiet. V. 275, 276, 579, 580. — Goldhältige Alluvien. V. 270, 316. — Goldwäschen (alte). V. 569. — Höhenbestimmungen. VII. 144. — Tertiäres. V. 314. Watzmanns (Nieder-Oesterreich). Granit. III. c. 50. Waxenegg (Steiermark). Quelle. V. 555. — Schörlfels. V. 540. Weber-Graben bei Idria (Krain). Fossile Pflanzen. IX. *V.* 18. Wechsel-Berg (Nieder-Oesterreich). Geolog. Bau. IV. 173, 174; V. 465, 473, 483, 500. Weichselboden (Steiermark). Pseudomorphose von Gyps nach Steinsalz. IV. 101, 103. Weigensdorf (Böhmen). Dolomit. VIII. 563. — Grünstein. VIII. 559, 561. Wejhořice-Berg (Böhmen). Körniger Kalk. VI. 587. Weimar. Trias. IX. 158, *V.* 17. Weinberg (Böhmen). Basalt. IV. 609. Weindorf (Ungarn). Dolomit (jüngerer). VIII. 311, 315. Weipert (Böhmen). Bergbau. VIII. 573, 582, 586. — Grauer Gneiss. VIII. 543. Weissachen-Thal (Bayern). Hornstein-Schiefer. IV. 386. — Liassische Kalke. IV. 90, 99, 367. Weissenbach (Nieder-Oesterr.). Tertiäres Conglomerat. V. 520. Weisse Wand (Tirol). Kössener Schichten. IV. 733. Weissgrün (Böhmen). Variolit. VI. 606. — Vitriolschiefer. VI. 603. Weissig (K. Sachsen). Amygdalophyr mit Weissigit. IV. 647. Weisskirch (Mähren). Geolog. Aufnahme. IX. 38. — Grauwacken-Gebilde. IX. *V.* 51, 52. Weisskirchen (Krain). Brackisches Tertiäres. IX. 382, 383, *V.* 9. — Süsswasser-Conglomerat. IX. 393. Weisskirchen (Militärgrenze). Magnet. Elemente. III. c. 121. Weisswasser (Steiermark). Eocenes. VIII. 444. — Kalkgebirg. VIII. 421. Weitendorf (Steiermark). Basalt. VII. 594. Weitenstein (Steierm.). Braunkohle, Proben. X. Anh. 62. — Eisenerz-Formation. VIII. 403, 423, 427, 429. — Geologische Aufnahme. VIII. 401, 788. — Granatfels. VIII. 30. — Kalkgebirg. VIII. 412, 429, 440. — Plutonische Gebilde im Kalkgebirg. VIII. 429. — Thonschiefer. VIII. 277. Weitra (Nieder-Oesterr.). Granit. III. c. 49. Weitz (Steiermark). Braunkohlen-Flötze. V. 559. — Breccie. V. 547. — Gneiss. V. 533. — Höhlen im Kalkgebirg. V. 551. Wellitobel (Vorarlberg). Schwarzer Plattenkalk. VII. 13. Welsberg (Tirol). Thalbecken. II. b. 46. Weltsberg (Krain). Tertiäre Kalke. IX. 372, 395. Werchzirm-Alpe (Steiermark). Anthracit-Schiefer und Conglomerate. IX. 211, 227. Werchzirm-Graben (Steiermark). Grüne Schiefer. IX. 205, 211. — Kalkstein. IX. 226, 227. Werfen (Geologische Durchschnitt von Salzburg nach). I. 16, 561, 562. — Lazulit. I. 167. — Schiefer des bunten Sandsteines. IV. 716, 721, 785; V. 118, 119. Werlsgrün (Böhmen). Granatfels. VIII. 30. — Porphyr. VIII. 26, 554. Wernstadt (Böhmen). Braunkohle in Basalt-Tuff. IX. 421, 422. Weseritz (Böhmen). Ur-Thonschiefer. VI. 591. Wester-Berg (Bayern), Kalk des Lias. IV. 86. Westphalen. Süsswasser-Mollusken des Steinkohlen-Gebirgs. X. *V.* 178. Wetschken-Kögel (Kärnthen). Schichtenfächerung der krystallinischen Schiefer. VII. 411. Wetterau. Braunkohlen-Flötze. X. 521, 527. Wetterstein (Bayern). Hallstätter Schichten. VIII. 147. — Schwarze Halobien-Schiefer der Trias. VII. 379. Wexford (Irland). Glaciale Fauna. IX. 613. Weyer (Ober-Oesterreich). Denkmal für L. v. Buch. VIII. 179. — (Gebirg zwischen Stadt Steyer und). IV. 421. Wieliczka (Galizien). Steinsalz-Ablagerung. I. 237; IX. 151. — Werner-Säcularfeier. II. d. 35. Wiemitz-Thal (Kärnthen). Höhenbestimmungen. VI. 573. Wien. Barometrisches Nivellement. VIII. 171, 172, 235. — Berg- und Hüttenmännische Versammlung. IX. *V.* 46, 80. — Bibliothek des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes (Katalog der). II. a. 157, 158. — Dinotherium-Reste. VIII. 167. — Fossile Flora. II. d. 39. — Hof- und Staats-Druckerei (k. k.). III. d. 140; IV. 859. — Kalksteine der Umgebung, Anal. IX. 173, 174, 297; X. Anh. 35, 43. — Magnetische Elemente. I. 222. — Museum für vergleichende Anatomie. III. a. 190. — Nivellements. VIII. 235. — Pferdeknochen und Hufeisen aus historischer Zeit. I. 745. — Preise der Bergwerksproducte. I. 180, 388, 572, 756; II. a. 173, b. 200, c. 180, d. 190; III. a. 220, b. 194, c. 176, d. 188; IV. 204, 460, 665, 881; V. 251, 464, 657, 913; VI. 216, 431, 663, 922; VII. 217, 402, 626, 864; VIII. 200, 399, 644, 827; IX. 183, 307, 517, 711; X. 153, 363, 477, 585. — Schotter mit Säugthier-Resten. II. d. 121, 122. — Tertiäre Säugthiere. IX. *V.* 87, 88, 160. — Werner-Säcularfeier. I. 560; II. d. 1. — Čžjžek's Karte des Gebietes von). VI. 677. — (Eisenbahn-Einschnitt zwischen Linz und). IX. *V.* 83; X. *V.* 36, 37. — (Geognostische Verhältnisse des Nord-Abhanges der Alpen zwischen Salzburg und). I. 17. — (Kalk-Alpen zwischen Guttenstein und). IV. 178, 179. Wiener Becken. Absätze (Reihenfolge der). I. 677, 678. — Bucht von Malomeřitz. III. a. 140, d. 77. — Fortsetzung nach Mähren. IV. 703. — Fossile Flora. I. 744; II. a. 145, d. 39. — Geolog. Karte. VIII. 373.

— Höhenbestimmungen. III. c. 112, 113, 115. — Niveau-Verhältnisse. III. c. 115. — Plan des Donau-Stromes. II. b. 191. — Randgebirg. X. 257. — Tertiär-Petrefacten (Fundorte von). I. 662; II. d. 104. — — (Sammlung von). III. a. 221; VII. 353. — Dr. Hörnes's Werk über die tertiären Mollusken im). I. 373; II. a. 150, d. 93, 123; III. a. 177. 178, 203, b. 166, d. 135; IV. 165, 166, 851; VI. 178; VII. 188; VIII. 373, 374; IX. *V.* 139; X. *V.* 174. Wiener Berg. Höhenbestimmungen. III. c. 109. Wiener Brückl (Nieder-Oesterreich). Gyps. II. a. 29, 30. Wiener-Neustadt. Höhenbestimmungen. III. c. 109. — Kreidegebilde der „Neuen Welt". I. 618; II. b. 107. Wies (Böhmen). Basalt. VII. 532. Wies (Steiermark). Tertiäre Glanzkohle. VIII. 283, 386, 387. Wiesenau (Kärnthen). Neogene Pflanzen. VII. 334, 335. Wiesloch bei Mannheim. Galmei-Bergbau. II. b. 175. Wiesmath (Nieder-Oesterreich). Krystallinische Gesteine. V. 469, 471, 482, 486, 490. — Quarzit. V. 514. — Talkschiefer im Gneiss. V. 493. — Thon mit Quarz. V. 487, 488. Wikwitz (Böhmen). Basalt-Conglomerat und Tuff. IX. 434. Wildalpe (Steiermark). Diluvial-Terrassen. I. 102. — Marmor. II. a. 97. Wildanger-Gebirg (Tirol). Kalk- und Dolomit-Gestein. VI. 331, 338, 340. Wildbad-Gastein (Salzburg). Quellenstollen (neuer). VII. 307, 316. Wild-Gerlos (Salzburg). Kalkzug der Central-Alpen. V. 786. Wildon (Steiermark). Basalt. VII. 594. — Leitha-Kalk. VII. 585. — Tertiäre Petrefacte. VI. 351, 352. Wildshuth (Ober-Oesterreich). Braunkohlen-Formation. I. 599. — — Proben. X. Anh. 59. Wilkischen (Böhmen). Steinkohlen-Lagerstätten. VII. 262, 263. Willersdorf (Böhmen). Granit und grauer Gneiss. VIII. 532, 549. Wind-Berg (Steiermark). Miocenes. I. 104. Windhag (Tirol). Algäu-Schiefer und oberer Dolomit. VII. 30. Winding (Nieder-Oesterreich). Tertiärer Muschelsand. IV. 282. Winding-Berg (Salzburg). Eisenführender Kalk. V. 380. Windische Bühel (Steiermark). Tertiäres. VI. 265, 294, 295. Windischer Graben (Kärnthen). Steinkohlen-Petrefacte. VI. 192. Windisch-Feistritz (Steierm.). Geolog. Aufnahme. VIII. 266, 415. — Granulit. VIII. 277. — Neogenes. VIII. 445. — Serpentin und Eklogit. VIII. 276. Windischgarsten (Nieder-Oesterr.). Gyps. II. a. 30. — Höhenbestimmungen. II. a. 53. — Jurass. Gebilde. IV. 769. Windisch-Gratz (Steiermark). Geolog. Aufnahme. VIII. 366, 401. — Granit. VIII. 275. — Kohle des Neogenen. VIII. 454. — Krystallinischer und Uebergangs-Schiefer. VIII. 415. — Neogenes. VIII. 445, 449, 453. — Rudisten-Kalk. VIII. 443. — Sauerquelle. VIII. 463. — Terrassen-Diluvium. VIII. 454. Winklern (Steiermark). Glimmerschiefer mit Amphibol und Granat. V. 331. Winterberg (Böhmen). Urwälder. VI. 170. Winterstauden-Berg (Vorarlberg). Durchschnitt. VII. 3. Winterthalnock (Kärnthen). Graue Schiefer und Conglomerat. VI. 531, 532; IX. 225. Wippach (Krain). Geolog. Aufnahme. IX. 324. — Kreide und Eocenes. IX. *V.* 93. — Nummuliten-Gesteine. IX. 355. — Oolithischer Kalk. IX. 353. — Rudisten-Kalk. IX. 354. Wippach-Fluss (Krain). Eocenes in dessen Gebiet. X. 287, 291, 292, 296. Wir-Berge (Steiermark). Basalt-Tuff und Conglomerat. VI. 278. Wisconsin (Nord-Amerika). Blei-Bezirk. VII. 792, 794. — Colonisirung. VII. 792. — Technische und wissenschaftliche Anstalten. VII. 793, 794. — (D. D. Owen's Bericht über die geologische Aufnahme von). IV. 841. Wischkowitz (Böhmen). Granit und körniger Kalk. V. 295. Wisek (Mähren). Erdpech und Pflanzenreste im Rothliegenden. VI. 102. Wisloka-Fluss (Galizien). Elephas primigenius. VIII. 764. Wisowitz (Mähren). Geologische Aufnahme. IX. 38, 53. Wittin (Böhmen). Dolerit. IX. 411. Wittingau (Böhmen). Tertiäres Becken. III. d. 23, 24, V. 215, 269. — Tertiär-Flora. III. d. 144. — Torfmoore. V. 270. Wittoses (Böhmen). Braunkohlen-Schichten. IX. 536. Wlčnow (Böhmen). Granit in Blöcken. VI. 472. Wlkonitz (Böhmen). Granit auf Gneiss. V. 282. Wobora (Böhmen). Feuerfester Thon. VII. 128. Wochein (Krain). Dachstein-Kalk. VII. 681. — Geologische Aufnahme. IX. 324. — Miocener Kessel. I. 394; VII. 687. — Schotter-Terrassen. VII. 687, 689. — Spuren eines römischen Eisenwerkes. I. 199, 366. — Trias. IX. 340. — Werfener Schichten. VII. 682. Wodierad (Böhmen). Fossile Pflanzen. IX. 544. Wodnian (Böhmen). Glimmer-Granit. VI. 370. — Turmalin-Granit. VI. 381. Wöllan (Steiermark). Diorit. VIII. 447, 448. — Guttensteiner Kalk. VIII. 440. — Nulliporen-Kalk. VIII. 446. — Porphyr. VIII. 432. Wölch (Kärnthen). Eisen-Lagerstätten. VI. 199. Wöllersdorf (Nieder-Oesterreich). Relief-Karte. VIII. 815, 816. Wörschach (Nieder-Oesterreich). Wolkensteiner Schwefelquellen. I. 57. Wörther See (Kärnthen). Diluvialer Schotter. VI. 553. — Steinkohlen-Formation. VI. 546. Wössener Kienberg (Bayern). Gervillien-Schichten. IV. 343. Wohlau (Böhmen). Bergbau (alter). VIII. 593. — Körniger Kalk. VIII. 565. Wolenice (Böhmen). Gneiss-Glimmerschiefer. V. 283. — Granate im Gneiss. V. 282. Wolfsberg (Böhmen). Amphibol (umgewandelter). VI. 155. — Basalt. VI. 802. Wolfsberg bei Pesth-Ofen. Kalkmergel. VIII. 316. — Wolfsegg (Ober-Oesterreich). Braunkohlen. VII. 164, 174; X. 140, Anh. 58. — Tertiäre Petrefacte. IV. 190. Wolfsgrube (Steiermark). Klaus-Kalk. VIII. 442. Wollin (Böhmen). Geologie der Umgebung. V. 271. — Granit. V. 306, 311. Wolska-Fluss (Steiermark). Geologische Aufnahme des Gebietes. X. 155. Woltin (Böhmen). Gneiss mit körnigem Kalk. IX. 666, 672. Woltschach (Krain). Kalk-

gebilde mit Caprotinen. IX. 347, 348. Woltusch (Böhmen). Quarzit-Conglomerate. VII. 119. Wondreb-Fluss (Böhmen). Basalt. VII. 532; VIII. 485. Woroniaki (Galizien). Tertiäres. X. *V.* 128. Wotin (Böhmen). Granit. VI. 484. Wotiz (Böhmen). Geologische Aufnahme. VIII. 775, 776; IX. 661. — Granit (porphyrartiger). IX. 675, 676. — Phyllit, Pegmatit und Kalk. IX. 685. Wotsch (Böhmen). Granulit und Basalt. IX. 438. Wottawa (Böhmen). Gabbro. VI. 177, 178. Wotwowitz (Böhmen). Röthel. X. 353. — Steinkohlen-Formation. X. *V.* 14, 194. Woyniłow (Russisch-Polen). Gyps. IX. 148. Wresie (Steiermark). Gosau-Mergel. VIII. 443. Wscherau (Böhmen). Steinkohlen führende Schichten. VII. 259, 262, 263. Wtelna (Böhmen). Braunkohlen-Mulde. IX. 440. — Erdbrände. IX. 534. Wuchern (Steiermark). Krystallinische Schiefer. VIII. 277. Württemberg. Gas-Exhalationen aus dem Dolomit des Steinsalz-Gebirgs. VII. 831. Wundergraben (Bayern). Ammoniten-Marmor (rother). IV. 85, 99. Wutschka (Krain). Tertiäres. IX. 368, 869.

Zabor (Böhmen). Granit-Blöcke. VI. 468. Zadach (Steiermark). Braunkohlen-Gebilde auf Gneiss. V. 559. Zahořan (Böhmen). Mangan-Erze. VI. 698. — Schichten-Windungen. VI. 690. Zahroby (Böhmen). Felsit-Schiefer. VII. 108. Zakriž (Krain). Gailthaler Schichten. IX. 360. Zaleszcyker Kreis (Galizien). Höhenbestimmungen. III. b. 135. Zalundi-Alpe (Vorarlberg). Durchschnitte. X. 118. Zamlekau (Böhmen). Glimmer-Feldspathgestein. VI. 471. — Granit in Blöcken. VI. 469. Zamutó (Ungarn). Eisenerze im Miocenen. X. 450. Zara. Magnetische Elemente. I. 231. — Nummuliten- und Hippuriten-Gesteine. III. a. 193, 194. Zastiena (Krain). Woltschacher Kalk. IX. 362. Zayer (Krain). Braunkohlenflötz. VIII. 224. — Eocenes und Diluvium. VIII. 223, 224, 371. — Gänge von Bleierzen. VIII. 385, 396. Zbrucz-Fluss (Galizien). Gyps. IX. 145, 146, 147, 154. Zdiar-Berg (k. k. Schlesien). Diallag. V. 102. — Mineralien. VI. 156; X. 228. — Pseudophit. X. 228. — Serpentin. V. 101; VI. 156; X. 227. Zduchowitz (Böhmen). Diorit. VI. 714. — Versuchsbaue auf Erze. VI. 727. Zeberkogel (Steiermark). Eisenerz-Lagerstätte. VIII. 366. Zechner-Graben (Steiermark). Anthracit. IX. 215. Zedlitzdorf (Kärnthen). Terassen-Diluvium. VI. 555. Zeitschach (Steiermark). Geröll der Hochfläche. VII. 61. Zelking (Nieder-Oesterreich). Tertiärer Sand. IV. 282. Zeller Thal (Kärnthen). Rother Porphyr. VII. 345. Zellnitz (Steiermark). Tertiäres Conglomerat. VIII. 286. — Werfener und Guttensteiner Schichten. VIII. 278. Zempliner Comitat (Ungarn). Eocenes. X. 432. — Geologische Aufnahme. IX. *V.* 143; X. 423. Zerutek (Mähren). Schiefer des Rothliegenden. V. 675. Zesenza-Graben (Krain). Gailthaler Schichten und Rudisten-Kalk. VIII. 210. Zeyring (Steiermark). Eisenerz-Lagerstätte. V. 335. — Krystallinisches Gebirg der Alpen. V. 322, 334. — Krystallinischer Kalk. V. 334, 335. — Tertiäres. VII. 43. Zieberle (Böhmen). Rother Gneiss und Ur-Thonschiefer. VIII. 565. — Roth-Eisenstein in Gängen. VIII. 599. Zieditz (Böhmen). Erdbrände. VIII. 506. — Oberer Thon. VIII. 507. Ziegelberg (Böhmen). Granit in Quarzit. VI. 690. Ziegenberg (Böhmen). Basalt. VI. 609. Ziegenruck-Berg (Böhmen). Lager von Dachschiefer. VII. 466, 471. Zillingdorf (Nieder-Oesterreich). Kohlen-Ablagerungen (tertiäre). II. d. 47. Zimitz (Böhmen). Graphit. V. 297. Zimper-Spitz (Vorarlberg). Trias. X. 118, 119. Zinnwald (Böhmen). Porphyr. IX. 550, 553, 573. — Zinnerz-Lagerstätten. IX. 562, 564, 573. Zinsath (Steiermark). Krystallinische Schiefer. VIII. 277. Zipser Comitat (Ungarn). Erz-Lagerstätten. X. *V.* 39. — Geologische Aufnahme. X. 535. — Schiefergebirg. X. *V.* 20. Zircz (Ungarn). Ackererden, Anal. III. d. 118. Zirol-Berg (Böhmen). Basalt. VIII. 604, 605. Zittau (K. Sachsen). Krystallinische Gesteine im tertiären Becken. X. 369. Zlezitz (Böhmen). Granit im Kalk. V. 295, 296. Zlin (Mähren). Geologische Aufnahme. IX. 53. Znaim (Mähren). Magnetische Elemente. I. 425. — Schotter (diluvialer und tertiärer). IV. 79. — Satinober. X. 573. Zöbarn (Nieder-Oesterreich). Krystallinische Gesteine. V. 481, 482, 488, 493. Zöptau (k. k. Schlesien). Topfstein. V. 97. Zogelsdorf (Nieder-Oesterreich). Tertiäre Petrefacte. I. 666, 669. Zoller-Bach (Böhmen). Alter Bergbau. V. 284. — Gneiss-Glimmerschiefer. V. 283. Zombor (Ungarn). Ackererde, Anal. III. d. 86, 87. Zottelhof (Nieder-Oesterreich). Eisenspath-Lager. V. 517. — Uebergangs-Kalk. V. 509. Zovencedo (Venetien). Säugthier-Reste der Braunkohle. IX. *V.* 121; X. *V.* 53. Zsambék (Ungarn). Geologische Verhältnisse der Umgebung. X. 483. — Leitha-Kalk. X. 507. Zsebely (Banat). Ackererde, Anal. III. d. 88. Zugspitz-Berg (Bayern). Geologischer Bau. VI. 900. — Hallstätter Schichten. VIII. 147. — Trias. VII. 378, 379. Zukla (Krain). Tertiäres. IX. 369, 370. Zulegerbühl-Berg (Böhmen). Basalt. VIII. 73. Zunderkopf-Berg (Tirol). Rauchwacke und Dolomit. VI. 339. Zunderwände (Kärnthen). Dolomit. VI. 527. Zuppa-Thal (Dalmatien). Durchschnitt. X. *V.* 24. Zwettel (Nieder-Oesterreich). Thon-Glimmerschiefer. III. c. 45. Zwickau (K. Sachsen). Magneto-elektrische Strömungen im Steinkohlen-Gebirg. VIII. 666, 667. Zwischlern (Krain). Neocomes. IX. *V.* 71, 72. Zwittau (Mähren). Kreide-Sandstein (oberer). V. 708, 712. Zwittawa (Mähren). Schieferthon des Rothliegenden. V. 677. Zwittawa-Thal (Mähren). Höhen-

bestimmungen. V. 161. Zwittawka (Mähren). Kalk des Rothliegenden. V. 678. Zwodan (Böhmen). Lignit-Schichten. VIII. 502, 503.

III. Sach-Register.

Achate (autotypische Darstellung der). II. b. 124, d. 169. Achat-Mandeln. I. 747. Ackerbau-Geologie. I. 129, 137. Ackererden aus dem Banat. III. d. 81, 86; X. Anh. 45, 46. — aus Ungarn. III. d. 118; X. Anh. 47. — aus dem Venetianischen. III. a. 160; X. Anh. 48. — (Analyse der). I. 376; III. a. 160; VII. 361. Adnether (Lias-) Schichten der Nordost-Alpen. IV. 745. — — in Istrien. IX. 341, 342. — — in den Karpathen. VIII. 143. — — in Nord-Tirol und Vorarlberg. X. 108, 120. — — Petrefacte. IV. 746. Alaunerde am Büdös-Berg. V. 217. Alaunschiefer im Pilsener Kreise. VII. 258. Alaunstein in Nordost-Ungarn. I. 148, 149; IX. *V.* 117. Algäu-Schichten in Nord-Tirol und Vorarlberg. X. 109. Algäu-Schiefer. VII. 27, 28, 35, 38. Alkalien (Trennung der Magnesia von den feuerbeständigen). IV. 863. Allochroït-Fels. X. 223. Allomorphit. IV. 152; X. Anh. 2. Allophan. X. 19. Alluvial-Seifenwerke. VIII. 81. Alluvium des Achen-Sees. VII. 738. — bei Edelény. VII. 693. — im Egerer Becken. VIII. 491. — bei Eisenerz. V. 406. — im Enns-Thale. IV. 481. — in Istrien. IX. 356; X. *V.* 6, 7. — im Körös-Thale. III. a. 22. — in Mähren. IV. 28; V. 106, 107. — am Neusiedler See. III. d. 55. — der Nordost-Alpen. I. 56, 60; VII. 383, 384. — der nördlichen Steiermark. I. 99; III. d. 58; IV. 185. — in Ober-Krain. VIII. 233. — im östlichen Kärnthen. VII. 333. — in Unter-Steiermark. X. 198. — im Viertel unter dem Mannhardsberg. III. d. 18. — (älteres) im Gebiete der obern Mur. VII. 46. — (Gold führendes) in Böhmen. VII. 131. — — — im österreichischen Kaiserstaate. V. 230, 231. — (Süsswasser-) in den Nordost-Karpathen. X. 463. — — der ungarischen Ebene. X. 464. Alpen-Kalk. Analyse. IV. 152; X. Anh. 37. — mit Dachstein-Bivalve. III. d. 90, 135; IV. 731, 732. — um Lienz. VI. 444. — der nordöstlichen Alpen. I. 33; III. d. 65; IV. 774; V. 849. — in Ober-Krain. I. 398, 399. — der östlichen bayerischen und angrenzenden österr. Alpen. IV. 80, 326, 367. — von Raibl. I. 257, 261. — (oberer). VII. 729. — (unterer). IV. 367; VIII. 722. Alpen- (Lias-) Kohle. I. 624, 625, 626; II. b. 107. Alpen-Schiefer. VII. 35, 36. Alstonit. IV. 832; X. Anh. 2. Alterthümer aus den Celten-Gräbern bei Hallstatt. II. b. 148. Alunit (Krystallgestalt). III. d. 25. Amalgamation des Schwarzkupfers. IV. 813, 814. Amalgamir- und Quetsch-Maschine von Berdan. V. 207. Amaltheen-Mergel von Lienz. VI. 447. — der östlichen bayerischen Alpen. IV. 85, 99, 381. Amethyst von Meissau. I. 158. Ammoniten-Kalk von Hallstatt. I. 656; II. b. 149, 150. — der venetianischen Alpen. I. 187, 191; III. c. 126. — (liassischer) von Lienz. VI. 449; VII. 420. — — der Lombardie. IX. 480, 481, 482, 483. — (rother) in Central-Ungarn. X. 491. — — des Lias. III. b. 83; IV. 745; IX. 481, 482, 483. — — der östlichen bayerischen Alpen. IV. 381. — — um Trient. VIII. 306, 307. — — des Venetianischen. III. c. 126. Amphibolit in Böhmen. VI. 717, 718. — mit Granit. VI. 804. — von Hüttenberg. VI. 625. — in Mittel-Böhmen. VI. 387, 389. — bei Ronsperg. VI. 782, 786. — (körniger) in Steiermark. V. 543. — -Formation des Böhmerwaldes. VI. 774, 782. — — in Südwest-Böhmen. VI. 588. — -Gestein mit Kalk, Quarz und Granit. IV. 133. — — in Mähren. III. c. 130. — — im nördlichen Böhmen. VII. 320. — — (Eisenerze im). VIII. 62. — -Gneiss der Central-Alpen. V. 771. — — im körnigen Kalk. IV. 129, 131, 133, 134, 135. — -Granit. V. 307; VI. 369. — -Schiefer in Böhmen. VI. 693, 713. — — der Central-Alpen. V. 771. — — im Egerer Kreise. VII. 499, 505, 508, 509. — — in Mähren. IV. 11; X. 226, 227. — — in Mittel-Böhmen. VI. 362. — — in Nieder- und Ober-Oesterreich. III. c. 38, 43, 44; IV. 280; V. 488. — — im Rosalien-Gebirg und am Wechsel. V. 488. — — von Schwarzbach. IV. 127. — — im Silur-Gebiete von Mittel-Böhmen. VII. 111. — — in Steiermark. V. 540, 541. — — im südlichen Böhmen. V. 266. Amygdalophyr von Weissig. IV. 647. Anamesit im Leitmeritzer Mittelgebirg. IX. 405. Anatas von Hodritsch. I. 155. Anatomie (Wiener Museum für vergleichende). III. a. 190. Anauxit. V. 83; X. Anh. 2. Andalusit in Kyanit verwandelt. I. 350, 358, 359. — von Landeck. VI. 158; X. Anh. 3. — in Speckstein umgewandelt. VII. 184. — des Tillen-Bergs. VII. 483, 484. Ankerit, Analysen. IV. 613, 614, 615, 757, 827; VII. 806; X. Anh. 21, 22, 26. Anthozoën-Facies des Leitha-Kalkes. VII. 583, 584; X. 293. — -Schichten in Unter-Krain. IX. 385. Anthracit. III. a. 105, 113, 116, 117, 138; V. 225. — Analysen und Proben. V. 225; VII. 152; X. Anh. 50, 61. — von Budweis. V. 225. — von Pennsylvanien. III. a. 138, 179, 183, c. 7, 30. — von Schemnitz. IV. 163. — der Stang-Alpe. V. 365, 368, 851; VI. 523, 524, 536; VII. 152; IX. 185, 214, 215, 217, 227. — -Asche, Anal. III. c. 17.

— -Flora von Budweis. V. 197. — -Kohle von Murau. VII. 807. — -Schiefer in Savoyen. IX. *V.* 48. Antimonit in Biotit-Porphyr. VI. 401. — im Guttensteiner Kalk. VIII. 439. Antimon-Säure in Kupfererzen. X. 20. Apatit von Přibram. VI. 47. — mit Rutil in Quarz. VII. 231. Aphanit im böhmischen Silur-Gebiete. VII. 126, 127. — des Granit-Porphyres. VI. 473, 474. — im Kalk. IV. 261, 263; V. 309. — in Nieder- und Ober-Oesterreich. III. c. 52; IV. 259, 261. — in Südwest-Böhmen. VI. 605, 606. — bei Teschen. IV. 316, 317. — -Mandelstein. III. c. 130; IV. 317. Aphrosiderit. V. 79, 81, 337; X Anh. 3. Apparat zur Erzielung gleichmässiger Temperaturen mittelst einer Gaslampe. VI. 64. — (polygraphischer) der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. III. d. 140. Aptien-Schichten. III. c. 139. Aptychen-Kalk im Nordwest-Tirol. VII. 730, 734. — — von Oberalm. V. 134, 135, 595, 596. — — im Randgebirg des Wiener Beckens. X. 257, 260, *V.* 4, 5. — -Schichten des Jura und Neocom in Oesterreich. V. 439, 440. — -Schiefer in Nieder-Oesterreich. III. a. 199, c. 1. — — in den östlichen bayerischen Alpen. IV. 100, 334, 339, 390. Araeoxen. II. d. 169. Aragonit im Basalt-Tuff. VII. 166. — in Rauchwacke. VIII. 299. Arkose in Nordost-Böhmen. VIII. 704, 705. Arlberg-Kalk. X. 100, 119, 131. Arsenik-Kies, Analysen. IV. 400, 828; IX. 294; X. Anh. 15. — — im Egerer Kreise. VIII. 60. — -Kiesen (Gewinnung des Goldes aus den Bergreichensteiner). III. a. 204. Asbest in Serpentin. V. 101. Asphalt aus Galizien. IX. 407; X. Anh. 32. — des Körös-Thales. III. a. 27, 28. — -Fabrication zu Giudecca. VII. 760. — — zu Seefeld. VII. 196, 372. — -Gestein aus Dalmatien. I. 749; II. d. 137, 138; VII. 761. — — aus Istrien. II. d. 137, 138. Atomgewicht, Härte und specifisches Gewicht isomorpher Minerale (Zusammenhang zwischen). III. d. 104. Aufbereitung der Goldgeschicke in Vöröspatak. II. d. 88. Augit, Analyse. V. 86; VI. 154; X. Anh. 3. Augit-Gestein in Mähren. III. c. 130, 146. Auslaugung (continuirliche) des Ausseer Salzberges. I. 373, 411. Ausstellung (Agricultur- und Industrie-) zu Paris. VII. 182, 198, 364, 376; VIII. 772; IX. *V.* 10.

Baltimorit. IV. 134; X. Anh. 3. Band-Achat, Analyse. II. b. 125; X. Anh. 3. Barytes (industrielle Verwendung des). III. a. 172. Barytspath im Eocenen. VIII. 317. — von Přibram. VI. 48. — (Krystalle von) in der Karlsbader Militär-Badhaus-Quelle. IV. 864; V. 142; X. Anh. 4. — (himmelblauer) von Naurod. III. d. 26, 27, 28. Basalt im böhmischen Fichtelgebirg. VII. 531. — von Duppau. VII. 194, 195, 329. — im Egerer Kreise. VIII. 72. — im Erzgebirge des Saazer Kreises. VIII. 605. — von Gleichenberg. VI. 273. — von Hrosenkau. IX. 79. — im Karlsbader Gebirg. VII. 512, 513. — des Köhlerberges. IX. 14, *V.* 36. — des Leitmeritzer Mittelgebirges. IX. 400, 404, 406, 409. — des Liesener Gebirges. IX. 433, 437. — in Mähren. IV. 11; V. 102; IX. 11, 60, 79. — Magnetische Polarität. VIII. 661, 663, 683, 689, 691. — in Nordost-Böhmen. VIII. 707. — des nordwestl. Riesengebirges. X. 395. — im östlichen Kärnthen. VII. 344. — des Rautenberges. VIII. 760; IX. 11, *V.* 35; X. Anh. 33. — in k. k. Schlesien. VI. 312; IX. *V.* 49, 50. — im Steinkohlen-Gebiete des Pilsener Kreises. VII. 260. — in Südwest-Böhmen. VI. 592, 609. — von Weitendorf bei Wildon. VII. 594. — (metallisches Blei in). X. *V.* 53. — (säulenförmiger). IV. 275, 313. — -Conglomerat des Egerer Beckens. VIII. 485. — — von Gleichenberg. VI. 273, 279. — — im Leitmeritzer Mittelgebirg. IX. 400, 402. — — im nordwestl. Riesengebirg. X. 397. — -Schlacken im Kainach-Thal. IX. *V.* 109. — -Tuff von Gleichenberg. VI. 273, 279, 280, 282, 284. — — des Leitmeritzer Mittelgebirges. IX. 402, 439. — — in Mähren. V. 103. — — im nordwestl. Riesengebirg. X. 397. — — Pflanzenreste. VI. 285. — — (Braunkohlen führender). IX. 411, 412. Bau-Materialien des Oesterreichischen Kaiserstaates auf der Pariser Ausstellung. VII. 747. Belemniten (optische Untersuchungen an). VII. 830, 831. Bergbaue im Banat. I. 705; II. b. 167; III. a. 187; VI. 238, 245. — im böhmischen Erzgebirge. VII. 365, 366; VIII. 568, 569; IX. 558. — in der Bukowina. V. 219; VI. 115. — auf der Comenda-Alpe. VII. 673. — im Egerer Kreise. VII. 491, 529; VIII. 31. — am Eibenberge bei Grasslitz. X. 350, *V.* 89, 90. — zu Felsőbánya. IV. 575. — zu Kapnik. IV. 576, 577. — von Lepeina. VII. 643, 657, 658. — zu Michaëlsberg. IV. 435. — in Mittel-Böhmen. VI. 401, 413. — zu Nagyág. III. a. 70; VIII. 127, 709, 718, 724; IX. *V.* 3. — zu Nagybánya. IV. 568, 571. — auf Nickel im Leogang-Thale. V. 148. — im nordöstlichen Fichtelgebirg. VII. 529. — im nordwestlichen Theile der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. VII. 786. — von Ober-Zeyring. V. 335, 336. — von Passail. V. 547. — in Persien. III. b. 111, 112. — Pöllau. V. 348, 349. — von Přibram. I. 310. — im Rosalien- und Wechsel-Gebirg. V. 517, 519. — von Rudolfstadt. V. 107. — im Salzburgischen. V. 260, 261. — von Schemnitz. IV. 820. — im Seethal. V. 343, 344. — in Serbien. II. b. 57, 174. — von Silberberg-Elischau. V. 301, 302. — in Südwest-Böhmen. VI. 613. — von Turrach. V. 365. — von Vöröspatak. II. d. 64, 77; III. c. 54, 62. — auf Zink im Badischen. II. b. 175. — (alter) im Böhmerwald. V. 581, 583. — — des Fladnitz-Thales. VI. 533. — — im nordamerikanischen Kupfer- und Blei-Gebiete. VII. 787, 798. — — bei Zahorzan. VI. 698. — (Alb. v. Miller's Werk über den steiermärkischen).

X. V. 194. — -Gesellschaften in Nord-Amerika. VII. 790, 800. Bergbücher (Einrichtung der). VIII. 629, 630, 632, 634, 818. Berg-Gerichtsbarkeit in der Militärgrenze. IV. 867, 868. Berggesetzes (Einführung des allgemeinen). VIII. 621, 623, 626, 635, 636; IX. 699, 700. Berghauptmannschaften (Uebersicht der). IX. 702. Bergholz von Sterzing. IV. 630; X. Anh. 4. Bergrechtskunde (Freih. v. Hingenau's Handbuch der). III. a. 150. Bergsturz von Magyarókérek. II. d. 60. Bergtheer im Karpathen-Sandstein. VI. 101. — von Muraköz. I. 356. — von Peklenicza. VII. 738, 741, 744, 746; VIII. 161. Bergwerks-Abgaben. V. 901; VI. 205, 657; VII. 390, 391; IX. 511; X. 578. — -Producte (Preistabelle der). I. 180, 388, 572, 756; II. a. 173, b. 200, c. 180, d. 190; III. a. 220, b. 194, c. 176, d. 188; IV. 204, 459, 665, 881; V. 251, 464, 657, 913; VI. 216, 431, 663, 922; VII. 217, 402, 620, 864; VIII. 200, 399, 644, 827; IX. 183, 307, 517, 711; X. 153, 363, 477, 585. — -Production (Friese's Uebersicht der österreichischen). VII. 846, 847. Bergwerken (magnetische Beobachtungen in). VIII. 666, 667. Bergwesen in Niederländisch-Indien. IX. 277. Bergwesens-Gegenstände (Erlässe und Verordnungen über). II. d. 171; III. a. 208, b. 173, c. 161, d. 151; IV. 197, 438, 866; V. 448, 646, 901; VI. 205, 656, 912; VII. 330, 615, 854; VIII. 189, 390, 621, 818; IX. 511, 699; X. 143, 357, 469, 577. — — (Beobachtungen, Versuche und Erfahrungen über) im Laufe des Jahres 1851. III. d. 131. Bergzehent-Entschädigung. VII. 390, 391; X. 577. Berg- und Hüttenwesen (Freih. v. Hingenau's Oesterreichische Zeitschrift für). IV. 171. Bernstein bei Krakau. VIII. 177. — bei Lemberg. II. b. 163. — in Moorkohle. V. 198. Berthierit. IV. 635; X. Anh. 4. Besteigung des Gross-Glockner's (D. Stur's). VI. 814. Biancone (Neocom) der Lombardie. I. 188, 189. Bibliothek des k. k. Hof-Mineralien-Cabinets. II. a. 157, 158, d. 150, 151. Bimsstein-Conglomerat. VII. 694, 695, 696, 697. — -Tuff. VII. 696, 697. Biotit. X. Anh. 4. — -Porphyr. VI. 393, 729. Bison-Jagd im Thal des St. Peter-Flusses (Nord-Amerika). VII. 803. Bittererde (Scheidung der) von den feuerbeständigen Alkalien. IV. 863. Bitter-Kalkspath in Mähren. VI. 99; VIII. 760; X. Anh. 4. Bittersalz-Schichten in Nordwest-Böhmen. IX. 441. Blei (metallisches) in Basalt. X. V. 53. Blei-Bergbau im Egerer Kreise. VII. 491, 511. Bleiberger (Trias-) -Schichten. VII. 337. Bleierze im Egerer Kreise. VIII. 43. — im Erzgebirge des Saazer Kreises. VIII. 586. — im Kärnthner Kalkstein. V. 212, 213; VI. 169; VII. 87, 369, 370. — von Kirlibaba. VI. 122. — in Ober-Krain. VIII. 385, 386. — Proben. X. Anh. 15, 16. — von Raibl. I. 263, 264. — im siebenbürgischen Trachyt und Basalt. VI. 129. — bei Turrach. IX. 201. Bleierz-Gänge im Leitmeritzer Erzgebirg. IX. 556. Blei-Gebiet des nordwestlichen Theiles der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. VII. 771, 792, 794, 795. Bleiglanz im Gailthaler Sandstein. X. 164. — von Přibram. VI. 56, 62. — pseudomorph nach Cerussit. VI. 62. — (silberhältiger) von Kirlibaba. V. 223; VI. 122. — (überschwefelter). V. 888, 889; VI. 1; X. Anh. 5. Bleikörner in goldhältigem Sand. IV. 497, 498. Bleikrätze. Analysen. VIII. 154; X. Anh. 30. Blei-Lagerstätten von Bleiberg. VII. 87, 337. Bleispeise. Analyse. I. 343; X. Anh. 31. Blei-Vitriol. X. 21. Bohnerz im Banat. V. 247. — bei Bleiberg. VII. 88. — im Dachstein-Gebirg. II. b. 160; V. 198, 439. — in Ober-Krain. I. 405. Bohrbrunnen von Passy bei Paris. VII. 206. Boltonit. X. Anh. 5. Bolus, Analyse. IV. 634; X. Anh. 5. Borazites (Dr. Volger's Monographie des). VI. 186. Borelis-Kalk. X. 293, 319. Bouteillenstein. V. 868; X. Anh. 5. Brackwasser-Absätze in Krain und Istrien. IX. 374, 380. 381; X. 283. — — bei Tinnye nächst Ofen. X. 569. Braun-Eisenstein im böhmischen Fichtelgebirg. VII. 530. — — im böhmischen Silur-Gebiete. VII. 124. — — in der Bukowina. VI. 115. — — im Egerer Kreise. VIII. 71, 475. — — von Görz. II. a. 140, 141. — — von Jakobau. VI. 97. — — von Kamenitz. IX. 245. — — mit Kernen von Spath-Eisenstein. V. 183. — — im Krainer Diluvial-Lehm. IX. 253, 254, 255, 256. — — von Olomuczan. V. 687. — — von Přibram. VI. 52, 62. — — Proben und Analysen. X. Anh. 17, 18, 19, 23, 25. — — pseudomorph nach Kalkspath. VI. 62. — — in Serbien. II. b. 59. — — in Südwest-Böhmen. VI. 615. — — von Turrach. IX. 195, 211. — — von Zobernik. VII. 806. — — (schaliger) von Malomeritz. IV. 322. — — -Breccie. V. 547. Braunkohle des Arvaer Comitates. II. d. 160; III. a. 166. — in Basalt-Tuff. IX. 419, 441. — von Bilin. II. a. 154. — in Croatien. VIII. 738, 743; VIII. 161. — in Dalmatien. II. d. 140; III. a. 192, 193; IX. 504; X. Anh. 53. — in Deutschland. VIII. 168, 169. — von Eger. I. 693, 694; VIII. 468. — in Europa (L. v. Buch's Schrift über Lagerung der). III. a. 178. — des Falkenau-Egerer Beckens. VIII. 495. — von Fünfkirchen. IV. 401; X. Anh. 63. — von Gran. IV. 141, 403; VIII. 797; X. 495, Anh. 63. — von Hagenau und Starzing. III. a. 189, b. 40; IX. 134, 135. — des Hausruck-Gebirgs. VII. 164, 174. — von Hrastnigg. II. c. 11; IX. 696; X. Anh. 60. — von Köflach. VI. 872; VII. 159; X. Anh. 60. — von Kovátsi. VIII. 329. — von Leoben. I. 739; X. Anh. 60. — von Lettowitz. IV. 62, 154, 430; X. Anh. 55. — in Nieder-Oesterreich. IV. 277. — in Nordost-Steiermark, IV. 186. — Proben. X. Anh. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. — im Quader.

IV. 62, 430. — von Ratischkowitz. X. Anh. 57. — von Rosenthal bei Teplitz. VII. 153, 371, 372; X. Anh. 51. — von Sagor, Proben. III. c. 155; IV. 154; X. Anh. 54, 55. — von Scharditz. X. Anh. 58. — aus Steiermark. VII. 157. — im südlichen Mähren. IV. 44. — im Tegel bei Pulle. IX. 394. — von Tscheitsch. X. Anh. 58. — von Tschernembl. VII. 152. — aus Ungarn, Proben. X. Anh. 64, 65. — von Wildshuth. I. 599, 613; VIII. 152; X. Anh. 59. — von Zillingsdorf und Neufeld. II. d. 47. — (Entstehung der) in der Wetterau und am Vogelsberg. X. 521. — (Säugthier-Reste in der). IX. *V.* 121. Braunkohlen-Ablagerungen in Honth, Neograd, Heves und Borsod. X. *V.* 64. — -Becken von Eger. I. 694, 695; VII. 327, 380; VIII. 468. — — von Falkenau-Elbogen. VII. 185, 380; VIII. 493, 495, 507. — — von Gottschee. IX. 371. — — von Krikehaj. VII. 609. — — von Petschoye und Petschounig. X. 182, 183. — — von Saaz. IX. 525, 526, 530, 531, *V.* 61. — — von St. Magdalena. X. 184, 185. — — von Trifail. X. 181. — — von Voitsberg-Köflach. VII. 545, 553, 556. — — von Wtelna und Skiritz. IX. 440. — -Flötz von Hrastnigg. X. 181. — — von Sagor. II. b. 185, 188; VIII. 227; IX. *V.* 49. — -Flora von Brennberg. IV. 638. — — des Egerer Beckens. VIII. 473, 477. — — des Falkenau-Elbogener Beckens. VIII. 494. — — von Fohnsdorf. IV. 176, 177. — — von Köflach. VIII. 738; IX. *V.* 3. — -Floren (vergleichende Tabelle der). IX. 542. — -Gebilde von Cosina. VIII. 363, 814, — — von Dorogh. X. 496. — — von Mogyoros. X. 501. — — von Rottenmann, Judendorf und St. Oswald. VII. 39. — — von Sagor. VIII. 230, 231, 232. — — von Salzhausen. X. 521, *V.* 108. — — von Starzing. IX. 134, 135. — — von Tokod. X. 495, 499, 500. — — in Unter-Steiermark. X. 171, 172, 175, 186, 189, 191. — — von Wies und Schwanberg. VIII. 386. — — (vor- und nach-basaltische). VII. 185, 186. — -Schürfungen bei Grosswardein. X. *V.* 90. Braunspath von Přibram. VI, 48, 61. — pseudomorph nach Kalkspath und Schwerspath. VI. 61. Breccie (porphyrische) von Vöröspatak. III. c. 59, 61. — (tertiäre), V. 564. — (triassische) der Karawanken. VII. 635. — (Feldspath-Talk-). VII. 702. Breccien-Marmor von Veglia. X. *V.* 99. Brennstoffe (fossile) des Kaiserthums Oesterreich. I. 367, 609, 610. Bretschko (Quarz-Conglomerat). VIII. 424. Breunnerit zwischen Gloggnitz und Schottwien. III. d. 145; V. 69. Brunnen (artesischer) bei Atzgersdorf. X. *V.* 31, 32. — — von Passy bei Paris. VII. 206. Brunnenbohrung bei Pirawart. IV. 425. Bryozoën-Schichten (tertiäre) in Steiermark. VI. 193, 194, 351; VII. 584. Bunt-Kupfererz von Přibram. VI. 55. Bunt-Sandstein der Carnia und des Comelico. VIII. 441. — — von Eisenerz. V. 401. — — des Enns-Thales. IV. 192. — — im Körös-Thale. III. a. 33, 34. — — des Lienzer Gebirges. VII. 416. — — in Nieder-Oesterreich. II. a. 145; III. b. 52, 69. — — im nördlichen Steiermark. III. d. 60, 65. — — der nordöstlichen Kalkalpen in Tirol. VII. 721. — — südlich vom Dachstein- und Tännen-Gebirg. III. d. 144. — — von Werfen. V. 118. — — (dunkle Kalke im). III. b. 55, 69, d. 60.

Calcare salino. IV. 783. Calcit von Moldowa. IV. 402, 680; VI. 161; VII. 611. — von Přibram. VI. 47, 63. — pseudomorph nach Schwerspath. VI. 63. Caledonit von Rézbánya. II. b. 78. Canäle im nordwestlichen Theile der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. VII. 776. Canälen (Bewegung des Wassers in). II. b. 179, 180. Caprotinen-Kalk im Isonzo-Thale. IX. 349, 361, 362, 364. — — in Vorarlberg. VII. 38. Cardita-Schichten im nordwestlichen Tirol. VII. 725, 726, 727, 728. Cemente, Analyse. VII. 155, 371, 606; X. Anh. 42, 43. — (künstliche) des Oesterreichischen Kaiserstaates. VII. 756. Cement-Fabrik zu Eperies. VII. 757. — — zu Venedig (Giudecca). VII. 756. — -Stahl (österreichischer und englischer). III. b. 168, 169. — -Wässer von Maidanpek. II. b. 62. Central-Gneiss der nordöstlichen Alpen. V. 826, 827, 839; VII. 407, 458. Cephalopoden-Kalk von Hallstatt. V. 259. — — von Hörnstein. II. c. 27, 29. — -Schichten von Adneth. II. b. 173, c. 113, d. 136, 137; VIII. 156. — — von Hirtenberg und Enzesfeld. II. c. 20, 21, 22, 24. — — von Swinitza. II. a. 147. Cerithien-Kalk in Central-Ungarn. X. 506, 507. — -Schichten bei Ofen. VIII. 320, 325, 326. — — bei Gaunersdorf. II. d. 116. — — in Steiermark. VII. 539, 577. — — (Polymorphismus der Conchylien aus den). X. *V.* 175. Chabasit von Přibram. VI. 51. Chalcedon im Serpentin. V. 27. — -Achat, Anal. X. Anh. 5. Chalilit. IV. 155; X. Anh. 5. Chara-Schichten des untern Eocenen. X. 314, 316. Chlorit-Gestein in Steiermark. V. 538. — -Gneiss im mährischen Gesenk. V. 91. — -Schiefer im Böhmerwald. VI. 34. — — der Central-Alpen. V. 774, 830. — — in Nieder- und Ober-Oesterreich. III. c. 45; IV. 244; V. 493. — — im nordwestlichen Mähren. X. 226. — — (erzführender). VI. 120. Coelestin von Bochnia. II. c. 31. — von Ischl. IV. 397; X. Anh. 6. — von Pilsen. VI. 162. Cokes aus Lignit. IV. 646. Colonien (silurische) um Prag. X. 479, 481, *V.* 175, 176. Conchylien (fossile) von Malomeritz. III. d. 27. — (polymorphe) dur Cerithien-Schichten. X. *V.* 175. Conglomerat des buntea Sandsteines. VII. 416. — des Falkenau-Elbogner Beckens. VIII. 493. — der Gailthaler (Steinkohlen-) Schichten. VII. 631; VIII. 208. — mit Geröllen und Geschieben mit Eindrücken. IV. 667. — mit Hippuriten. X. *V.* 88. — bei Innsbruck. VI. 330; VIII. 367,

780. — des Karpathen-Sandsteines. VI. 112; IX. 47, 48. — der Kohlen-Formation des Pilsener Kreises. VII. 259. — der Kreide. VIII. 220, 221. — der Radstädter Tauern. V. 814, 815. — des Rothliegenden in Mähren. V. 672, 673. — — im nordöstlichen Böhmen. VIII. 704. — der siebenbürgischen Hochalpen. X. *V.* 107, 108. — von Turrach. IX. 207, 211, 227, 228. — der Werfener Schichten. X. 167. — (dioritisches). VIII 447. — (eocenes). IX. 133, 134. — (neogenes Süsswasser-). IX. 393. — (quarzitisches) der böhmischen Silur-Gebilde. VII. 118. — — der Trias. VIII. 636. — (tertiäres) um Hainburg. III. d. 40. — — am Rande des Wiener Beckens. X. 259. — — im Saazer Kreise. VIII. 603. — — in Salzburg. II. a. 24, 25. — — in Steiermark. VII. 549; VIII. 285, 286. — — im Viertel unter dem Mannhardsberg. III. d. 18, 19. — (Uebergangs-) der Stang-Alpe. V. 363, 364, 365, 367, 524, 525, 526, 539. — (Werfener) in Steiermark. VIII. 278, 279, 280. — — im Zipser und Gömörer Comitate. X. 545. — -Gestein im Dachstein-Kalk, Analyse. IV. 831; X. Anh. 37. Cosina (Eocen-) Schichten. X. 316. Covellin, Anal. X. Anh. 6. Cronstedtit von Přibram. VI. 51. Cypris-Schiefer im Egerer Becken. I. 689; VIII. 477, 482. Cyrenen-Schichten von Miesbach. VI. 436, 441, 443, 444.

Dachschiefer in Mähren und k. k. Schlesien. I. 436; II. a. 146. — des Ziegenruck-Berges. VII. 466, 469. Dachstein-Bivalve. IV. 731, 732, 777; VII. 193, 336, 640; X. 105, 106, 107. — — (Alpenkalk mit). III. d. 90, 135. Dachstein-Dolomit in Nord-Tirol und Vorarlberg. X. 104, 105, 107. — — in Unter-Steiermark. X. 170. Dachstein- (Lias-) Kalk der bayerischen Alpen. VIII. 146. — — des Beuscka-Gebirgs. VII. 655. — — von Bleiberg. VII. 73. — — in Central-Ungarn. X. 490, 493, 494, 496. — — von Eisenerz. V. 403. — — im Enns-Thal. IV. 474. — — in Istrien. VI. 745; IX. 341, 350, 364. — — der Karawanken. VII. 639. — — der Lombardie. IX. 473. — — in Nord-Tirol und Vorarlberg. X. 104, 105. — — im nordwestlichen Ungarn. X. 409, *V.* 28. — — der österreichischen Kalk-Alpen. III. b. 47, 56, 57, 59, 61, 69, 71, d. 59, 60, 66, 92, 135; IV. 729, 730, 775, 777, 784. — — im östlichen Kärnthen. VII. 334, 335. — — der Salzburger Alpen. II. c. 114, 115, 119. — — im Saroser Comitate. IX. *V.* 97. — — in Steiermark. VIII. 437; X. 169. — — südlich der Save. VII. 685. — — in Unter-Krain. IX. 269, *V.* 38, 39. — — in Vorarlberg. VII. 8, 28, 37. — — (Bleierze führender) in Kärnthen. V. 212, 213; VII. 68. — — (Petrefacte im). IV. 731. Dachstein-Schichten in Ober-Krain. VIII. 219. Dammerde bei Přibram. VI. 261. Dampfschifffahrt (Anwendung der Steinkohlen zur). III. a. 116. Datolith aus dem Modenesischen. IV. 168. Declination (ältere Beobachtungen der magnetischen). I. 472. — (magnetische) von London, Paris, Copenhagen, Alexandria, Cap und Magellan-Strasse. I. 517, 518, 519. Delvauxit. V. 67; X. Anh. 6. Demant (Dupoisat's vermeintlicher). IX. *V.* 108. Demant-Wäschen von Borneo. IX. 289. Devon-Gebilde in Mittel-Steiermark. VII. 220. — -Kalk, Analyse. VIII. 616; X. Anh. 33. Diabas im östlichen Kärnthen. VII. 343, 344. — von Teschen. IV. 311, 315, 316. Diallag in Gabbro. VI. 783; X. Anh. 6. — in Serpentin. V. 102. Diluvial-Halde bei Gonobitz. X. 210, 218. — -Lehm in Central-Ungarn. X. 489. — — im Drann-Thal. X. 218. — — im Egerer Becken. VIII. 486. — — in Istrien. IX. 356; X. *V.* 7. — — in Mähren. IX. 51, 61; X. 231. — — in Mittel-Steiermark. VII. 601, 602. — — des Sann-Bodens. VIII. 457, 458. — — im südlichen Steiermark. VIII. 454. — — (Eisenstein führender) in Unter-Krain. IX. 246, *V.* 5. — -Schotter des Gratzer Feldes. VII. 596. — — des Pettauer Feldes. VI. 303. — — bei Turrach. IX. 225. — -Tuff in der ungarischen Ebene. X. 514. Diluvium im Böhmerwald. VI. 798, 799. — von Buchberg. II. c. 59, 60. — bei Edelény. VII. 693. — bei Eisenerz. V. 405. — im Enns-Thale. IV. 480. — am Garda-See. VIII. 161. — des Gurk-Thales. VI. 555, 557, 559. — des Inn-Thales bei Hall. VI. 329. — in Kärnthen. VI. 551, 552, 564, 565; VII. 175, 333. — der Klagenfurter Ebene. VI. 564, 565. — im Körös-Thale. III. a. 22. — des Krakauer Gebiets. X. *V.* 102. — des Leitha-Gebirges. III. d. 55. — des Leitmeritzer und Bunzlauer Kreises. X. *V.* 63. — bei Malomeřitz. III. a. 146. — in Nieder-Oesterreich. IV. 278, 279, 283; V. 527. — der nördlichen Steiermark. I. 100, 102; III. d. 58, 70; IV. 185. — der nordöstlichen Alpen. I. 54, 55, 60; VII. 383. — der nordöstlichen Kalk-Alpen in Tirol. VII. 737. — in Ober-Krain. I. 390, 391, 392; VII. 689; VIII. 233. — in Ober-Oesterreich. III. d. 76. — an der obern Mur. VII. 46, 59. — der österreichischen Alpen. III. b. 86, d. 70; VII. 383. — der österreichisch-bayerischen Alpen. I. a. 2, 3. — um Ofen. VIII. 331. — bei Pitten. I. 356. — bei Raibl. I. 263. — im Rosalien-Gebirg und Wechsel. V. 527. — des Saal-Gebietes. V. 139. — im Salzburgischen. V. 258. — im Salzkammergute. II. a. 153. — des Sann-Bodens. X. 198. — im südlichen Mähren. IV. 28. — im südwestlichen Böhmen. VI. 617, 618. — im südwestlichen Tirol. II. b. 74. — (Gold führendes) in Ungarn, Siebenbürgen und Böhmen. V. 230, 231; IX. *V.* 15. 16. — (marines) der ungarischen Ebene. X. 459, 460. — (Süsswasser-) des nordöstlichen ungarischen Gebirgs. X. 463. — — der ungarischen Ebene. X. 464, 512. Diorit in Böhmen. VI. 693, 713, 716, 731. — in Kärnthen. VI. 195; VII. 343. — in Mähren. I. 554; III. c. 146; IV. 11; V. 99; IX. 51, 52. — Magnetische Polarität. VIII. 682. — in Mittel-Böhmen. VI. 389. — des Mosla-

viner Gebirgs. III. b. 93, 94. — in Nieder- und Ober-Oesterreich. III. c. 52; IV. 243, 257. — in den nordöstlichen Alpen. I. 56. — bei Passau. IV. 260, 262. — in Steiermark. V. 543; VIII. 447. — im südwestlichen Böhmen. VI. 589, 592, 606, 607. — von Teschen. IV. 173; 311, 314. — -Tuff in Steiermark. VIII. 447. Diphya-Kalk. VIII. 297, 300, 301, 302; IX. *V.* 130. Dolerit des Leitmeritzer Mittelgebirges. IX. 400, 405, 411. Dollinen (Einsenkungen) im Dachstein-Dolomit. X. 170. Dolomit, Analysen. I. 731, 732; II. b. 73; IV. 828; VII. 810; IX. 220; X. Anh. 38, 40, 42. — des Aptychen-Kalkes. X. 257, 260. — des Arlberg-Kalkes. X. 100, 119, 131. — des bayerischen Alpenkalkes. IV. 328, 334, 347, 349, 366, 367, 369. — von Bleiberg. VII. 71. — des böhmischen Erzgebirgs im Saazer Kreise. VIII. 562, 563. — der Central-Alpen. V. 830. — des Dachstein-Kalkes. IV. 474, 774, 776; V. 404; VII. 76, 77, 80, 419; VIII. 149; X. 104, 105, 170. — — — (geschichteter). VII. 419. — des Drave-Save-Gebirgszuges. X. 209. — der Gailthaler Schichten. VIII. 438. — im Glimmerschiefer. V. 330. — des oberen Kohlenkalkes. VII. 653, 654, 660. — der Kreide. VIII. 443. — des Lavatsch-Thales. VI. 343, 344. — des alpinen Lias. VII. 37. — des untern Lias. V. 123. — der Lienzer Alpen. V. 448. — in Nieder-Oesterreich. I. 620; V. 517. — der nördlichen Steiermark. I. 115. — der nordwestlichen Karpathen. X. *V.* 46, 47. — der österreichischen Alpen. III. b. 65, 66, 80; IV. 474, 774, 776, 784; V. 123. — des Radstädter Tauerns. V. 813. — ober den St. Cassian-Schichten. VI. 894. — der obern Trias. VIII. 157. — um Trient. VIII. 297, 298, 301, 303. — von Turrach. IX. 218, 219. — des Uebergangs-Gebirges. V. 351. — von Unken. IV. 358, 360, 363, 364; V. 128, 129. — des untern Alpen-Kalkes. VII. 725, 726, 727. — des Vilser Kalkes. VII. 38. — (Bereitung von Magnesia aus). VI. 71. — (Eisen führender) der Stang-Alpe. VI. 524, 538, 539. — (eocener). VIII. 312, 313, 314, 315, 319. — (Guttensteiner) südlich der Save. VII. 683. — (Hallstätter). VI. 745; VII. 418. — (rother). IX. 220. — (Uebergangs-) in Mittel-Steiermark. VII. 249. — (weisser). VII. 664. — (Werfener). X. 261. Dolomit-Breccie des Alpenkalkes. IV. 328. Dopplerit. I. 303. Drainage. III. a. 73. Dünger (mineralischer). I. 131, 132, 135. Düngstoffes (Controle des künstlichen). VII. 378. Durchschnitt (geologischer) der Alpenkette von Passau bis Duino. VI. 881. Durchschnitte (geologische) der österreichisch-salzburgischen Alpen. I. 10, 11, 14, 19. Dutenmergel von Steierdorf. VI. 245.

Echinodermen-Schichten (eocene). VIII. 317, 318; X. 320. Edelsteine auf der Iser-Wiese. IV. 833. Egeran-Schiefer. VII. 519. Eichenstamm (veränderter). VI. 197. Eisen (Einwirkung Kohlensäure haltigen Wassers auf metallisches). X. *V.* 80 Eisens (Spannungsstärke des). VII. 780. Eisen (fossiles metallisches) von Chotzen. VIII. 351, 354; X. Anh. 6. Eisenbahn am Obern See (Nord-Amerika). VII. 804, 805. — Durchschnitt (geologischer) zwischen Laibach und Triest. IX. *V.* 82. — — — zwischen Wien und Linz. IX. *V.* 94, 95; X. *V.* 36, 37. — -Frage (Freiherrn v. Beust's Schrift über die Beziehung des Freiberger Berg- und Hüttenwesens zur). VI. 197. — -Tunnel am Semmering. I. 375, 577, 581. — -Unternehmungen (Verordnungen zur Vermeidung von Collisionen zwischen Bergbau- und). X. 143, 144. Eisenerze in Diluvial-Lehm von Unter-Krain. IX. 246, 253, 254. — von Hüttenberg. VI. 638. — im Körös-Thale. III. b. 31, 32. — von Lepeina. VII. 659. — von Marquette (Nord-Amerika). VII. 777, 778. — Proben. X. Anh. 16. — des Quaders. V. 734, 735, 737, 738. — von Rudolphsthal. VI. 406. — in Schweden. IX. *V.* 157, 158. — von Turrach. IX. 196, 201, 227, 228. — im zersetzten Serpentin. IV. 35, 36, 37. Eisenglanz pseudomorph nach Magnet-Eisenstein. III. c. 130, 131. — (künstlich gebildeter). V. 894. Eisen-Glimmerschiefer. VI. 117. Eisenhut-Schiefer. VI. 530. Eisen-Industrie in Krain (Rossiwall's Abhandlung über). VIII. 773. Eisenkies des Turracher Erzlagers. IX. 198. — (krystallisirter) von Rapitz. VIII. 815, 816; IX. *V.* 64, 65. Eisenkiesel-Pisolith. VII. 193, 194, 606. Eisen-Lagerstätten von Auwal. VIII. 169. — — an Basalt-Ausbrüchen durch Grauwacke. V. 106. — — im böhmischen Erzgebirg. VIII. 61, 62, 65, 71, 72, 182. — — der böhmischen Silur-Formation. VI. 613, 616; VII. 124; X. *V.* 111, 112. — — der Bukowina. V. 221; VI. 115. — des Diluvial-Lehmes von Unter-Krain. IX. 246, *V.* 5. — — des Drann-Thales. X. 205, 206, 207. — — von Fünfkirchen. VIII. 617, 804, 805; X. Anh. 24, 25. — — von Gollrad. III. b. 4. — — von Hüttenberg, VI. 625, 643. — — im Jasloër Kreise. VII. 836. — — von Jauerburg. I. 404; VII. 369. — — des Jura in Mähren. V. 686, 687. — — in Kärnthen. VI. 519. — — von Kamenitz. IX. 245. — — der Karpathen in Ost-Galizien. VI. 182, 183. — — im Karpathen-Sandstein. VI. 130, 131. — — im Klippenkalk. VI. 129, 130. — — der Krems-Alpe (Turrach). VI. 537. — — von Lepeina. VII. 656, 657; X. *V.* 59. — — von Lockenhaus. IX. *V.* 149. — — von Marquette (Nord-Amerika). VII. 776. — — in der Militärgrenze. VII. 382, 383. — — von Missouri. VII. 823. — — von Morawitza (Banat). II. b. 151. — — im nordöstlichen Kärnthen. VI. 199. — — im nordwestlichen Böhmen. VII. 367. — — im nordwestlichen Mähren. X. 232, 233. — — in Ober-Krain. VIII. 384, 385, 387. — — von Ober-Zeyring. V. 335. — — am Obern See (Nord-Amerika). IV. 415. — — von Pitten. V. 515. — — vom Plan-Kogel. V. 546. — — von Pöllau. V. 538. — — im Quader. V. 734, 735,

736, 738. — — von Reichenau. II. b. 148. — — von Rude. VI. 166. — — im Saazer Kreis. VIII. 587, 592, 594, 597, 598. — — in der salzburgischen Grauwacken-Formation. V. 369, 378. — — von Seethal. V. 343. — — im südlichen Böhmen. V. 233. — — im tertiären Becken von Eger. VIII. 475. — — von Tragöss. VIII. 365, 366; X. Anh. 23, 24. — — von Turrach. IX. 192, 193, 195, 196, 199, 201, 221. — — von Weitenstein. VIII. 423, 427. Eisen-Oxydes (Entstehung des) auf nassem Weg. III. b. 180. — -Probe (colorimetrische). III. d. 146. — -Region am Obern See (Nord-Amerika). IV. 415. — -Sauerquelle (alkalische) von Bartfeld. IX. *V.* 144. Eisensinter. III. c. 131. Eisensorten, Anal. X. Anh. 29. Eisenstein-Röthel, Anal. VIII. 613; X. Anh. 17. Eisenwerk von Maidanpek (Serbien). II. b. 61. — von Seraing. III. a. 200. — (befestigtes römisches) in der Wochein. I. 199, 366. Eisenwerke (Collins-) im nordwestlichen Nord-Amerika. VII. 779. Eisernen Kron-Ordens (Verleihung des Oesterreichisch-kaiserlichen) an Mitglieder der wissenschaftlichen Commission der Novara-Expedition. X. *V.* 186. Eiszeit-Fauna (Europäische marine). IX. 615, 636. Eiszeit-Gebilde der Britischen Inseln. IX. 601, 603, 619, 620, 623, 628. — — — — (Weichthier-Fauna der). IX. 604, 605, 613, 614, 621, 622, 624, 626. — — im Rosalien-Gebirg. IX. *V.* 101. Eklogit zwischen Amphibol-Gneiss und körnigem Kalk. VIII. 566. — des Bacher-Gebirgs. VIII. 276. — im böhmischen Erzgebirg. VIII. 29. — mit Magnet-Eisenerz. VII. 324, 367. — der Sau- und Kor-Alpe. VII. 411. — (Gestein zwischen Amphibol und). VII. 231, 232. — (Gestein zwischen Gabbro und). VII. 232. Elementar-Stoffe (Fundamental-Zahlen der) nach Dumas. IX. *V.* 7. Eliasit. III. d. 124; X. Anh. 6. Enstatit. VI. 156; X. Anh. 7. Eocenes in Cattaro und Montenegro. X. *V.* 24, 25. — in Central-Ungarn. VIII. 802, 803; X. 494. — im Erzherzogthum Oesterreich. V. 879, 897; IX. 103. — von Guttaring. VI. 188. — in Inner-Krain und Istrien. X. 272, *V.* 7, 8. — des Liburnischen Karstes. X. 333. — in der Lombardie. IX. 494. — in der Marmaros. X. 433, 434. — im nordöstlichen Kärnthen. VI. 187. — im nordöstlichen Ungarn. X. 431, 432. — der Nord-Karpathen. III. c. 143. — in Ober-Krain. I. 397; VIII. 222, 371. — um Ofen. VIII. 313, 315. — im Poik-Gebiet. X. 275, 286. — der Recca-Mulde. X. 302, 312. — im Salzburgischen. IX. 103. — in Siebenbürgen. X. *V.* 182, 183. — des Tschitscher Bodens. X. *V.* 7, 8, 38. Eocenes in Unter-Steiermark. VIII. 444, 450, 771. — im Venetianischen. IV. 114, 116. — im Waag-Thal. X. *V.* 76, 77. — im westlichen Mähren. IX. 48, 49. — an dem Wipbach. X. 287. Eocen-Dolomit bei Ofen. VIII. 312, 313, 314, 315, 771. — -Kohle der Drann-Thales. X. 209, 213. — -Mergel. IX. 108, 129, 130. — — (gefaltete). X. 331. — -Sandstein (Wiener). IX. 107, 108, 122; X. 269, *V.* 5, 6. — -Schichten (von Morlot's metamorphe). VIII. 275, 405; X. 192, 197. — -Tegel bei Ofen. VIII. 218, 219. Epidot in amphibolischem Gestein. V. 28. — im mährischen Gesenk. V. 100. — von Schemnitz. IV. 183, 835, 839. — -Gestein im böhmischen Riesengebirg. IX. *V.* 18. — -Schiefer in Böhmen. VI. 715. — — der Central-Alpen. V. 774, 775. Episomorphismus der künstlich gebildeten Krystalle. X. *V.* 184. Erdbeben vom 15. Januar 1857. IX. *V.* 29, 30. — im Jahre 1855 (Verzeichniss der). VII. 165. — im Visp-Thale. VI. 876. Erdbeben-Wogen in der Nordsee (Dr. Clement's Bericht über). IX. *V.* 123. Erdbohrungen bei Floridsdorf. I. 361, 362; II. b. 191, 192. — nach C. G. Kind's Methode. I. 368, 369, 746. — bei Stiringen. I. 746. — im Tieflande von Ungarn. X. *V.* 109. Erdbrände bei Eger. I. 695. — von Falkenau-Elbogen. VIII. 506. — im Saazer Becken. IX. 533, 534. Erd-Magnetismus (Beobachtungen über) in Böhmen. I. 435. — — — im Oesterreichischen Kaiserstaat. I. 61, 220, 423; III. b. 36, c. 119. — im südwestlichen Europa (Prof. Lamont's Beobachtungen über den). X. *V.* 34. Erdpech im Karpathen-Sandstein. VI. 101. — im Roth-Sandstein. VI. 102. — von Tataros und Bodonos. III. b. 27, 28. Erratisches im Eocenen. IX. 109, 110. — am Nord-Abhang der nordöstl. Alpen zwischen Wien und Salzburg. I. 56. — der nördl. Steiermark. I. 100. — in Ober-Krain. I. 390, 391. — in den östl. bayer. Alpen. II. a. 3. — bei Pitten. I. 356. — der Radstädter Kalk-Alpen. V. 817. — bei Raibl. I. 263. — im Rosalien-Gebirg. IX. *V.* 101. — im Salzburgischen. V. 258. — im Salzkammergute. II. a. 153. — im südwestl. Tirol. II. b. 74. Eruptiv-Gesteine im böhm. Rothliegenden. VIII. 705, 706, 707; IX. *V.* 45. — — in Siebenbürgen. X. *V.* 106. — — (tertiäre) im nordöstlichen Ungarn. X. *V.* 134. — -Tuffe des Hargitta-Gebirges. X. *V.* 134. Erze von Arkansas und Missouri. IX. *V.* 104, 105. — aus Serbien. II. b. 174; X. Anh. 23. — (Zugutebringung der reichen Joachimsthaler). V. 611; VI. 871. Erzen (Hähner's neues System der Metall-Gewinnung aus). VII. 827. Erz-Formation von Weitenstein. VIII. 423. Erzführung des Gailthaler Schichten in Ober-Krain. VIII. 211. — des Granit-Porphyrs in Mittel-Böhmen. VI. 401. — des Joachimsthaler Geisterganges. V. 630. — des Rosalien-Gebirgs und des Wechsels. V. 514. — der untern Trias in Ober-Krain. VIII. 215. Erzgänge von Adamsthal und Rudolphstadt. V. 112. — von Bleistadt. VIII. 44. — von Felsőbánya. IV. 575. — von Joachimsthal. IV. 556; V. 630; VIII. 32, 33. — von Kapnik. IV. 577. — von Katharinaberg. VIII. 579. — von Klostergrab. IX. 557, 558. — des mährischen Gesenkes. V. 94, 100. — von Nagybánya. IV. 571, 834. — von Niklasberg. IX. 559. — von Schemnitz. IV. 785, 820.

— (Freih. v. Beust's Schrift über die Erzvertheilung der). VI. 197; IX. *V.* 39. — — — über die des Sächsischen Erzgebirgs. VII. 180. Erz-Lagerstätten von Adamsthal und Rudolphstadt. V. 107. — — von Bleiberg. VII. 87. — — im böhmischen Erzgebirge. VIII. 32, 41, 48, 181, 569. — — der Comenda-Alpe. VII. 673. — — im Egerer Kreis. VII. 491, 510, 529. — — des Jeschken-Gebirgs. X. 388. — — im Karavancken-Gebirg. VII. 643. — — im krystallinischen Gebirg des nordwestlichen Böhmens. VII. 323, 365, 366. — — im Leitmeritzer Kreis. IX. 556, *V.* 41. — — von Ober-Zeyring. V. 335. — — in Niederländisch-Indien. IX. 285, 286, 292. — — im nordwestlichen Mähren. X. 232. — — im nordwestlichen Theil der vereinigten Staaten von Nord-Amerika. VII. 771, 784, 794, 797. — — von Rochlitz. IX. *V.* 91; X. 10. — — im Saazer Kreis. VIII. 568. — — im Salzburgischen. V. 261. — — im Schwarzleo-Thal. V. 157. — — in Steiermark. V, 546. — — der südlichen Bukowina. VI. 103, 115. — — von Tergove. VII. 848, 849. — — im Ur-Thonschiefer des südwestlichen Böhmens. VI. 593. — — im Zipser und Gömörer Comitat. X. 39. — — (Bleiglanz führende) im südöstlichen Kärnthen. VII. 369, 370. — — (edle) des ungarischen Trachyt-Gebirgs. X. *V.* 71, 72. — -Revier von Přibram. V. 884. — -Röstung (Verdichtung der verflüchtigten Metalle bei der). V. 430, 431. — -Vertheilung auf den Freiberger Gängen (Freih. v. Beust's Schrift über). IX. *V.* 39. — -Zonen (Vertheilung der) im böhmischen Erzgebirg. IX. 571. Esino-Kalk. VI. 894; IX. 468. Essigsäure (reine) aus Holzessig. III. a. 36. — (Salze des Mangans, Nickels und Cadmiums mit). VI. 189. Euklas in Russland. IX. *V.* 29. Euphotid von Dobschau. X. 549.

Fahlerz von Poratsch, Anal. III. d. 98. — von Přibram. VI. 55. — (Gewinnung von Quecksilber aus). III. c. 148. Faluns im südwestlichen Frankreich. I. 587; IX. *V.* 67. Fassaït aus Schemnitz. IV. 183, 835, 836. Fauna (jetztzeitige) des boreal-amerikanischen Festlandes. IX. 680. — — der Britischen Meere. IX. 594. — (jetztzeitige marine) von Nord-Amerika. IX. 615, 617. — (tiefste) des Aegeïschen Meeres. IX. 625. — der Vorwelt (H. v. Meyer's Werk zur). VII. 852; X. *V.* 54. — (Zusammenhang der jetztzeitigen Britischen) mit der Epoche der nördlichen Ueberfluthung. IX. 575, 632, 633. Federerz von Přibram. VI. 56. Feldmaassen-Lagerung (Verordnung über). II. d. 171. Feldspath im Granit von Pressburg. II. c. 42. — in granitischem Gestein. VI. 725. — in den Grünsteinen um Teschen. IV. 311, 312, 313, 315, 316, 320. — (klinoklastischer). IV. 236, 256. Feldspath-Granit (rother). VI. 803. — -Greisen. IX. 567. — -Krystalle der Brücke'schen Sammlung. VII. 835. — -Talk-Kalk-Breccie. VII. 702. Feldstein-Porphyr von Vöröspatak. III. c. 57. — -Schiefer von Offenburg. VIII. 339, 341, 345. Felsarten (Magnetismus der). VIII. 647, 654, 655, 660, 680, 681, 683, 684, 686, 691, 807; X. *V.* 108. — (Prof. Senft's Preisschrift über Classification und Beschreibung der). VIII. 797. Felsit. IX. 555. — -Gneiss. VI. 712. — -Porphyr. VI. 390, 392, 697, 721, 778; VIII. 25, 554; IX. 431, 530, 554; X. 193, 211. — — (Gänge von Zinnerzen im). IX. 564. — -Schiefer VI. 694. Feuerstein-Gebilde um Brünn. II. c. 1. Fisch-Schiefer von Monte Bolca. I. 698. — — von Seefeld. I. 696. Fleckenmergel mit Amaltheen. VI. 447. Flora des Anthracites von Budweis. V. 197. — des Basalt-Tuffes von Gleichenberg. VI. 285, 287. — des Conglomerates bei Innsbruck. VIII. 780. — von Dalmatien (Prof. de Visiani's Werk über die fossile). X. *V.* 109. — der Grestener Schichten bei Idria. IX. *V.* 18. — des Miocenen. II. b. 178, 179. — der nordwestlichen deutschen Wealden-Formation. II. b. 156, 157, d. 143. — des Ooliths (Freih. de Zigno's Werk über die). VIII. 791; X. *V.* 1. — der sächsischen Kohlenbecken (Geinitz's Schrift über die). VI. 174. — des Sandsteines von Gleichenberg. VI. 289. — (eocene) von Bischoflaak. IX. *V.* 18, 19. — — des Leitmeritzer Mittelgebirgs. IX. 403. — (fossile) von Bilin. II. a. 184. — — von Böhmen. II. d. 165, 166; III. b. 188, d. 123, 126, 129, 144; V. 197. — — von Brennberg. IV. 638; IX. *V.* 148, 149. — — der Gosau-Mergel von Aigen. IV. 168. — — von Häring. I. 557; IV. 849. — — von Heiligen-Kreuz bei Kremnitz. III. d. 127, 128; V. 229, 230. — — von Hohenstadt. IV. 185. — — von Kremnitzka. III. c. 159. — — von Leoben. I. 735. — — von Mährisch-Ostrau. III. d. 119; IV. 435, 436. — — von Muthmannsdorf. I. 161. — — von Niederschöna. III. d. 125. — — von Radoboj. I. 364, 375. — — von Reschitza. III. a. 170. — — von Schauerleithen. I. 163. — — der Stang-Alpe. V. 366. — — von Stein in Krain. I. 139. — — von Steierdorf. I. 357; III. b. 194. — — von Stradonitz. III. d. 129, 130. — — von Swoszowice. I. 235, 236. — — von Toscana. IX. *V.* 135. — — von Trofajach. IV. 424, 425. — — von Vassas. I. 356. — — der Wand bei Wiener-Neustadt. II. a. 157. — — von Wettin bei Halle. II. b. 172, 183. — — des Wiener Beckens. I. 361, 744, 745; II. a. 145; d. 39, 150. — — von Wittingau. III. d. 144. — (jetztzeitige) der nordwestlichen Afrikanischen Inseln. IX. 589. — (miocene) von Fohnsdorf. IV. 176, 177. — — der Hegyallya. V. 202. — — von Köflach. VIII. 738; IX. *V.* 3, 4. — — von Oedenburg. IX. *V.* 148. — — des Venetianischen. IV. 114. — (Steinkohlen-) von Libowitz. X. *V.* 69, 70. — — von Offenburg. VIII. 342, 346, 350. — — des Pilsener Beckens. VII. 264, 265. — — von Wotwowitz. X. *V.* 194. — (tertiäre) von Eperies und Tokaj. III. b. 169. — — von Erdöbenye. II. b. 178. — — von Erlau. V. 211.

— — von Falkenau-Elbogen. VIII. 494, 507. — — von Monte-Bolca und Ronca. VI. 886. — — von Sagor. II. b. 185, 186, 188. — — der Schweiz (Prof. Heer's Werk über die). V. 232; IX. *V.* 134, 135. — — von Sotzka. I. 175, 552, 682. — — von Szakadat und Thalheim. III. d. 134, 135. — (Zusammenhang der gegenwärtigen britischen) mit den Oberflächen-Veränderungen durch die nördlichen Ueberfluthung). IX. 575, 632, 633. Floren (tertiäre) des Oesterreichischen Kaiserstaates. I. 679, 743. — (Vergleichs-Tabelle der österreichischen westdeutschen und schweizer tertiären). IX. 542. Fluss-Gefälle der Donau im Linzer Kreise. VIII. 265. — — des Moldau-Flusses. VII. 149. — — im Salzburgischen. V. 438, 615. — -Nivellements in Mähren. IV. 29. Flüsse (unterirdischer Verlauf der). VI. 418; VIII. 414; IX. 262, 263, 264. — (Vorkommen fetter Oele auf der Oberfläche der). VII. 95. Flüssigkeits-Linse (Einfaches Hand-Mikroskop mit). VII. 97. Fluolith. X. Anh. 7. Flussspath von Mutěnitz. IV. 695. — -Gänge in der Lombardie. IX. *V.* 33. Flysch in Vorarlberg. VII. 7, 14, 29, 35, 36. — (eocener) im Rhätikon. X. 117, 129, 130, 134. Foraminiferen-Kalk. X. 295, 296, 315. — -Schichten in Steiermark. VI. 351. Forst-Gesetz vom 3. December 1852. III. d. 151, 152. — -Lehranstalt zu Mariabrunn (Organisation der k. k.). III. a. 175. Forstwirthschaft in Böhmen (Dr. Stamm's Schrift über). VIII. 772. Franz-Josephs-Orden (Verleihung des kaiserlich Oesterreichischen) an Prof. Cotta. VII. 197. Frischerei am Schwallboden. IV. 498. Frischgebirg bei Hall in Tirol. VI. 338, 346. Früchte (fossile) von Bolca. X. 142. Fucoïden-Formation der östlichen bayerischen Alpen. II. a. 19. — — in Vorarlberg. VII. 8, 9, 36. — -Schichten von Grossdorn. IX. 271. — — in der Lombardie. IX. 493. — — von Plawutsch. IX. *V.* 77. Fundamental-Zahlen der elementaren Stoffe nach Dumas. IX. *V.* 7. Funkit. X. Anh. 7, 8. Fusseindrücke (Prof. Hitchcock's Werk über). X. *V.* 189.

Gabbroït von Dobschau. X. 549. — von Ronsperg. V. 892; VI. 177, 178. — von Teschen. IV. 311. — Gestein zwischen Eklogit und). VII. 232. Gaea excursoria Germanica (Prof. Giebel's). II. d. 169. Gailthaler (Steinkohlen-) Schichten am Grintouz. IX. *V.* 127. — — bei Idria. VII. 838. — — des Isonzo-Thales. IX. 333, 360, 361, 362. — — in Kärnthen. VII. 340, 372, 373, 374. — — in Ober-Krain. VIII. 208, 231. — — südlich von der Gail. VII. 424. — — von Tergove. VII. 849. — — in Unter-Krain. IX. 266. — — in Unter-Steiermark. VIII. 275, 420; X. 161, 167, 169, 178, 179, 205. — — (Bleiglanz führende). VIII. 169, 170; X. 164. Galaktik. X. Anh. 8. Galmei von Rochlitz. X. 22. — -Bergbau von Lavatsch. VI. 349, 350. — -Lagerstätte von Wiesloch (Baden). II. b. 175. Gang-Gebilde (secundäre) von Joachimsthal. VII. 837. — -Granit. X. 248, 250, 251; V. 98, 267, 268, 310, 311, 321, 322; VI. 361, 377, 378, 380, 481, 789, 790, 803; VII. 319, 490, 526; VIII. 25, 553. — — im Egerer Kreise. VII. 526; VIII. 25. — — in krystallinischen Kalk. VI. 498. — -Verhältnisse (Adelsvorschub) am Grinzenberg und Kleinkogl. I. 213. — — von Joachimsthal (Vogl's Schrift über die). VIII. 369. — -Verwerfung in Schlaggenwald. VII. 172. — -Züge von Eisenerzen im böhmischen Erzgebirg. VIII. 67, 68, 69. — — des sächsischen Erzgebirgs (Freih. v. Beust's Schrift über die). VII. 180. Garschlacke. Analyse. VII. 806; X. Anh. 30. Gas-Ausströmungen aus dem Steinkohlen-Gebirg. III. a. 171, 172. — -Feuerung in Oesterreich (Zerrenner's Werk über das metallurgische). VII. 173. — -Lampe (Apparat zur Erzielung gleichförmiger Temperaturen mittelst einer). VI. 64. Gault der Nord-Karpathen. III. c. 141, 142; VI. 311, 312. — -Sandstein in Vorarlberg. VII. 3, 4, 15, 22, 23, 38. Gebirgsarten. Analyse. X. Anh. 32. Gebirgsbau der Central-Alpen. V. 781. — -Gestaltung im Pilsener Kreise. VI. 454. — — im südwestlichen Böhmen. VI. 582. — -Systeme des Oesterreichischen Kaiserstaates. II. c. 95. Gebirgszüge in den Alpen (Form der). II. b. 33, 51, 54. — im Enns-Thale (Form der). IV. 481, 482. Gelb-Eisenstein mit Braunkohle. IX. 523, 525. Geoden von Braun-Eisenstein. IX. 253, 254, 255. Geognosie und Geologie (Prof. Noeggerath's neuestes Werk über). IX. *V.* 155. Geologist (Englische Zeitschrift). IX. *V.* 55, 56. Geographie (Bemerkungen über neuere Arbeiten über). IV. 283. — und Geologie (A. und H. Schlagintweit's Werk über). V. 888. Gerölle mit Eindrücken. IV. 667, 669. — -Ablagerungen im Gebiete der obern Mur. VII. 46. Gervillien-Schichten der bayerischen Alpen. II. d. 162; IV. 85, 95, 99, 330, 339, 343, 346, 366, 371, 774, 775; VI. 445, 447, 448. — — von Kössen. III. b. 180. — — der nordöstlichen Kalk-Alpen in Tirol. VII. 726, 729, 730. — — in Vorarlberg. VII. 13, 17, 23, 28. Geschicke (Behandlung der gold- und silberhältigen) um Schemnitz. IV. 785. Geschiebe mit Eindrücken. V. 897, 898. — von Urgestein im Dachstein-Gebirge. II. b. 159, 160. — (diluviale) von Malomeřitz. III. d. 78, 79. — (erratische) der Radstädter Kalk-Alpen. V. 817, 818. — (geritzte und mit Eindrücken). I. 356; IV. 667. — (hohle). IV. 670; VI. 653. Gesteine (Bruchstücke fremdartiger) im Trachyt. IX. 78. — (durchlöcherte) im Departement der obern Saône und bei Bern. II. c. 47. — (Magnetismus einfacher). VIII. 647, 652, 654, 807; X. *V.* 108. Gestellstein. Analyse. VII. 806; X. Anh. 41. Gieseckit. V. 76; X. Anh. 8. Glacial: siehe „Eiszeit". Glanzkohle in den Tuffen des Leitmeritzer Mittelgebirges. IX. 420, 421, 424, 425, 426, 427.

— von Weitenstein. VIII. 426, 427. — (eocene) von Ober-Skallis. VIII. 448. Glaserz von Přibram. VI. 58. Glas-Quarz (haarförmiger). VI. 101. Glauberit. X. Anh. 8. Gletscher in den Central-Alpen. V. 255, 793, 798, 799, 803, 804, 806, 807. — der Jetztzeit (A. Mousson's Schrift über die). VI. 190. — im Gebiet der Salzburger Saale. V. 141. — (vorweltliche) des Seebach-Thales bei Lunz. III. a. 86, 87. — -Streifen an Erratischem im Rosalien-Gebirg. IX. V. 101. Glimmer. Krystallographische Verhältnisse. IV. 410. — (entenblauer). IV. 183. — (Magnet-Eisenstein pseudomorph nach). III. d. 31. — (zweiaxiger) vom Vesuv. V. 852, 863. — -Gneiss der Central-Alpen. V. 770. — -Granit. VI. 370. Glimmerschiefer im Bacher-Gebirg. X. 204. — der Bukowina. VI. 105. — der Central-Alpen. V. 772, 824, 827; VII. 409, 458. — des Dillen-Berges. VI. 765. — des Egerer Kreises. VII. 483, 488, 501, 502, 506, 507, 520, 524; VIII. 9. — des Gailthales. VII. 415. — in Gneiss übergehend. VII. 235. — im Gömörer und Zipser Comitate. X. 541. — über Granit. VII. 18, 21. — bei Hüttenberg. VI. 620, 621, 623. — in Kärnthen. VI. 511, 514, 517, 518. — im Körös-Thale. III. b. 34. — des Künischen Gebirges. IV. 29, 30, 32, 36, 38, 39. — des Leitha-Gebirges. III. d. 43. — des Leitmeritzer Erzgebirges. IX. 552. — im mährischen Gesenk. V. 92. — in Nieder- und Ober-Oesterreich. III. c. 45, d. 43, 61; IV. 240, 267; V. 485. — im nordwestlichen Böhmen. VII. 321. — im nordwestlichen Mähren. X. 224. — im nordwestlichen Theil von k. k. Schlesien. IV. 8. — der östlichen Sudeten. V. 387. — von Oberwölz. V. 339. — des Rosalien-Gebirges und des Wechsels. V. 485. — im Saazer Kreise. VIII. 532, 533, 539, 540, 543, 544, 546, 565. — der Schneekoppe. X. V. 117. — in Steiermark. V. 535; VII. 233, 237. — im südlichen Böhmen. V. 265. — im südwestlichen Böhmen. VI. 590. — im südwestlichen Erzgebirg von Böhmen. VIII. 9, 15, 16, 17, 18. — im südwestlichen Ober-Steiermark. V. 323, 349, 356. — von Turrach. IX. 186. — (Erz-Lagerstätten im) der Bukowina. VI. 115, 122. — (Kupfer führender). IV. 498. — (Labrador-Fels im). VI. 127. — (zersetzer). V. 487. Glockner-Besteigung (D. Stur's). VI. 816. Gneiss der Almasch. VI. 223. — des Bacher-Gebirges. VIII. 276; X. 203, 204. — im Banat. VI. 229, 230. — des Böhmerwaldes. V. 567, 572, 577; VI. 753. — der Central-Alpen. V. 769, 785, 821, 824, 826, 829; VI. 747, 748; VII. 407, 458. — des Egerer Kreises. VII. 481, 487, 500, 520, 523, 524. — in Glimmerschiefer übergehend. VI. 486. — im Gömörer und Zipser Comitate. X. 538. — mit Granit-Blöcken. VI. 492. — bei Hainburg. II. d. 37. — des Hamelika-Gebirges. II. b. 14. — bei Hüttenberg. VI. 620, 621, 622. — des Jeschken-Gebirges. X. 384. — in Kärnthen. VI. 512. — krystallinischen Kalk einschliessend. V. 291. — des Künischen Gebirges. VI. 29. — des Leitha-Gebirges. III. d. 43. — des Leitmeritzer Erzgebirges. IX. 550. — im Liegenden des Schwarzbacher Graphits. IV. 140. — im mährischen Gesenk. V. 89. — in Mittel-Böhmen. VI. 355. — des Moslawiner Gebirges. III. b. 171. — in Nieder- und Ober-Oesterreich. III. c. 36, d. 43; IV. 266, 279; V. 478. — im nordöstlichen Kärnthen. VI. 414. — im nordwestlichen Böhmen. VII. 320. — im nordwestlichen Mähren. X. 221. — im nordwestlichen Theile von k. k. Schlesien. IV. 3. — in Ober-Oesterreich. III. d. 74; IV. 235. — im Pilsener Kreise. V. 274, 291; VI. 484, 493. — der Radstädter Tauern. V. 810. — im Rhätikon. X. 115. — von Ronsperg. VI. 787. — im Rosalien-Gebirg und am Wechsel. V. 478. — der Ruster Berge. III. d. 53. — des Saazer Kreises. VIII. 519. — in Steiermark. V. 531; VII. 223, 229, 230. 237. — im südlichen Böhmen. IV. 127; VI. 54, 55, 62, 64, 265. — im südlichen Mähren. IV. 55, 56. — im südwestlichen Böhmen. VI. 586, 588. — um Tabor. IX. 664. — in Thonschiefer und Kalk-Thonschiefer übergehend. V. 779. — von Turrach. IX. 188, 199, 225. — (erratischer) im Eocenen. IX. 109, 110. — (gebänderter). VIII. 521; X. 380. — (granitartiger). X. 379. — (grauer). VIII. 530, 539, 540, 543, 544, 545, 565; IX. 430, 550, 552. — — Zinnerz-Gänge. IX. 562. — (grüner) von Offenburg. VIII. 334, 335. — (porphyrartiger). V. 279. — (rother). VIII. 520, 522, 527, 529, 537, 538, 539, 540, 543, 565, 602; IX. 430, 550, 552. — (stängliger). VIII. 521, 522. — -Gänge im krystallinischen Kalk. VI. 492. — -Glimmerschiefer. V. 283; VI. 34, 756; VII. 226; VIII. 11, 17. — -Granit mit Graphit. V. 91. — — in Nieder- und Ober-Oesterreich. III. c. 47, d. 61, 74; V. 479. — — im Pilsener Kreise. VI. 460, 461. — -Phyllit. VIII. 537. — -Schollen im Granit. X. 391, 392. Gold-Bergbau im Egerer Kreis. VII. 491, 529; VIII. 32. — — von Nagyág. VIII. 127. — — zu Obergrund. II. c. 91. — — von Vöröspatak. II. d. 77, 80, 81, 86; III. c. 56, 63. — -Einlösung (Verordnung über). VIII. 189. Goldkies von Trojaka. VI. 125. Goldseifen im Bistritz-Thal. VI. 132. Gold-Vorkommen in Australien. III. b. 148. — — in Californien. I. 723; II. c. 147. — — auf der Iser-Wiese. IV. 833. — — in Olahpian. IV. 486, 488, 489, 490. — — in Süd-Slavonien. IV. 494, 495, 497. — — (diluviale und alluviale). V. 230, 231. Goldwäschereien auf Borneo. IX. 289, 290. — in Mittel-Böhmen. VI. 403; VII. 131. — im Oesterreichischen Kaiserstaate. II. b. 164; IV. d. 230, 231; IX. V. 15, 16. — (alte) im Böhmerwald. V. 210, 567, 569, 581. Gosau-Conglomerate. II. d. 54; III. a. 77. — -Formation (Alter und Stellung der). III. a. 162. — — (Mollusken der). III. b. 198, 199. — -Mergel (Fische der). II. d. 166. — —

(Flora der). IV. 168, 169. — -Schichten im Enns-Thale. IV. 477, 483. — — im Gosau-Thale. II. d. 52. — — von Hieflau. V. 405. — — bei Idria. VII. 839. — — in Nieder-Oesterreich. III. d. 59, 68. — — der nordöstlichen Kalk-Alpen in Tirol. VII. 735. — — am Nord-Abhange der nordöstlichen Alpen zwischen Wien und Salzburg. I. 44. — — in den Salzburger Alpen. II. c. 118. — — in Unter-Steiermark. VIII. 442. — — (Gasteropoden der). II. b. 168; IV. 111, 395. Grabstätten (römische) bei Bruck an der Leitha. II. b. 192, 193. Grammatit im Gneiss. VII. 228. — im Eklogit. VII. 232. Granat im Glimmerschiefer. V. 93, 327, 331; VII. 234; IX. 187, 430. — im Gneiss. V. 91. — im Granulit. IV. 269. — von Schemnitz. IV. 183. — in Trachyt. X. 517. Granatfels zwischen Amphibol-Gneiss und körnigem Kalk. VIII. 566. Granit mit amphibolischen Gesteinen. V. 28. — des Bacher-Gebirges. VIII 275, 287; X. 203. — im Banat. VI. 227. — Bildungsweise. V. 65, 66. — von Billiton bei Java. IX. 285. — des Blanik-Berges. IX. 667. — des Böhmerwaldes. IV. 253; V. 2; VI. 10, 760, 762, 777, 793, 800. — von Christianberg. V. 52. — von Franzensbad und Eger. I. 685, 691, 692; VII. 490; VIII. 5. — von Glimmerschiefer überlagert. VIII. 18, 21. — im Gömörer und Zipser Comitate. X. 538. — im Gneiss von Mittel-Böhmen. VI. 360. — im Granitit. X. 376, 377. — im Granulit. V, 19, 46. — von Hainburg. III. d. 37. — des Iser-Gebirges. X. 372, 373. — von Karlsbad. VI. 91, 92, 906. — des Karlsbader Gebirges. VII. 496. — von Königswart. II. b. 29. — in kugeligen Absonderungen. VI. 375. — des Künischen Gebirges. VI. 35. — des Leitmeritzer Erzgebirges. IX. 553. — in Mähren. X. 223, 236. — im mährischen Gesenk. V. 97. — von Marienbad. II. b. 1, 25, 29. — von Mauthhausen und Freistadt. IV. 253. — in Mittel-Böhmen. VI. 363. — in Nieder- und Ober-Oesterreich. III. c. 48, d. 75; IV. 245. — im nordwestlichen Böhmen. VII. 319, 517; VIII. 5. — im nordwestlichen Mähren. X. 227, 228. — im nordwestlichen Theil von k. k. Schlesien. IV. 5. — in Ober-Oesterreich. III. d. 75. — im Pilsener Kreise. VI. 457, 501. — des Plöckensteines. IV. 128; VI. 12. — von Pressburg. II. c. 42. — von Přibram. VI. 260, 261. — von Ronsperg. VI. 789, 790. — von Rumburg und Hainspach. X. 390, *V.* 16. — der Ruster Berge. III. d. 53. — im Saazer Kreise. VIII. 549. — in Steiermark. V. 539. — im südlichen Böhmen. V. 2, 111, 267, 267, 294, 295, 297. — im südwestlichen Böhmen. VI. 586, 589, 606. — im südwestlichen Erzgebirg von Böhmen. VIII. 5. — um Tabor. IX. 676. — (erratischer) im Eocenen. IX. 109, 110. — (glimmerloser). IV. 254. — (grauer). VIII. 8. — (grobkörniger) mit Turmalin. V. 20. — (magnetisch-polarer). VIII. 656, 657, 681. — (porphyrartiger). V. 300, 301; VI. 27, 370, 372; IX. 675. — — von Gneiss durchsetzt. VIII. 550. — — der Schneekoppe. X. *V.* 117. — (rother). VI. 477, 803. — (Taborer). VIII. 784; IX. 678. — -Blöcke im Gneiss. VI. 492. — -Gang im Gneiss. IX. 687. — -Gneiss der Central-Alpen. V. 769, 770. — — in Mittel-Böhmen. VI. 371, 372; IX. 675. — -Greisen. IX. 567. — -Porphyr. VI. 392, 395, 472, 502. — — des Böhmerwaldes. VI. 10, 21. Granitit. VI. 722; IX. *V.* 110, 111; X. 370, 376, 390, *V.* 15. — Granit einschliessend. X. 377. — (erratischer) im Eocenen. IX. 110. Granulit mit Basalt. IX. 438. — im Böhmerwald. IV. 858; V. 2; VI. 756. — von Christiansberg. V. 49. — an Granit. V. 19. — des Künischen Gebirges. VI. 35. — in Mittel-Böhmen. VI. 361, 362, 367. — in Nieder-Oesterreich. IV. 268, 281; V. 490, 491. — in Ober-Oesterreich. IV. 254. — des Plansker Gebirges. V. 5. — von Prachatitz. V. 43. — des Rosalien-Gebirges und des Wechsels. V. 490, 491. — im Saazer Kreise. VIII. 546. — in Serpentin. V. 31. — im südlichen Böhmen. V. 265. — mit Turmalin. V. 15. — (körniger). V. 13, 14. — (schieferiger). V. 13. — -Formation (Bildung der sächsischen). VII. 766, 834, 835. Graphit. Analyse und Proben. IV. 634, 829; V. 192, 641, 868; X. Anh. 49. — im bayerischen Wald. II. d. 146. — im Gneiss des mährischen Gesenkes. V. 91. — im Gneiss des südlichen Böhmens. V. 57. — in Nieder- und Ober-Oesterreich. III. c. 44; IV. 270, 271. — von Passau, Böhmen und Mähren. V. 201. — von Schwarzbach. III. d. 145; IV. 126, 139; V. 57, 201, 266. — -Schiefer von Murau und Tratten. V. 356, 363. Grau-Antimonerz von Přibram. VI. 56. Grauwacke des Enns-Thales. IV. 171, 461, 465, 468, 469. — des Kalniker Gebirges. IV. 550. — im Leogang-Thale. V. 152, 153, 155. — im mährischen Gesenk. V. 105, 106. — von Meran. II. c. 6. — in Nieder-Oesterreich und Nord-Steiermark. III. d. 64. — am Nord-Abhang der nordöstlichen Alpen zwischen Wien und Salzburg. I. 28. — im nordöstlichen Ungarn. X. 404, 405. — im nordwestlichen Theile von k. k. Schlesien. IV. 10. — des Rosalien-Gebirges. III. b. 94. — am Semmering. I. 577. — im südlichen Mähren. IV. 55. — südlich vom Tännen- und Dachstein-Gebirg. III. d. 144. Grauwacken-Formation der Central-Alpen. V. 826, 839, 849. — — von Eisenerz. V. 397. — — von Přibram. VI. 255. — — des Rosalien-Gebirges und des Wechsels. V. 506. — — im westlichen Mähren. IX. 38, 39; X. 229. — — (eisenführende) in Salzburg. V. 369, 371. — -Kalk bei Brünn. IV. 323, 325. — — von Hainburg. III. d. 38. — — des Leitha-Gebirges. III. d. 44. — -Schiefer der böhmischen Silur-Formation. Etage B. VII. 116, 117. — — im nordöstlichen Kärnthen. VI. 194. — der nordöstlichen Kalk-Alpen von Tirol. VII. 718, 721. Greisen. VIII. 553. — (Zinnerze im). IX. 566.

Grestener Schichten bei Idria. VII. 839; IX. *V.* 18. — — in den nordöstlichen Alpen. IV. 739, 740. — — in Ober-Krain. VIII. 218. — — (Petrefacte der). IV. 742. Grobkalk des Moslaviner Gebirges. III. a. 94. — bei Nagyág. VIII. 714. — von Porczesd. X. *V.* 58. — von Warasdin-Teplitz. III. d. 13, 14. — (Crustaceen im) von Verona und Vicenza. V. 886. Grossdorner Schichten. IX. 270, 271, 272. Grossular. X. Anh. 8. Grubenbrand zu Steierdorf. III. d. 143. Grubenmaasse (Verordnung über Zusammschreibung der). VIII. 818. Grün-Bleierz von Přibram. VI. 50. Grünerde von Kaaden. VII. 848; IX. 435, 436; X. Anh. 8. Grünsand in Mähren. V. 708, 711, 712, 739, 740, 742. — in Vorarlberg. VII. 38. Grünstein im böhm. Erzgebirge. VIII. 28, 29. — der böhm. Silur-Formation, Etage B. VII. 126, 127. — im mährischen Gesenk. V. 99. — von Neutitschein. IX. *V.* 50, 51. — im nordwestlichen Theil von k. k. Schlesien. IV. 7, 11. — von Přibram. VI. 260. — von Ronsperg und Hainspach. X. 393. — im Saazer Kreise. VIII. 558. — von Teschen. IV. 173, 311. — -Porphyr von Nagyág. VIII. 715, 723. Gryphäen-Sandstein. VII. 23. Guano, Analysen. V. 871; VIII. 153, 154; X. Anh. 48. Gurkfelder Schichten. IX. 271, 272, 369. Gussstahl, Analysen. V. 858; X. Anh. 29. — -Fabrication in England. III. a. 168. Guttensteiner (Trias-) Dolomit von Bleiberg. VII. 69, 88. — — — südlich von Save. VII. 683. — Kalk in Istrien. VI. 744. — — in der Lombardie. IX. 460, 462, 463, 465. — — der Nord-Alpen. X. 83, 92. — — der nordöstlichen Alpen. IV. 722, 725, 741. — — am Rand des Wiener Beckens. X. 257. — — im Salzburger Saale-Gebiet. V. 120. — — des Sulzbacher Gebirges. VIII. 437, 438, 441. — — im Unter-Steiermark. X. 162, 163, 167, 168. — — (schwarzer). VII. 13, 417, 649, 682. — Schichten in den bayerischen Alpen. VIII. 149. — — der Carnia. VII. 179, 442. — — am Grintouz. IX. *V.* 127. — — bei Hall in Tirol. VI. 331, 339, 347. — — bei Idria. VII. 849. — — in Kärnthen. VI. 547; VII. 339. — — in den Kalk-Alpen südlich der Save. VII. 682, 683. — — des Karawanken-Gebirges. VII. 637, 661. — — in Krain. VIII. 212, 213, 214, 216, 229; IX. 267, 271. — — von Lienz. VII. 417. — — der nordöstlichen Kalk-Alpen in Tirol. VII. 722. — — (metamorphe). VII. 718. Gymnit. I. 607; IV. 525; X. Anh. 8, 9. Gyps von Aix. III. a. 186. — bei Bleiberg. VII. 69. — von Bochnia. II. c. 31. — bei Brünn. IV. 325. — im Buchberger Thal. II. a. 153, c. 64. — bei Dobschau. X. 547. — bei Eisenerz. V. 401, 402. — im Enns-Thale. IV. 475. — der Gervillien-Schichten. IV. 330, 331. — von Hall bei Admont. IV. 102, 103. — des Haller Salzberges. VI. 346. — des Hallstätter Salzberges. V. 603. — des Keupers. III. a. 54. — von Längenfeld. VI. 844; VII. 181, 651; X. Anh. 33. — von Mährisch-Ostrau. II. b. 160. — in Nieder-Oesterreich. II. a. 27. — von Ober-Netschitz. V. 632; X. Anh. 33. — in den östlichen Alpen. III. a. 53. — von Přibram. IV. 325. — der Raibler Schichten. X. 119, 133. — in den salzburgischen Alpen. II. c. 120. — von St. Gallen. IV. 102. — von Vallalta. IX. *V.* 122. — vom Weichselboden. IV. 101, 102. — der Werfener Schiefer. IV. 720, 721. — -Formation der Nord-Karpathen-Länder. IX. 143, *V.* 14. — -Krystall (grosser) aus Thüringen. VIII. 789, 790 — -Lager (Regeln zur Aufsuchung der) in Galizien. IX. 157. — -Mergel vom Pezzaze-Thal. VI. 891.

Haarkies von Přibram. VI. 55. Häfen am Obern See (Nord-Amerika). VII. 791, 792. Hämatit pseudomorph nach Cerussit. VI. 61. Härte (Verhältniss zwischen Atom-Gewicht, specifischem Gewicht und) isomorpher Mineralien. III. d. 104. Hallstätter (Trias-) Dolomit von Lienz. VII. 418. — — in Unter-Steiermark. X. 162, 163, 178, 179. — -Kalk der Carnia und des Comelico. VII. 443. — — in Nieder-Oesterreich. III. d. 59, 69. — — in Nord-Tirol. X. 97. — — in Nord-Ungarn. VII. 704. — — der nordöstlichen Alpen. IV. 723, 725, 727. — — im östlichen Kärnthen. VII. 338. — — im Salzburgischen. V. 122, 259. — — des Sulzbacher Gebirgs. VIII. 441. — — des Thaurer Joches. IX. *V.* 101. — — in Unter-Steiermark. X. 163, 167, 169. — — (Monotis und Halobia im). IV. 726. — -Schichten am Grintouz. IX. *V.* 127. — — des Halleiner Salzberges. V. 601. — — bei Idria. VII. 839. — — des Karawanken-Gebirgs. VII. 638. — — in Krain. VIII. 217; IX. 267, 268, 269, 271, 275. — — (Cephalopoden der). V. 204. Halobien-Dolomit. VII. 418. — -Schichten im Isonzo-Thal. IX. 361. — -Schiefer. IX. 466. Hamelicit. II. b. 16, 17, 18. Hand-Mikroskop (einfaches) mit Flüssigkeits-Linse. VII. 97. Harmotom von Přibram. VI. 51. Harringtonit. X. Anh. 9. Hartit. VII. 91, 93. Harz (fossiles) im Hippuriten-Kalk. VII. 736 Anmerk. Haselgebirg des Hallstätter Salzberges. V. 603, 607. Hatchettin. V. 898. Hauerit. I. 155, 156. Haupt-Conglomerat von Turrach. IX. 207, 211, 225. — -Dolomit des Fersina-Thales. VIII. 303. — -Granit im westlichen Böhmen. VII. 319. — -Kalklager von Turrach. IX. 190, 223, 225. Herzinit. VI. 785. Heteromerit. VI. 155; X. Anh. 9. Hierlatz- (Lias-) Kalk im Isonzo-Thale. IX. 341, 342. — -Schichten. III. d. 92. — — der bayerischen Alpen. VII. 379, 380. — — der Kalk-Alpen südlich der Save. VII. 686. — — der nordöstlichen Alpen. IV. 752. — — in Ober-Krain. VIII. 219. — — des Sonnwend-Joches. VII. 733, 734. — — (Petrefacte der). IV. 753; V. 881, 882. Hippuriten (Organisation der). V. 199. — -Kalk in Dalmatien. IV. 157. — — der Gosau.

II. d. 54, 55, 59. Hochgebirg der Alpen. III. 6, 48. Hochofen-Schlacken, Analysen. III. a. 156, 175; VII. 757; X. Anh. 30. Höhenbestimmungen im Auftrag der k. k. geologischen Reichsanstalt. III. c. 94; VIII. 163, 234; X. 29. — in den Bieskiden. VII. 281, 293. — bei Bleiberg. VII. 89, 90. — in Böhmen. III. c. 67; VI. 736; VII. 135, 163; VIII. 510. — im Böhmerwald. VII. 135, 137, 148, 368; VIII. 510. — im böhmischen Erzgebirg. VIII. 513. — im böhmischen Fichtelgebirg. VIII. 511. — in der Bukowina. III. a. 132; IV. 125; IX. 253; X. 345, 346. — in Croatien. IV. 534, 542. — in Dalmatien. III. b. 54. — im Eger-Elbogen-Falkenauer tertiären Becken. VIII. 515. — zwischen Gail, Drau und Save. VII. 675. — in Galizien. IV. 120. — aus den Gebieten der obern Drau, des Tagliamento und der Piave. VII. 459. — zu geologisch-orographischen Zwecken. III. b. 1. — in Görz und Gradiska. III. b. 48. — um Gresten. VI. 880. — um den Gross-Glockner. I. 125. — im Inn-Kreise. VI. 842. — in Istrien. III. b. 50. — in Kärnthen. III. b. 62; VI. 142, 567, 908; VII. 346; IX. 160, 164. — in den Kalk-Alpen südlich der Save. VII. 690. — im Karlsbader Gebirg. VIII. 511. — in den kleinen Karpathen. IX. 161. — im Körös-Thal. III. b. 21. — im Kolomeaër Kreis. X. 345, 349. — in Krain. I. 409, 410; III. b. 142; VI. 908; X. 45, 53. — im Lech-Thal. X. 67. — im Leitmeritzer Kreis. X. 40. — im Linzer Kreis. VIII. 255. — in Lombardo-Venetien. II. c. 78. — in Mähren und k. k. Schlesien. III. a. 115; IV. 12; V. 161, 173; VII. 279, 295; IX. 8, 15, 21, 27, 80, 82. — in der Marmaros. X. 345, 348. — in der Militärgrenze. IV. 534, 543. — im mittlern, nördlichen und westlichen Mähren. IV. 12; VI. 72, 185; VII. 298, 301. — in Nieder-Oesterreich. II. d. 156; III. c. 99, 101, 102, 105, 106, 109. — in Nieder- und Ober-Oesterreich. I. 523. — im nördlichen Steiermark. I. 121. — im nördlichen Ungarn. X. 555. — in den nordöstlichen Alpen. II. a. 34. — der Nullpunkte des Donau-Stromes. VIII. 265. — in Ober-Steiermark. VII. 706. — um Ofen. IX. 164. — im Pesther und Graner Comitate. X. 69. — im Pilsener Kreise. V. 316; VI. 503; VII. 375. — um Přibram. VI. 262. — bei Radoboj. I. 279. — um Raibl. I. 266. — im Rosalien- und Leitha-Gebirg. III. c. 107. — in Salzburg. I. 543. — in k. k. Schlesien. I. 77, 214. — in Siebenbürgen. V. 586. — in Slavonien. IV. 534, 543. — in Steiermark. II. c. 64; IV. 528, 529, 530; VI. 908; VII. 706. — in den Sudeten. VII. 281, 293; X. 237. — im Taborer Kreis. X. 37. — in Tirol. II. a. 59. b. 133; VI. 899; X. 59. — an der tirolisch-bayerischen Landesgrenze. IX. 309, *V.* 56. — im Triestiner Gebiet. III. b. 50. — in Ungarn. IV. 528, 534, 535; IX. 160, 164; X. 69, 555. — in den venetianischen Alpen. VIII. 249. — in Vorarlberg. II. a. 75, b. 143; X. 67. — in Wien zwischen St. Stephanskirche und Nordbahnhof. VIII. 171, 172, 235. — im Wiener Becken. III. c. 112, 115. — im Zwittawa-Thale. V. 161. — (Sicherheit barometrischer). VI. 450, 879, 887. — (Tafeln zur Berechnung barometrischer). VI. 837. — -Darstellung (vereinfachte). IX. 234, *V.* 59. — -Schichtenkarte von Europa (Major Papen's). IX. *V.* 123, 124. Höhle von Agtelek. VII. 704. — bei Brunn am Steinfeld. VI. 872. — von Einöd. III. d. 139. — bei Fuschl. VIII. 789. — von Ober-Langenau. VIII. 169. — von Slaup. II. a. 136, 137, 146, 159. — bei Theissholz. IX. *V.* 147. Höhlen am Karst. I. 702; III. d. 127. — im Körös-Thale. III. b. 30, 31. — von Lueg. III. d. 127. — des Rosalien-Gebirgs und des Wechsels. V. 501. — in Steiermark. I. 101; III. d. 139; VIII. 459. — im Sulzbacher Kalkgebirg. VIII. 459. — bei Weitz. V. 551. Höhlenkalk bei Edelény. VII. 703. Holz (bituminöses) von Enskirchen. V. 198. — (verkieseltes) von Vöröspatak. II. d. 73. — (verkohltes) in Steinsalz von Wieliczka. VI. 869, 870. — (versteinertes) in der böhmischen Arkose. VIII. 705. — — bei Nachod. VIII. 811, 812. — — von Radowenz. VIII. 275; IX. *V.* 1. — von Schwadowitz. IX. *V.* 64, 105. — -Essig (Darstellung von Paraffin und reiner Essigsäure aus). III. a. 36. — -Industrie im nordwestlichen Theil von Nord-Amerika. VII. 773, 801. — -Schwemmcanal (Fürstlich Schwarzenberg'scher) im südlichen Böhmen. V. 625. — Hornstein im Hallstätter Kalk. VII. 638 — -Concretionen im Jura-Kalk. V. 689, 690. — -Gang bei Karlsbad. VI. 89, 95. — -Gänge in der Banater Kreide. VI. 251. — -Gebilde um Brünn. II. c. 1. — -Geschiebe von Blansko. V. 697. Hüttenbetrieb im Banat. IV. 807, 808. — im Bleigebiete von Nord-Amerika. VII. 795. — zu Detroit. VII. 772. — zu Felsőbánya. IV. 623. — zu Fernezely. II. c. 157; IV. 823, 824. — zu Kapnik. IV. 614. — im Nagybányer Bergbezirk. IV. 568, 579. — zu Neusohl. IV. 795, 786, 803, 823, 824. — zu Přibram. VII. 171. — zu Schmölnitz. IV. 807. Hütten-Producte aus Nassau. IV. 647. — — aus Serbien. II. b. 174. — -Werke im nordwestlichen Nord-Amerika. VII. 772, 795. — — in Ungarn und Siebenbürgen (Production der) im Jahre 1847. IV. 825. — -Wesen (Freih. v. Beust's Schrift über die Eisenbahn-Frage in Beziehung auf das Freiberger Berg- und). VI. 197. Hydrargillit. IV. 397; X. Anh. 9.

Jahrbuch der Leobner k. k. montanistischen Lehranstalt. II. b. 171, 172; III. b. 162; IV. 194; VIII. 178; X. *V.* 135. — der Schemnitzer k. k. Berg-Akademie. X. *V.* 135. Jaspis-Geschiebe im Jura-Kalk. V. 697. — -Lager im Klippenkalk. VI. 110, 130. Jaulingit, Anal. X. Anh. 9. Industrial-Privilegien. I. 382, 565, 751; II. a. 166, b. 195, c. 169, d. 174; III. a. 209, b. 184, c. 161, d. 172; IV. 198, 438, 650, 869; V. 236, 449, 648, 905; VI. 208, 421, 659, 914; VII. 209, 392, 616, 856; VIII. 192, 393, 637, 820; IX. 178, 301,

512, 702; X. 145, 359, 471, 579. Injections-Gänge (eisenführende) der alpinen Grauwacke. V. 383 Anm. Inoceramen-Kalk. VII. 25. — -Mergel. VII. 23. — -Schiefer. VII. 4, 15, 23. Insecten-Schichten von Aix. III. a. 187. — — von Radoboj. VII. 831. Insel-Flora (fossile) von Schauerleithen. I. 163, 164. Intricaten-Flysch. VII. 15, 25, 36. Iserin. IV. 833; VII. 154; X. Anh. 10. Isocardien-Kalk bei Eisenerz. V. 403. — des Salzkammergutes. I. 656. Isogeothermen der Alpen. I. 287, 301. Isomorphismus (Verhältniss des) zum Atomgewicht, Härte und specifischen Gewicht. III. d. 104. Jura (brauner und oberer) am Fläscher Berg und Luciensteig. X. 129. — (weisser) im Banat. VI. 246. — — in Mähren. V. 695. — — der nordöstlichen Alpen. I. 41, 42. — -Ammoniten der Süd-Alpen. IX. *V.* 47, 48. — -Gebilde auf Devonischem. V. 684, 685, 686. — — im Isonzo-Thal. IX. 361, 362, 364. — — in Kärnthen. VII. 193, 335. — — in den Kalk-Alpen des Saale-Gebiets (Salzburg). V. 133, 134. — — in der Lombardie. IX. 486. — — in Mähren. V. 679; IX. 41. — — in Mittel-Ungarn. X. 490, 492. — — in Montenegro. X. *V.* 25. — — nördlich von Krakau. I. 253, 254. — — der Nord-Karpathen. VI. 304, 309, 310. — — im nordöstlichen Ungarn. X. 411. — — in Ober-Krain. VIII. 218. — — in Süd-Steiermark. VIII. 436. — — in Vorarlberg und Nord-Tirol. VII. 19, 38; X. 78. — — der Zugspitzwand. VII. 379. — — (Eisenerze führende). V. 684, 685, 686, 695, 698. — — (Gliederung der). in den nordöstlichen Alpen. IV. 715, 764, 773, 784. — — (Kiesel-Concretionen der). V. 688. — — (Prof. Quenstedt's Werk über die). VIII. 168. — -Kalk in Galizien. X. *V.* 101. — — in Nieder-Oesterreich nördlich der Donau. II. d. 166, 167; III. d. 23. — — von Novahora. IV. 74, 76. — — in Siebenbürgen. X. *V.* 182. — — im südlichen Mähren. IV. 53. — — im Viertel ob dem Mannhartsberg. III. d. 23. — — (Bleierze im kärnthner). VII. 370. — — (rother). IV. 327, 333, 349, 360, 775. — -Mergel mit Ammoniten. V. 682. — -Petrefacte aus Dalmatien. IV. 646, 647. — — aus Elsass und den Vogesen. II. b. 144. 145.

Kadmium-Salze (essigsaure). VI. 189. Kakoxen. V. 73; X. Anh. 10. Kalk (hydraulischer), Anal. X. Anh. 42. 43. — im Eipelgraben. IV. 92. — von Stollberg. II. d. 154, 155; III. a. 199; X. Anh. 42, 43. — -Breccie der Kreide. VI. 251. — südlich der Save. VII. 686, 687. — des Uebergangs-Gebirgs. V. 549. — (tertiäre). V. 563. — -Cemente in der Pariser Ausstellung. VII. 753, 756. — -Concretionen im Leitha-Kalk. V. 565. — — im Pläner. V. 717. — -Conglomerat (neogenes). VIII. 453, 454. — — (tertiäres). V. 565; VII. 549, 550. — -Diabas. IV. 317, 319. — -Gebilde der Algäu-Schichten. X. 109. — — der Alpen in Vorarlberg und Nord-Tirol. X. 72. — — der bayerischen Alpen zwischen Isar und Salzach. VIII. 147. — — der dalmatinischen Inseln. X. *V.* 99. — — bei dem Kahlenberger Dörfel. X. 267, 268, 269. — — des Liburnischen Karsts und der Quarnerischen Inseln. X. 333, 336, 341. — — bei Ofen. VIII. 311, 312. — — des Pilis-Vertes-Gebirgs. X. 484, 488. — — (eocener) in Unter-Krain und Istrien. X. 280, 281, 283, 293, 297, 298, 302, 313, 314, 324, — -Gesteine als Bau-Materiale in der Pariser Ausstellung. VII. 750. — -Glimmerschiefer der Central-Alpen. V. 779, 829, 830. — — in Kärnthen. VI. 201, 513. — -Mergel (tertiäre). VII. 546, 547. — -Milch, Anal. III. c. 154; X. Anh. 40. — -Orthoklas-Quarz-Gestein. VI. 497. — -Sandstein (neogener). IX. 382. — -Schiefer von Kurowitz. IX. 13, 44. — — (lithographische) von Galignana. IX. *V.* 123. — — (merglige) des Eocenen. X. 321, 324. — -Schotter (diluvialer). VI. 561. Kalkspath, Anal. VIII. 616; X. Anh. 10. — von Boleschin. VI. 161, 499. — von Moldowa. IV. 402, 680. — von Novahora. IV. 75. — von Přibram. VI. 47. — pseudomorph nach Schwerspath. V. 63. — in Syenit. IV. 322. — -Gang im Gneiss. V. 292. Kalkstein der Alpen mit der Dachstein-Bivalve. III. d. 90. — der Alpen des Saale-Gebietes. IV. 862; V. 116. — der Alpen zwischen Wien und Guttenstein. IV. 178, 179. — Analysen. I. 720; II. b. 67, 68, 69, 70, 71, 72; III. b. 156, c. 155; IV. 152, 401, 830; V. 290, 372, 642, 872; VI. 155, 157, 159, 200; VII. 154, 806, 810; VIII. 616; IX. 507; X. Anh. 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42. — mit Aphanit. V. 309. — der Bürger-Alpe bei Mariazell. III. a. 195. — der Central-Alpen. V. 786, 788. — des Enns-Thales. IV. 435, 474. — und Glimmerschiefer. V. 330; VI. 109, 621. — der Grauwacke. V. 398, 507, 508, 511, 548, 826. — der Grebenzen. V. 347; VI. 521. — des Haller Salzberges. VI. 331, 332, 338, 340. — der Hinterbrühl bei Wien. VI. 201, 202. — des Hochfellen. IV. 328. — ober dem Keuper. III. b. 76, 82. — des Ladizer Jöchels. VI. 336. — des Lavatsch-Thales. VI. 344, 350. — des Radstädter Tauerns. V. 811, 834, 835, 845, 849. — des Rothliegenden. V. 677, 678. — um Salzburg. II. a. 23. — aus Süd-Tirol, Analysen. I. 729. — der Sulzbacher Alpen. VII. 170. — des Tännengebirgs. II. a. 80, 81. — bei Trient. VIII. 836. — des Uebergangs-Gebirgs in Mittel-Steiermark. VII. 241, 242, 243, 244. — in Unter-Krain. IX. 273, 275. — (bunter) vom Lazur-Berg. VI. 804. — (Cephalopoden führender) von Hörnstein. II. c. 27. — (dunkler) der Trias. III. b. 65. — — des untern Lias. X. 259. — (grauer) von Esino. VI. 894. — — des Körös-Thales. III. a. 29. — (krystallinischer) des Böhmerwaldes. V. 54, 55, 58. — — im Egerer Kreis. VIII. 27. — — in Eklogit. VIII. 566. — — im Gneiss, Granit und Glimmerschiefer. V. 96, 291,

293, 294, 295, 296, 340; VI. 95, 486, 496, 498, 587. — — von Hüttenberg. VI. 621, 624. — — in Mittel-Böhmen. VI. 695, 719. — im nordöstlichen Kärnthen. VI. 198, 199. — — in Oesterreich, nördlich der Donau. III. c. 41, 43; IV. 280. — — mit Pegmatit und Phyllit. IX. 685, 687. — — im Pilsener Kreis. V. 287. — — im Rosalien-Gebirg und am Wechsel. V. 494, 499. — — im Saazer Erzgebirg. VIII. 562, 563. — — im südlichen Böhmen. V. 227. — — mit Thonschiefer. VI. 517, 519. — (Oberflächen-Veränderung am festen). II. a. 164. — (oolithischer) des Fersina-Thales. VIII. 302, 303, 307. — (schwarzer) des bunten Sandsteines. III. a. 33, b. 55; V. 120; VII. 417, 423, 424, 443, 447, 451. — — des Lias. III. d. 66. — — der Stang-Alpe. VI. 539, 544. — — vom Wellitobel. VII. 13. — (schwarzer und grauer) an der Gurk. IX. 260. — (silurischer). VI. 600; VII. 111. — (tertiärer dichter). VI. 301. — -Lager mit Granit und Gneiss. IV. 135. — — der Stang-Alpe. IX. 190, 199. — — (eisenführendes) von Turrach. V. 363, 364. — — (graphitische) von Schwarzbach. III. d. 145; IV. 126, 128. Kalk-Thonschiefer der Central-Alpen. V. 779. — -Tuff im Banat. VI. 251. — — bei Erlau. V. 212. — — bei Scheibbs. I. 376. — — im Schöderwinkel. VII. 65. — — mit versteinertem Holz. VII. 55, 66. — — bei Warasdin-Teplitz. III. d. 15. — — im Weitensteiner Gebirg. VIII. 459. — — (diluvialer) bei Ofen. VIII. 331, 332. Kalomel-Krystalle (künstliche). III. b. 168. Kammkies von Přibram. VI. 54. Karpathen-Sandstein der Bukowina. VI. 112, 130. — — mit Eisenerzen in Ost-Galizien. VI. 182, 183. — — in Galizien. X. *V.* 121. — — im Jasloër Kreis. VII. 836. — — bei Luhatschowitz. VII. 377. — — in der Marmaros. IX. *V.* 116, 130. — — bei Nagyág. VIII. 713. — — im nordöstlichen Ungarn. X. 418, *V.* 67. — — in Siebenbürgen. X. *V.* 130, 132, 182. — — im südlichen Mähren. IV. 51. — — bei Vöröspatak. II. d. 66; III. c. 56, 61. — — im westlichen Mähren. IX. 45, 55. — — (Erdharze im). VI. 101. Karpholith. Anal. Anh. 10. Karst-Kalk. X. 333, 342, 343, 344. Karte der Cantone St. Gallen und Appenzell. VI. 866. — der Höhenschichten von Europa (Major Papen's). IX. *V.* 123, 124. — von Klein-Asien. (Obr. Fischer's, Kiepert's, v. Moltke's und v. Vinke's), V. 435, 436. — des Oesterreichischen Kaiserstaates (Major Scheda's). VI. 870; VIII. 783. — (geologische) von Bayern von Gümbel. X. *V.* 190. — — von Belgien von Dumont. VII. 375; VIII. 175. — — des Herzogthums Braunschweig. VIII. 167, 168. — — von Brünn und Umgebung. IV. 175. — — des Buchberger Thales. II. a. 152. — — von Deutschland, der deutschen geologischen Gesellschaft zu Berlin. II. b. 89; VII. 824. — — Deutschlands, v. G. Bach. VII. 386. — — von England. IV. 839. — — von Europa (Dumont's). VIII. 804. — — des Königreiches Hannover (Römer's). IX. *V.* 40, 41. — — von Hainburg. III. a. 177. — — von Idria. VIII. 858. — — von Kärnthen. VII. 386, 819, 820. — — von Lungau und Kärnthen. V. 444. — — von Nieder-Oesterreich. III. a. 182, 183, b. 165. — — — — (Foetterle's). VIII. 178. — — von Nieder- und Ober-Oesterreich. III. a. 189; IV. 845; V. 875. — — des nordöstlichen Böhmens. IX. *V.* 61. — — des nordöstlichen Ungarns. IX. *V.* 143. — — des nordwestlichen Ungarns. X. *V.* 55. — — von Salzburg. IV. 176, 846, 856; V. 871; VI. 861. — — des Salzkammergutes. IV. 431, 432, 433. — — der Schweiz von Studer und Escher. IV. 841. — — von Siebenbürgen. VIII. 85, 86. — — des Silur-Beckens von Mittel-Böhmen. VI. 189. — — des Steierdorfer Gebirgs. VI. 905. — — von Süd-Amerika (Foetterle's). V. 876. — — des südlichen Böhmens. IV. 843. — — von Tirol. IX. *V.* 74. — — von Unter-Krain. IX. *V.* 60. — (W. Hermann's) über Verbreitung der Stein- und Braunkohle in Deutschland. VIII. 168, 169. — (hypsometrische) von Ober-Steiermark. VI. 194. — — der Umgebung von Brünn. VI. 185. — (Stur's Uebersichts-) der neogen-tertiären. Diluvial- und Alluvial-Ablagerungen im Gebiete der nordöstlichen Alpen. VII. 383, 384. Karten der k. k. geologischen Reichsanstalt. X. *V.* 146, 147, 148, 149, 150, 151. — — — auf der Pariser Ausstellung. VI. 192, 904; VII. 183. — des k. k. militärisch-geographischen Institutes (Preise der). IX. *V.* 154. — verschiedener europäischer Staaten (Preise der). IV. 298. — des Nagyáger Erzgebirges. VIII. 85, 86. — der nordöstlichen Alpen. I. 17. — -Commission des Oesterreichischen Kaiserstaates. I. 380; II. b. 161. Kenngottit, Anal. X. Anh. 10. Kessel in den Kreide-Gebilden. VIII. 222. Kesselthäler in Cattaro und Montenegro. X. *V.* 27. — in Unter-Krain. IX. 265. Keuper am Iseo-See. VI. 892. — der nordöstlichen Alpen. I. 48, 49; III. b. 69. — um Weimar. IX. 160. — bei Weyer. I. 637. — (Aequivalent der St. Cassian-Schichten im fränkischen). X. 22. — (alpiner). VIII. 149. — -Gyps. III. b. 54. — -Pflanzen von Idria. IX. *V.* 18. — -Sandstein der Carnia und des Comelico. VII. 443. — — der nordöstlichen Alpen. III. b. 69, 81. — — (kohlenführender) von Steierdorf. VI. 234. Kibdelophan. VI. 33. Kies-Gänge im Leitmeritzer Erzgebirg. IX. 556. — — (goldhältige) der Trojaka. VI. 125. Kiesel-Concretionen im Jura. V. 688, 689, 692, 693. — — der Oberalmer Schichten. V. 596. — -Gestein des Lignits von Rein. IV. 434. — -Glimmerschiefer. VI. 889. — -Hölzer. VIII. 732. — -Kalk. IV. 389, 390; VI. 251. — — des Diluviums. IX. *V.* 153. — -Schiefer bei Eisenerz. V. 397. — — mit Klippenkalk. VI. 126. — — bei Radstadt. V. 811. — — (silurischer). VI. 598, 599; VII. 121. Kieselsäure (Ausscheidung der überschüssigen) im Trachyt-Porphyr. X. *V.* 47, 48. Klaus (Jura-)

Schichten der nordöstlichen Alpen. IV. 764, 765, 784. Klinochlor von Achmatowsk. V. 852. Klippenkalk in der Bukowina. VI. 110, 111, 113, 129, 130. — mit Karpathen-Sandstein. VI. 113. — mit Kieselschiefer. VI. 126. — der Nord-Karpathen. VI. 304, 305. — im nordöstlichen Ungarn. X. 415. — an der ungarisch-mährischen Grenze. IX. *V.* 94. — im Waag-Thale. X. *V.* 67, 68. — (Eisenerze im). VI. 129. Knochen-Breccie in Dalmatien. X. 341. — — in Istrien. IV. 228, 229. — -Höhle bei Agtelek. VII. 704. — — bei Fuschl. VIII. 789. — — von Pesterje-Zmeilor. III. d. 31; VIII. 815. — — bei Theissholz. IX. *V.* 147. Knollen-Gneiss. VII. 230; VIII. 521. — -Kalk. VI. 44, 119, 153, 157, 465. Knoten-Phyllit. VI. 686, 687; VIII. 14. Kobalts aus den reichen Joachimsthaler Erzen (Patera's Methode zur Gewinnung des). VI. 871. Kobalt-Manganerz. VII. 492. — -Nickelerz von Dobschau. I. 363; X. Anh. 26. — — von Leogang. Anal. I. 557; X. Anh. 26. Kössener Schichten der nordöstlichen Alpen. IV. 733, 784. — — von Enzesfeld. VI. 176, 177. — — bei Fünfkirchen. IX. *V.* 111. — — in Kärnthen. VII. 193, 336. — — des Lienzer Gebirgs. VII. 419. — — in der Lombardie. IX. 473, 474, 476, 477. — — im Salzburger Saale-Gebiet. V. 125. — — im Saroser Comitat. IX. V. 97. — — in Ungarn. X. 409, 410. — — in Vorarlberg und Nord-Tirol. X. 106. — — der Zugspitzwand. VII. 379. — — (Brachiopoden der). III. a. 180, 181. — — (Petrefacte der). IV. 735. Kohlen (fossile). Proben. X. Anh. 52. — -Ablagerungen in Dalmatien. II. d. 138, 139; III. a. 193; VI. 184. — — von Fohnsdorf. IV. 173, 176. — — in Istrien. II. d. 138; IV. 423, 547. — — vom Monte Promina. II. d. 139; III. c. 193; VI. 184. — — von Neudegg. VII. 842. — — der Trias in den nordöstlichen Alpen. III. b. 73. — — von Zillingdorf und Neufeld. II. d. 47. — -Bergbau von Grünbach. II. b. 113, 117. — — von Steierdorf, I. 708, 709, 713, 717; II. b. 167. — -Eisenstein der Grafschaft Mark. III. c. 133. — -Flötze von Carpano. IV. 423, 547, 550. — — der Grauwacke. V. 815. — — (Verhältniss der fossilen Flora zur Mächtigkeit der). III. a. 188. — -Gebirg von Hrastnigg. II. c. 11. — -Statistik (R. C. Taylor's Werk über). III. a. 104. — -Vorkommen in Krain und Küstenland. X. *V.* 49. Kohlensäure-Wässer (Einwirkung der) auf metallisches Eisen. X. *V.* 80. Korallen-Crags (Fauna des). IX. 601, 606, 621, 622 (Tabelle), 626. Kosmos (4. Band von Humboldt's). IX. *V.* 19, 20, 21. Krater (erloschener) von Aden am rothen Meer. III. a. 205. — — im Hodritscher Thal. I. 159. — — von Orgiof. IX. 1, 67. — — bei Pelsöcz. IX. *V.* 128. — — von Taïti und Taïarapu. X. 570, *V.* 188. — — bei Telkibánya. IX. *V.* 150. Krebsscheeren-Sandstein. V. 708, 709, 710, 713, 714, 742. Kreide (chloritische) der Nord-Karpathen. III. c. 141, 142; VI. 311, 312. — (mittlere) der Urschelau. IV. 335. — (obere) nördlich von Krakau. I. 242. — — der Lombardie. IX. 492, 494. — — der nordöstlichen Alpen. I. 42, 43. — im Waag-Thal. X. *V.* 76. — -Conglomerat. VIII. 221. — -Gebilde von Böhmisch-Aicha und Liebenau. IX. *V.* 91, 92. — — in Cattaro und Montenegro. X. *V.* 24, 25. — — von Friedeck. III. d. 33. — — in Galizien. X. *V.* 101, 102, 123, 127, 128, 129. — — um Idria. VII. 839. — — von Inner-Krain. X. *V.* 10. — — im Isonzo-Thal. IX. 331, 344, 353, 354, 359, 360. — — in Istrien. IV. 230, 231, 547, 549, 550. — — im Leitmeritzer Basalt-Gebiet. IX. 429, 430. 431. — — im Leitmeritzer Kreise. IX. *V.* 72, 81. — — von Limburg (van Binkhorst's Werk über die). X. *V.* 93. — — im mittlern Mähren. V. 699, 741, 742. — — in Mittel-Steiermark. VII. 220, 221. — — im nördlichen Böhmen. X. *V.* 60, 61, 84, 85, 96, 97, 113, 114, 115. — — in Nord-Steiermark. I. 110, 111. — — im nordöstlichen Kärnthen. VI. 188. — — im nordwestlichen Böhmen. VII. 326. — — im nordwestlichen Mähren. X. 230. — — in Ober-Krain. VIII. 220. — — in Ober-Oesterreich, Salzburg und Steiermark. IV. 170. — — im östlichen Kärnthen. VII. 335. — — der Quarnerischen Inseln. X. 85, 193. — — in den salzburgischen Alpen. V. 258. — — in Süd-Steiermark. VIII. 442. — — in Unter-Krain und Istrien. IX. 247, 274, 276, *V.* 69, 70; X. 295, 296, 298, 302, 326, 327, *V.* 117, 118, 193, 194. — — der Insel Veglia. X. *V.* 85. — — in Vorarlberg. VII. 7, 19, 38; VIII. 809, 810; X. 78. — — der Zugspitzwand. VII. 379. — — (Eisenerze führende). V. 734, 735. — — („Pietra forte") von Florenz. V. 228. — — (Senkung der) unter dem Spiegel des miocenen Meeres. X. *V.* 124. — -Kalk im Banat. VI. 246, 247, 253. — -Kohle mit Alaunschiefer. V. 733, 734. — — von Grünbach. II. b. 107. — — bei Lettowitz. IV. 62, 430; V. 720, 731, 732. — — im mittleren Mähren. V. 729, 730, 731, 733. — -Petrefacte aus Böhmen und Sachsen. VIII. 810, 811. — — aus Dalmatien. IV. 646, 647, 648. — -Pflanzen von Hohenstadt. IV. 185. — — von Niederschöna. III. d. 125. — -Sandstein im Banat. VI. 250, 251, 253. — — (oberer) in Mähren. V. 707. Kreuzschiefer von Deutsch-Bleiberg. VII. 78, 79. Krystalle des ausgeglühten Amalgamir-Silbers. I. 150. — organischer Säuren (Bewegung schwimmender). VI. 263. — (künstliche) des Dr. Böttger. IV. 417. — (Pleochroïsmus der). I. 158. Krystall-Episomorphismus. X. *V.* 184. — -Granit. VI. 17. — -Projection (Neumann-Miller'sche). VII. 378. — -Structur (Aufschliessung der) nach Professor Leydolt's Methode, V. 889. — -Verhältnisse des Glimmers. VI. 410. Krystallinisches Gebirg von Mautern und Mölk. III. a. 98; IV. 164, 264, 279. — -Gestein des Banates.

VI. 220, 227, 229. — — des Böhmerwaldes. IV. 8; V. 1, 4, 573, 579; VI. 10, 29, 753, 767, 774, 793, 800, 806. — — des böhmischen Fichtelgebirgs. VII. 517, 523. — — im Egerer Kreis. VII. 167, 496, 481, 487, 490; VIII. 5. — — von Hainburg. III. d. 37. — — der Hirschberger, Landsberger und Schwanberger Alpen. VII. 223, 237. — — bei Hüttenberg. VI. 620, 622, 625. — — in Kärnthen. VI. 510, 511, 515; VII. 630, 644. — — des Kaiserwaldes. VII. 496, 505, 509. — — im Klattauer und Prachiner Kreis. VI. 172. — — des künischen Gebirges. VI. 29. — — des Leitha- und Ruster-Gebirgs. III. d. 44, 53. — — im Leitmeritzer Basalt-Gebiet. IX. 430, 431. — — des Leitmeritzer Erzgebirgs. IX. 550. — — in Mittel-Böhmen. VI. 355, 363, 367, 403. — — in Nieder- und Ober-Oesterreich nördlich der Donau. III. c. 35, d. 37. — — im nordwestlichen Böhmen. VII. 318, 479. — — im nordwestlichen Ober-Oesterreich. IV. 232, 245. — — des nordwestlichen Riesen-Gebirgs. X. 370, 381, 384, 385, 388, *V.* 15. — — im Pilsener Kreis. V. 274; VI. 457, 484. — — von Ronsperg. VI. 177, 781. — — des Rosalien-Gebirgs und des Wechsels. IV. 174; V. 467. — — von Rumburg und Hainspach. X. 390, *V.* 16. — — des Saazer Erzgebirgs. VIII. 549. — — der Schneekoppe. X. 116, 117. — — in Siebenbürgen. X. *V.* 181. — — in Steiermark und Illyrien. V. 531, 539, — — im südlichen Böhmen. V. 565. — — im südlichen Mähren. IV. 55. — — im südwestlichen Böhmen. VI. 586, 588, 590. — — im südwestlichen Ober-Steiermark. V. 322. — — um Tabor. IX. 664, 679, 680. — — von Villach Radenthein und Krems-Alpe. V. 885. — — des Zipser und Gömörer Comitates. X. 538, *V.* 20. — -Massengestein im mährischen Gesenk. V. 97, 387. — — im östlichen Kärnthen. VII. 343, 365. — -Schiefer des Bacher-Gebirgs. X. 203. — — der Bukowina. VI. 105. — — der Central-Alpen. III. d. 63, 64; V. 767, 783, 821, 824, 829, 836, 841, 849; VII. 407, 409. — — des Enns-Thales. IV. 177, 461, 462. — — mit Granulit. V. 65. — — im mährischen Gesenk. V. 90. — — bei Marienbad. II. b. 10, 29. — — im Nieder-Oesterreich und Süd-Böhmen. III. a. 103. — — in Nord-Steiermark. I. 119; III. d. 61; IV. 848. — — im nordöstlichen Ungarn. X. 405, 406. — — im nordwestlichen Mähren. X. 221, 234. — — in Ober-Oesterreich, III. d. 74; IV. 234. — — im östlichen Kärnthen. VI. 194, 201, 414; VII. 341, 365. — — bei Rottenmann. VII. 40. — — des Saazer Erzgebirgs. VIII. 519, 539, 540, 543, 544, 565. — — im südlichen Salzburg. I. 602. — — in Süd-Steiermark. VIII. 272, 273, 287, 414, 415. — — von Turrach. IX. 186. Kugeln von Hornstein und Kalkstein in den Oberalmer (Jura-) Schichten. V. 596, 597 Anmerk. — (concentrisch-schalige) in den Adnether Schichten. V. 130. — — im Granit. VI. 375. Kupfer im Rothliegenden von Böhmen. III. b. 96; VI. 408; IX. 241, 243, 244, *V.* 57; X. 572. — (gediegenes) mit Epidot. IV. 413. — — mit gediegenem Silber. IV. 412. — — von Hromitz. VII. 608. — — am Obern See (Nord-Amerika). IV. 178, 406, 411, 414. — — von Réczk. I. 145. — -Actien in Nord-Amerika. VII. 790. — -Aufbereitung in Nord-Amerika. IV. 415; VII. 788 — Bergbau in Grasslitz. VIII. 48; X. 349, *V.* 89. — — im Saazer Erzgebirg. VIII. 593. — — in Serbien. II. b. 59. — — (alter) am Mitterberg. I. 197. — -Entsilberung durch Kochsalz. III. a. 201, 202, b. 166, 167. — -Erze, Anal. II. b. 174; III. a. 162, c. 156, d. 118; IX. 296, 504; X. Anh. 27. — — von Hohenelbe. X. 572. — — in Ober-Krain. III. b. 161; IV. 863; VIII. 385. — -Gewinnung (Hähner's Methode der). VII. 827. — -Glanz von Přibram. VI. 58. — -Kies im Egerer Gebirg. VIII. 61. — — von Přibram. VI. 55. — -Lager der Bukowina. VI. 119. — -Lasur von Přibram. VI. 51. — -Oxyde (antimoniale) von Rochlitz. X. 20. — -Oxyd-Silicat (wasserhältiges) von Rochlitz. X. 17. — -Probe (colorimetrische). I. 415, 562. — -Steines (hüttenmännische Behandlung des). IV. 623. — -Vorkommen in bituminösem Schiefer und Sandstein. IX. *V.* 46. — — in der Bukowina. V. 222. — — von Isle Royale (Nord-Amerika). IV. 411. — — von Minnesota (Nord-Amerika). IV. 406; VII. 771, 786, 787. — — am Obern See (Nord-Amerika. VII. 771, 783. — — von Rochlitz. IX. *V.* 91; X. 10, 13, 17, 19, 20. — — bei Tergove. VII. 848, 849. Kyanit im Granulit. VIII. 548. — im Quarzfels. VII. 231, 483. — im Tegelsand. IV. 277. — -Pseudomorphosen, Anal. I. 350, 358; X. Anh. 10, 11.

Labrador im Speckstein umgewandelt. IV. 161. — im Trachyt. IX. 69. — (Erzgänge im). VI. 125. — -Fels als Gang im Glimmerschiefer. VI. 127. Lager-Granit. VI. 377, 378, 380, 387. — -Schiefer von Deutsch-Bleiberg. VII. 74, 75, 79, 83, 84. Laubstreu, Anal. V. 870. Lava vom Aetna (Ausbrüche von 1852 und 1853). IV. 159; X. Anh. 11. — von erloschenen mährisch-schlesischen Vulcanen, Anal. IX. 71; X. Anh. 34. — von Telkibánya. IX. *V.* 150. Laven (magnetische Polarität der). VIII. 685, 689, 690. Lavatscher Schichten. VI. 896. Lavendulan. IV. 552, 555. Lazulit von Werfen. I. 167. Lecksalz für das Vieh, Anal. II. d. 140; III. d. 116; V. 640; X. Anh. 77, 78. Lehm, Anal. IV. 153; X. Anh. 37. — der tertiären Kohlenlager von Köflach. VII. 556. — (diluvialer) der Bukowina. X. *V.* 129. — — mit Eisensteinen in Unter-Krain. IX. 246, 247, 248, 249, *V.* 5. — — in Mittel-Steiermark. VII. 601, 602. — — in Süd-Steiermark. VIII. 458. — -Erze von Turrach. IX. 195, 199, 200. Leitha-Kalk mit Anthozoën. VII. 583, 584. — — von Dexenberg. VII. 589. — — im Drann-Thal. X. 219. — — am Eich-

kogel. X. 26, 28. — — mit Geschieben, Anal. VII. 157; X. Anh. 35. — — von Gleichenberg. VI. 291. — — von Grafendorf und Hartberg. V. 564, 565, 566. — — bei Hainburg. III. d. 39, 40. — — des Leitha- und Ruster-Gebirgs. III. d. 45, 53. — — im mittlern Mähren. V. 745, 752, 755, 757, 763, 765. — — in Mittel-Steiermark. VII. 538, 580, 590, 592, 593. — — mit Nulliporen. VII. 582. — — in Ober-Krain. VIII. 227, 231. — — bei Ofen. VIII. 320, 321, 325, 326. — — von Porstendorf. IV. 188. — — in quarziges Conglomerat übergehend. X. 183. — — in Steiermark. I. 347, 349; VII. 222. — — im südlichen Mähren. IV. 41. — — in Süd-Steiermark. VIII. 284, 285, 436; X. 172, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183. — — in Unter-Krain. IX. *V.* 9. — — im Viertel ob dem Mannhartsberg. III. d. 19, 20, 23. — — im Wiener Becken. I. 665, 666, 669, 674; II. d. 106, 120, 121; VIII. 373. — — von Wildon. VI. 351, 352; VII. 585. — — der Windischen Bühel. VI. 295, 296, 301, — — (mariner). VII. 222. — — (oolithischer). VI. 301, 302. — -Kalkes (Säugthier-Fauna des). IX. *V.* 160. Leithakalk-Conglomerat von Jauling. IV. 712. — -Petrefacte von Berchtoldsdorf. X. *V.* 33. Lepidolith (Darstellung des kohlensauren Lithions aus). VI. 882. Lettenkluft von Přibram. VI. 258. Lettenklüfte im Rothliegenden. IX. 242. Lettenkohle bei Bayreuth. IX. *V.* 160, 161. — um Weimar. IX. 159, 160. Lias der bayerischen Alpen zwischen Isar und Salzach. VIII. 147, 150. — der Carnia und des Comelico. VII. 455, 456. — Flysch und Trias. X. 117. — im Isonzo-Thal. IX. 341. — in Kärnthen, Krain und Görz. VII. 639, 640. — in Mittel-Ungarn. X. 490. — in Montenegro. X. *V.* 24, 25, 26. — der nordöstlichen Alpen. I. 39; III. b. 73; IV. 715, 729, 772, 773, 784. — im nordöstlichen Ungarn. X. *V.* 21. — mit Nummuliten-Kalk. VIII. 225. — in Ober-Krain. VIII. 218. — der österreichisch-bayerischen Alpen. IV. 381. — im östlichen und südöstlichen Kärnthen. VII. 193, 336. — in Siebenbürgen. X. *V.* 181, 182. — der Tarnthal-Köfel. IX. *V.* 120. — in Vorarlberg und Fürstenthum Liechtenstein. VIII. 796; X. 78, 81, 112. — der Zugspitzwand. VII. 379. — (Eisensteine im). VII. 804, 805. — (oberer) in der Lombardie. IX. 480. — (Petrefacte der rothen) der Karpathen. VI. 183. — (Spiriferen des alpinen). III. d, 139. — (unterer) in der Lombardie. IX. 473, 479. — Kalk mit Ammoniten. VI. 449. — — von Enzesfeld und Hirtenberg. II. c. 19. — — der nordöstlichen Alpen. III. b. 82. — — des Saal-Gebietes im Salzburgischen. V. 123. — — (grauer). IX. 485. — — (rother) mit Arieten. III. b. 83; IV. 384, 385, 745, 775; V. 130, 131, 132, 239. — — (schwarzer). III. d. 66; IV. 184. — — (unterer) am Randgebirg des Wiener Beckens. X. 259. — -Kohle von Fünfkirchen. III. d. 142; IV. 401; IX. *V.* 111; X. Anh. 63, — — von Guggerlung. I. 637. — — von Lilienfeld. I. 624, 625, 626. — — Proben. III. a. 162, c. 155; IV. 401; VII. 898; X. Anh. 55, 59, 64. — — von Steierdorf. I. 706, 707; III. a. 187, 192, b. 170; VI. 232, 235. — -Marmor (rother), IV. 384. — -Sandstein der nordöstlichen Alpen. III. b. 73. Liebenerit. IV. 147; X. Anh. 11. Lignit von Cehnitz. V. 315. — von Edelény. VII. 697; X. Anh. 62. — des Eger- und Falkenauer Beckens. VIII. 469, 471, 474, 502, 503, 504, 505. — des Hausruckwaldes (Traunthal). VII. 164, 174. — der Illyrischen Alpen. II. d. 140. — von Klein-Semmering. V. 559, 561. — von Kovatsi. VIII. 328, 329. — in Mittel-Kärnthen. VI. 416, 417, 562, 565, 566. — von Ober-Hart. V. 519, 521. — von Rein. IV. 433, 434. — des Schall-Thales. VIII. 448, 449. — in Unter-Krain. IX. 249. — von Zillingdorf und Neufeld. II. d. 47. Linarit. II. b. 78; III. a. 191. Lindackerit. IV. 552; X. Anh. 11. Literatur des Böhmerwaldes. VII. 150. — der Czjžek'schen Schriften und Karten. VI. 678, 679. — der Franzensbader Mineralquellen. VIII. 489 Anmerk. — über Gleichenberg. VI. 165, 266. — über magnetisch-polare Gesteine. VIII. 667, 668. — des Nagyáger Erzgebirges. VIII. 84. — über die nordöstlichen Alpen. I. 21. — (geologische) der Lombardie. IX. 446. — — des nordöstlichen Ungarns. X. 400. — (geologisch-bergmännische) über Niederländisch-Indien. IX. 281, 282. — -Uebersicht des österreichischen Kaiserstaates (Dr. v. Wurzbach's). VII. 183. Lithions aus Lepidolith (K. v. Hauer's Methode zur Gewinnung des). VI. 882. Lithodendron-Kalk. IV. 331, 347, 367, 368, 369, 378; V. 123; VII. 729, 730; X. 99. Lithographie-Steine bei Bassano. IV. 637. — — von Galignana. IX. *V.* 123. Lösch-Methode (Gurney'sche). III. d. 143. Löslichkeit der Salze bei höherer Temperatur (K. v. Hauer's Apparat zur Bestimmung der). VII. 186. Löss, Analysen. III. d. 118; X. Anh. 36. — in den Bieskiden und im Tatra. II. a. 76. — bei Inzersdorf. II. b. 83. — bei Lomnitz. IV. 709. — in Mittel-Ungarn. X. 489. — bei Mölk. IV. 275, 278. — bei Ofen. VIII. 331. — bei Passau. II. b. 189. — von Sebenstein mit Resten von Säugthieren. V. 227, 527, 528. — im südlichen Mähren. IV. 36, 37. — im Viertel ob dem Mannhartsberg. III. d. 18. — im westlichen Mähren. IX. 51; X. 231. — (Säugthiere aus dem Galizischen). X. *V.* 52. Löwe'it, Anal. VII. 605; X. Anh. 11. Luft-Temperatur im Salzkammergute. II. a. 139.

Maassen-Gebühren (Verordnung über). X. 578, 579. Macigno in Istrien. IV. 225, 227. — (Quecksilber führender). VI. 811. Magnesia (Gewinnung der) aus Dolomit. VI. 71. — (krystallisirte essigsaure). VI. 136. — (Scheidung der) von den feuerbeständigen Alkalien. IV. 863. Magnesit, Anal. III. a. 160, c. 154; IV. 830; V. 871; VI. 68, 830;

X. Anh. 11. — von Tragöss. VI. 68; VIII. 366. — -Glimmer vom Vesuv. VII. 822. — Spath von Gloggnitz. III. d. 145. Magnete (abgeänderte Construction temporärer). VIII. 292. Magnet-Eisenerz mit Asbest. VII. 588. — — in der Bukowina. VI. 118. — — im Egerer Gebirg. VIII. 62. — — magnetische Polarität. VIII. 678, 679. — — am Plankogel. V. 546. — — pseudomorph nach Glimmer. III. d. 31. — — mit Roth-Eisenerz in Amphibol-Gesteinen. VIII. 62, 63. — — in Roth-Eisenerz metamorphosirt. VIII. 65. — — im Saazer Erzgebirg. VIII. 587, 592. — — in Serbien. II. b. 63. — — im silurischen Thon. VI. 616. — — im Vellach-Thal. VI. 520. Magnetismus einfacher Gesteine und Felsarten. VIII. 649, 654, 660, 672, 673, 680, 681, 684, 686, 807. Magnetismus (polarer) des Frankensteiner Serpentins. VIII. 806. — — grösserer Felspartien. VIII. 691. — — von Schlacken. VIII. 690, 691, 697, 700. Magnetnadel (Abweichung der) durch elektrische Ströme in Bergwerken. VIII. 666, 667. Majolica (Neocom-Kalk) in der Lombardie. IX. 488, 489, 490. Malakolith mit Zirkon. V. 101. — -Gestein (erzführendes). IX. *V.* 91; X. 11, 12. Mangan-Erze, Anal. VIII. 616; IX. 295. — — aus dem Banat. VII. 609. — — im Egerer Gebirg. VIII. 70. — -Salze (essigsaure). VI. 189. Manuscripte aus dem Nachlass des Dr. Stolz zu Teplitz. VII. 842, 843. Maria-Theresien-Ordens (Dr. Hirtenfeld's Geschichte des k. k. Militär-). X. *V.* 2. Markscheidekunst (Beer's „Lehrbuch" der). VII. 840. Marmor von Hallstatt. II. c. 167, 168. — von Hörnstein. II. c. 29. — in Nassau. IV. 58. — in Oesterreich. II. a. 89. — von Porto-Venere. VIII. 364. — der Insel Veglia. X. *V.* 99. — (künstlicher) aus der Cristofoli'schen Fabrik zu Padua. VII. 757, 758. — (rother) von Adneth. II. c. 113, d. 136. 137; IV. 745. — — der bayerischen Alpen. VIII. 147. — — des Fersina-Thales. VIII. 307. — — des Lias. IV. 384; V. 130, 131; IX. 481, 482, 484. — — von Mogyoros. X. 491. — — des obern Jura. IV. 327, 333, 349, 360, 363, 364; V. 133, 134; VII. 732. — (Wiener künstlicher). VII. 375. Martit. III. c. 130, 131. Maschinenwesen (Erfahrungen über das berg- und hüttenmännische). III. d. 131. Massengesteine, magnetische Polarität. VIII. 680, 681. Medaille (Haidinger-). VII. *V.* — der Pariser Ausstellung für die k. k. geologische Reichsanstalt. VII. 182. Meeres (Vorrücken des) gegen die Inselkette der Nordsee. IX. *V.* 105. — -Bodens (Erhebung des) am Schluss der Miocen-Periode. IX. 587, 623, 624, 627. — -Diluvium der ungarischen Ebene. X. 459. — -Einbruch in der Süsswasser-Region des Wiener Beckens. IX. *V.* 101. — -Fauna des Aegeischen Meeres. IX. 625. — — des Atlantischen Oceans. IX. 615. — — der Britischen Inseln. IX. 594, 595, 596, 597, 598, 599, 613, 621, 633. — — (glaciale). IX. 636. — — (Tiefen-Zonen der). IX. 607, 609, 610, 612. — -Flora der Britischen Inseln. IX. 593. — -Gebilde (neogene) in Unter-Krain. IX. 374, 377. — -Gestade (gehobene) der historischen Periode. IX. 631. — -Molasse in Bayern. VI. 434, 435. Meerschaum, Anal. VII. 158; X. Anh. 11. Megalodus-Kalk von Bleiberg. VII. 73. — — im Lech-Thal. VII. 12, 13. — — der nordöstlichen Alpen. IV. 777. Melaphyr. Magnetisches Verhalten. VIII. 683. — im Rothliegenden des nordöstlichen Böhmens. VIII. 706, 707, 708; IX. *V.* 45. — zwischen Ur-Thonschiefer und Quader. X. *V.* 115. — (alpiner) mit Zeolithen. VII. 30. Mendola-Dolomit. X. 82, 83, 87. Menilit, Anal. IV. 828; X. Anh. 11. — -Schiefer im Mähren. IX. 50, 104, 127. — — von Sierning. X. *V.* 37. Mennig (natürlicher) von Rochlitz. X. 21. Menschenschädel von Hallstatt. I. 353. Mergel, Analysen. III. b. 156; IV. 831; V. 191, 193; VII. 153; VIII. 810; X. Anh. 33, 35, 37, 40, 42. — der Algäu-Schichten. X. 110. — der Kreide im Banat. VI. 251. — im Rells-Thal. X. 118. — von St. Cassian. VI. 893. — (eocene) Eisenerze und Kohle führend. X. 207. — — mit Kalkknollen. IX. 119. — in Nieder-Oesterreich. IX. 105, 106, 108, 129, 130, 133. — — deren Schichtenfaltung. X. 331. — (hydraulischer), Anal. III. a. 161; VIII. 757; X. Anh. 42, 43. — (tertiärer) von Lomnitz. IV. 709. — — bei Mölk, Mautern und St. Pölten. IV. 274, 283. — — des Süsswassers im Egerland. VIII. 477, 478, 479. — (triassischer) bei Trient. VIII. 298, 299. — -Concretionen in Siebenbürgen. IV. 175. Metalle (Verdichtung der beim Erzrösten verflüchtigten). V. 431, 432. — (Prof. Zippe's „Geschichte der"). VIII. 791. Metamorphose der Eocen-Gesteine (nach Morlot). VIII. 405, 448, 449. — von Gneiss in Thon- und Kalkthon-Schiefer. V. 779. — der Guttensteiner Kalke. VII. 718. — der Hüttenberger Eisenerze. VI. 647. — des Magnet-Eisenerzes in Roth-Eisenerz. VIII. 65. — von Spath-Eisenstein in Braun-Eisenstein. V. 183, 189; IX. 253, 255. — (katogene) des Amphibols in Serpentin. V. 41, 777. Meteorit von Bohumilitz. V. 316. — von Kakowa. IX. *V.* 110. Meteor-Eisens (krystallinische Structur des). V. 866. Mikroskop (einfaches Hand-) mit Flüssigkeits-Linse. VII. 97. Milch-Opal, Anal. IV. 397; X. Anh. 12. Minen-Zündung durch Reibungs-Elektricität (Freih. v. Ebner's Apparat zur). VII. 828. Mineralien aus dem Banat. IV. 402; VII. 607, 611. — aus dem Bayerischen und Neuburger Wald. II. d. 144. — aus dem Böhmerwald. V. 194. — aus der Bukowina. X. 353, 354. — der Central-Alpen. V. 780. — von Felső-Bánya. VI. 408. — aus dem Fleimser Thal und von Monzoni. II. c. 163. — von Gastein. V. 429. — vom Harz. IV. 168; VI. 165. — von Joachimsthal. IV. 220; VIII. 369. — von Kapnik. IV. 834. — von Kitzbüchl. I. 556, 557.

— von Krumbach. I. 358. — des Nagyáger Erz-Reviers. VIII. 122. — aus dem nördlichen Böhmen. VII. 166. — aus Nord-Deutschland. II. d. 143. — von Passau. IV. 837. — von Přibram. II. d. 135; III. c. 156; VI. 46; X. *V.* 176. — aus den Rheinlanden. IV. 647; V. 643. — aus dem sächsischen Erzgebirg. V. 433, 435, 644, 894, 896; VI. 884, 885. — von Schemnitz. IV. 183. — secundärer Bildung im Trachyt. IX. 75, 76. — im Serpentin des mährischen Gesenkes. V. 101, 102. — im Serpentin des Zdjar-Berges. X. 228. — aus Süd-Amerika. IX. *V.* 54. — aus dem Thüringer Wald. VII. 811. — aus Tirol. III. b. 158. — aus Toscana. V. 430. — im Trachyt. IX. 69, 76. — (Aufschliessung der) durch Salzsäure in der Hitze und unter hohem Druck. IV. 186. — (Autotypie quarzhältiger). II. b. 124. — (nutzbare) um Turrach. IX. 226. — (polarer Magnetismus einfacher). VIII. 673, 674. — (Verhältniss der Härte, des Atomgewichts und des specifischen Gewichts bei isomorphen). III. d. 104. — (Zusammensetzung einiger) mit Rücksicht auf ihren Wassergehalt. V. 67. — -Sammlung des Gratzer Joanneums (Prof. Aichhorn's Beschreibung der). VII. 185. — des MR. Ritter v. Lill. X. *V.* 176, 177. — — Seiner kaiserl. Hoheit des Herrn Erzherzog Stephan zu Schloss Schaumburg. VIII. 608. Mineralmoor von Franzensbad. VIII. 489. — von Marienbad. IV. 401, 418, 419; X. Anh. 70. Mineralogie Russland's (v. Kokscharow's „Materialien zur"). VIII. 773. — (Prof. Dana's „System der"). VI. 173. — (P. Fellöcker's „Anfangsgründe der"). II. d. 158. — (Prof. Kenngott's „Berichte über Forschungen in der"). III. a. 179, d. 147; VI. 409, 410. — (Lettsom's und Greg's Handbuch der) von Grossbritannien und Irland. IX. *V.* 66. — (Section für) bei der Naturforscher-Versammlung zu Gotha 1851. III. a. 153. — (v. Zepharovich's Handbuch der Oesterreichischen topographischen). VI. 885; IX. *V.* 124. Mineralquellen von Bartfeld. IX. *V.* 132, 144. — von Bikszád. X. *V.* 89. — im Egerland. VIII. 488. — von Einöd, V. 353. — von Franzensbad. VIII. 489, 490. — von Hengsberg. VII. 566. — im Honther Comitat. IX. *V.* 152. — von Jamnica (Pisarovina). VII. 201. — von Ivanda. IV. 700, 703; X Anh. 68, 69. — von Karlsbad. VI. 90, 91; VII. 202, 203. — von Kondrau. IX, 297; X. Anh. 74. — von Krapina-Teplitz. VIII. 805, 806; IX. 229, 277; X. Anh. 70. — von Luhatschowitz. IV. 194, 683; X. Anh. 71. — von Mauer bei Wien. VIII. 154; X. Anh. 72. — von Mehadia. II. a. 151, b. 93, 99; X. Anh. 69. — von Monfalcone. IX. 497, *V.* 99, 121; X. Anh. 73. — im Neutraër Comitat. IX. *V.* 113. — im nördlichen Ungarn. IX. *V.* 132. — in Nord-Steiermark. I. 120. — von Pirawart. IV. 425. — von Püllna und Saidschitz. IX. 442. — von Roggendorff. IV. 154; X. Anh. 73. — von Rohitsch. IV. 148; VI. 39, 165; X. Anh. 72. — im Saazer Becken und in der Teplitzer Bucht. IX. 535. — von St. Stefano. IX. 689, *V.* 100, 121, 127; X. Anh. 71. — von See Palic. VII. 361; X. Anh. 69. — von Stubitza. VII. 603; X. Anh. 70. — in Süd-Steiermark. VIII. 460. — von Szt.-Iván. X. *V.* 36. — von Szliács. VI. 314; X. Anh. 73. — von Teplitz in Böhmen. IX. 432. — von Töplitz in Mähren. VIII. 763. — von Trentschin-Töplitz. IX. *V.* 132; X. 1. — in Unter-Steiermark. X. 199. — von Warasdin-Töplitz. III. d. 16; IX. 165, *V.* 68; X. Anh. 10. — bei Wildon. VII. 595, 596. Miocenes um Gran. IV. 403, 405. — der Hegyallya. X. 442. — bei Nagybánya und Kapnik. X. 457. — in Nord-Steiermark. I. 104. — der Nord-Karpathen. III. c. 145, 146. — im nordöstlichen Ungarn. X. 438, 448, 450. — in Ober-Krain. I. 392. — von Radoboj. I. 275, 364, 365; II. a. 141. — im südlichen Mähren. IV. 37. — im südwestlichen Frankreich. I. 589, 591, 592, 597, 598. — des Tarviser Thales. I. 261, 262. — am Vihorlat-Gutin-Zug. X. 450. — in der Wochein. I. 394. Miocen-Becken von Eperies. X. 439. — — von Gönez und Telkibánya. X. 442. — — der Marmaros. X. 457. — — von Rank. X. 441. Miocen-Flora von Erdöbenye und Talya. II. b. 178; V. 202. — — von Erlau. V. 211. — — von Heiligenkreuz bei Kremnitz. V. 229, 230. — — von Sagor. II. b. 185, 186, 188. — — von Tokaj. V. 202. — — im Venetianischen. IV. 114. — -Kohle von Monte Promina. II. d. 139. — -Meeres (Verbreitung des) in den nordöstlichen Alpen. I. 365. — -Sandstein der Radstädter Tauern. V. 815, 816. Mittelgebirg der östlichen Alpen. III. b. 59. Mönchkolben-Hub- und Druck-Pumpe (einachsige). I. 93. Molasse bei Eisenerz. V. 405. — bei Nagyág. VIII. 111 Anmerk., 713. — in Nord-Steiermark. I. 104. — der österreichisch-bayerischen Alpen. II. a. 3. — bei Passau. II. b. 189. — im südlichen Bayern. VI. 433, 434, 439, 440. — bei Warasdin-Teplitz. III. d. 14, 15. Molassen-Flora der Schweitz. IX. 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548. — -Petrefacte von Passau. II. b. 189, 190. Molasses ossifères. I. 593. Mollusken des Wiener Beckens (Dr. Hörnes's Werk über die fossilen). I. 373; II. a. 150, d. 93; III. b. 166, d. 135; IV. 165, 166, 851; VI. 178, 863; VII. 188, 820, 833; VIII. 372; X. *V.* 174. Monotis-Kalk. X. 85. Moorkohle, Bernstein einschliessend. V. 198. — des Eger-Falkenauer Beckens. VIII. 409, 470. — von Lettowitz. IV. 67; V. 731, 732. Mühlstein-Porphyr. X. *V.* 36. Mulden-Thäler der Hoch-Alpen. II. b. 35. Muschelkalk der Carnia und des Comelico. VII. 442, 454. — in Galizien. X. *V.* 101. — der Guttensteiner Schichten. IV. 722. — am Iseo-See. VI. 892, 896. — des Lienzer Gebirgs. VII. 417. — in der Lombardie. IX. 462, 465. — bei Reutte. VIII. 801; IX. *V.* 16. — bei Trient. VIII. 297. — um Weimar. IX. 158. — (oberer) von Hörnstein. I. 619.

— — der nordöstlichen Alpen. I. 36; IV. 723, 772. — (unterer) der nordöstlichen Alpen. I. 37, 38. — — bei Raibl. I. 257, 258. — -Petrefacte der südlichen Alpen. VIII. 166, 167. Muschel-Keuper. IX. V. 161. — -Marmor des Eipelgrabens. IV. 95. — — in Kärnthen. V. 212, 213. — — des Lavatsch Thales. VI. 343. Museen zu Hermannstadt. X. V. 87. Museum zu Eichstädt. VI. 869. — der k. k. geologischen Reichsanstalt. I. 153; X. V. 154. — zu Klagenfurt. VI. 743. — der Novara-Expedition. VIII. 799. — zu Udine. VI. 743. — für vergleichende Anatomie zu Wien. III. a. 190. — zu Warschau. IV. 857. — (Hohenegger's) zu Teschen. X. V. 86. — (paläo-ichnologisches) zu Amherst in Nord-Amerika. X. V. 189. — (paläontologisches) zu Krakau. X. V. 86. — (städtisches) zu Mailand. VIII. 172, 173. — — zu Roveredo. VIII. 774. — (A. und J. B. Villa's) zu Mailand. VII. 763. Muthungen (Verbot bedingter Annahme von). IV. 197.

Nadel-Eisenerz. Magnetisches Verhalten. VIII. 677. — — pseudomorph nach Schwerspath. VI. 65, 63. Naphtha in West-Galizien. X. V. 183. Natron (Anwendung des unter-schwefligsauren) zur Silber-Extraction. IV. 544. — -Feldspath des Gleichenberger Trachytes. VI. 269. Natur-Selbstdruck. IV. 859, 860. Nekrolog des Freiherrn v. Augustin. X. V. 41, 42. — L. v. Buch's. IV. 189, 190, 207. — Joh. Čžjžek's. VI. 665, 857, 858. — A. Dumont's. VIII. 175. — J. Heckel's. VIII. 173. — V. v. Helmreichen's. III. b. 163. — Joh. Kudernatsch's. VII. 375, 376. — M. Layer's. III. a. 1. — des Fürsten Alois Liechtenstein. IX. V. 125. — des Fürsten v. Metternich. X. V. 83. — Jos. Poppelack's. X. V. 42. — des Freiherrn v. Reden. VIII. 811. — G. Rösler's. VIII. 158, 159. — Chr. S. Weiss'. VII. 815. 816. Neocom der Alpen. III. b. 47, 48. — der bayerisch-österreichischen Alpen. IV. 339, 358, 360, 390; VIII. 150. — im Enns-Thal. IV. 477. — der Lombardie. IX. 487. — am Nord-Abhang der östlichen Alpen. I. 49, 50, 60. — der nordöstlichen Tiroler Kalk-Alpen. VII. 727. — der Nord-Karpathen. III. c. 136, 139; VI. 310.. — der nordwestlichen Karpathen. X. V. 46, 47. — der Salzburger Alpen. II. c. 119. — des Tulbinger Kogels. IX. 133. — in Vorarlberg und nordwestlichen Tirol. VII. 1, 3, 4, 22, 23, 25, 38. — im westlichen Mähren. IX. 42. — -Kalk im nordöstlichen Ungarn. X. 416. — -Petrefacte in Galizien. VI. 309. — -Wiener-Sandstein. IX. 133, V. 144; X. 263. Neogenes im Bacher-Gebirg. X. 205. — des Drann-Thales. X. 215, 216, 217. — bei Edelény. VII. 694, 699, 705. — am Eichkogel. X. 26, 28. — im Isonzo-Thal. IX. 355. — zwischen Kor-Alpe und Sausal. VIII. 282, 287. — in Mittel-Ungarn. X. 490, 491, 492, 496, 497, 498, 502, 506. — im nördlichen Böhmen. X. V. 62, 63. — in Ober Krain. VIII. 226, 228. — im östlichen Kärnthen. VII. 334. — um Ofen. VIII. 319, 320. — in Süd-Steiermark. VIII. 451. — von Tinnye. X. 567, 568, 569. — in Unter-Krain. IX. 366, 374, 382, 383, 385, 396, V. 8, 49. Neogen-Ablagerungen von Kalamaki. VII. 173. — — in dem nordöstlichen Alpen-Gebiet. VII. 383, 384. — -Kohle von Leiding. V. 524 — -Petrefacte bei Ofen. VIII. 321, 323. — — von Unter-Krain. IX. 378, 379, 380, V. 8, 9. — -Sand (gelber). VIII. 320, 322, 323; X. V. 48. — — (trachytischer). X. 510. — -Tegel. IX. 109; X. 26, 28, 508, 511, 512, 568, 569. Neolith. X. 19. Nerineen-Gesteine in Frankreich und der Schweiz. II. c. 47. — — der Nord-Karpathen. III. c. 136. Nester-Granit. VII. 319. Nickel, Anal. VI. 851, 875; X. Anh. 31. — -Bergbau von Leogang. V. 148. — -Erze, Anal. I. 557; IV. 400; X. Anh. 28. — — von Leogang. V. 159, 437, 438. — -Gewinnung aus den reichen Joachimsthaler Erzen. VI. 871. — -Speise, Anal. IV. 400; X. Anh. 31. Nigrin. VI. 794. Niveau-Verhältnisse des Přibramer Bergbaues. VII. 177. Novara-Museum. VIII. 799. Nulliporen-Kalk in Galizien. X. V. 128, 129. — — mit hohlen Geschieben. VI. 653. — — bei Lemberg. X. V. 104. — — in Mittel-Steiermark. VII. 582. — — in Steiermark. I. 348, 349. — — im Wiener Becken. I. 665. Nummuliten-Dolomit. X. 495, 496, 505, 507. — -Flysch. VII. 36. — -Gebilde der bayerisch-österreichischen Alpen. II. a. 9. — — von Carpano. IV. 547. — — von Cattaro. X. V. 24, 25. — — in Dalmatien. III. a. 192, 193; IV. 157. — — in Istrien. IV. 226, 230, 231, 546. — — von Montenegro. X. V. 24. — — am Nord-Abhang der östlichen Alpen. I. 51, 60. — — der Nord-Karpathen. III. c. 143, 144. — — in Oesterreich und Salzburg. IX. 111, 118. — — des Tschitscher Landes. X. V. 8, 9, 38. — in Vorarlberg und nordwestlichen Tirol. VII. 15, 22, 23, 25, 39. — — im Waag-Thal. X. V. 78. — -Kalk der Bukowina. VI. 111, 112. — — in Illyrien. IV. 116, 117. — — im Küstenland. IV. 157. — — auf Lias-Kalk. VIII. 225. — — um Ofen. VIII. 313, 314, 315, 329. — — des Poik-Gebietes. X. 282, 283, 284. — — der Recca-Mulde. X. 302, 314, 318, 319, 323, 324. — — der Salzburger Alpen. II. c. 118. — — des Wipbach-Gebietes. X. 293, 295, 296, 297. — -Petrefacte. IX. 114, 116, 117, 120, 121; X. 282, 283, 293, 294, 295, 337. — -Polyparien. II. a. 162, 163. — -Sandstein des Birnbaumer Waldes. IX. 359. — — im südlichen Mähren. IV. 51. — — im Viertel unter dem Mannhartsberg. III. d. 22. — — bei Wien. X. 269, 270. — -Schichten des Liburnischen Karstes. X. 333, 336, 337, 344. — — in Mittel-Ungarn. X. 490, 492, 495, 496, 498, 502, 506. — — (gefaltete). X. 331, V. 38. — — (Störungen

der). X. 225, 326, 327, 328, 330, 331. — -Zone und Rudisten-Schichten (Grenze zwischen). X. 317, 326, 327, *V.* 100.

Oberalm-Schichten. V. 593, 595, 597. Oberflächen-Veränderung fester Kalksteine. II. a. 164. Oele auf der Oberfläche der Flüsse (Vorkommen fetter). VII. 95. Okenit, Anal. V. 190; X. Anh. 12. Oker, Analysen. VI. 880, 881. Oligocen-Gebilde des Egerlandes und der Gegend von Falkenau. VIII. 509. — — des Leitmeritzer Mittelgebirgs. IX. 428. — -Petrefacte v. Sternberg. VII. 839, 840. Oligoklas, Anal. IV. 830; X. Anh. 12. — im Granitit. X. 371, *V.* 15. — im Trachyt. IX. 69, 73. — -Amphibolit. VI. 387; VII. 499. Olivin-Basalt im nördlichen Böhmen. VII. 330; VIII. 73, 74; IX. 404, 407, 409, 410, 434. — -Kugeln von Gleichenberg. VI. 280, 281, 283. Oolith am nördl. Abhang der östlichen Alpen. I. 40, 59, 60. — -Flora (Freih. de Zigno's Werk über die). VIII. 790, 791; X. *V.* 1. — -Kalkstein in Krain. IX. 353. — — von Mogyoros. X. 491. — — von Trient. VII. 836; VIII. 302, 303, 304. Opal der Hegyallya. X. 447, 456. — im Serpentin von Goldenkron. V. 26. — (grüner). VI. 96. — -Gestein bei Gleichenberg. VI. 267, 271. — -Gruben von Czerwenitza (Vörösvagas). VIII. 176. Ophicalcit. V. 55; IX. *V.* 120, 121. Orbituliten-Kalk im Banat. VI. 223, 249. — — der Recca-Mulde. X. 319. — -Kreide. IV. 339. Orographie des Bacher-Gebirgs. VIII. 271. — des Beczwa-Gebietes. IX. 20, *V.* 42, 43. — des Böhmerwaldes. VI. 10, 30, 751, 754, 757, 761, 765, 778, 793, 800; VII. 135, 148, 480. — des böhmischen Fichtelgebirgs. VII. 514, 515. — des böhmischen Riesengebirgs. X. 365. — der Carnia und des Comelico. VII. 433. — der Central-Alpen zwischen dem Hoch-Golling und dem Venediger. V. 818, 819. — — — in Ober-Pinzgau. V. 781, 794. — des Drann-Thales. V. 200, 201. — des Egerer Kreises. VII. 480, 481; VIII. 1, 2. — des Enns-Thales. IV. 481, 482. — des Gross-Glockners. VI. 815. — der Hirschegger, Landsberger und Schwanberger Alpen. VII. 223. — des Iser-Gebirgs. X. 369, 370. — des Isonzo-Thales. IX. 325, 326, 327. — des Kaiserwaldes. VII. 494, 495. — der Kalk-Alpen im Süden der Save. VII. 679, 680. — des Leobel- und Kanker-Thales. VII. 663, 664. — des Liburnischen Karstes. X. 333, 334, 335, 336, 343, 344. — der lombardischen Schichtgebirge. IX. 453, 454. — von Mittel-Böhmen. VI. 363, 365, 386, 387. — des mittel-steiermärkischen Tertiär-Gebiets. VII. 540. — von Mittel-Ungarn. X. 484, 485, 487, 489, 490. — des Nagyáger Gebietes. VIII. 86, 87, 95, 113, 712, 722, 723. — des nordwestlichen Mährens. X. 220, 235. — von Ober-Krain. VIII. 205, 206. — des Pilsener Kreises. VI. 454. — des Poik-Gebietes. X. 276. — von Přibram. VI. 254. — der Recca-Mulde. X. 299, 301, 302, 304, 305, 308, 309. — von Ronsperg. VI. 781, 782. — des Rosalien-Gebirgs. V. 465. — des Saazer Erzgebirgs. VIII. 516. — des Sausals. VII. 242, 243. — des Seeländer Beckens. VII. 669, 670. — der Siebenberge. VI. 800. — der südlichen Steiermark. VIII. 267, 268. — des südwestlichen Böhmens. VI. 582. — der Sulzbacher Alpen. VII. 169, 170; VIII. 408, 410. — der Taborer Gegend. IX. 662, 673. — von Unter-Krain. IX. 259, 367, 368. — von Unter-Steiermark. X. 158. — des Ur-Thonschiefer-Gebiets in Böhmen. VI. 684, 701, 702, 717. — von Vorarlberg und dem nordwestlichen Tirol. X. 74, 76, 77. — des westlichen Mährens. IX. 53. — des Windischen Bühel. VI. 295. — des Wipbach-Gebietes. X. 288, 289, 291. — des Zips und des Gömörer Comitates. X. 563. Orthoklas im Granitit. X. 371, *V.* 15. — -Gneiss. VI. 709. — -Granit. V. 307; VI. 369, 370, 378, 381; VII. 497; X. 376, 377. — -Sandstein. IV. 189. Oxford-Gruppe zwischen Höll- und Pech-Graben. I. 634, 635, 642. — -Kalk des Höllen- und Pechgrabens. I. 634, 635. — — am Luciensteig. X. 129. — -Thon am nördlichen Abhang der östlichen Alpen. I. 41, 60. Ozokerit von Boryslaw. VI. 653; VII. 610. — im Karpathen-Sandstein. VI. 101.

Pachycardia-Schichten. IX. 360. Pässe des Böhmerwaldes. VII. 148. Palaeontographica (H. v. Meyer's). VI. 865; IX. *V.* 106. Paläontographie von Oesterreich" (v. Hauer's „Beiträge zur). IX. *V.* 75, 76, 137. Palagonit. VI. 277. — -Tuff. VI. 278. Panorama des Gross-Glockner's. VI. 833, 834. — des Rittner Hornes. IX. *V.* 15. — des Schafbergs. I. 374. Paraffin aus Holzessig. III. b. 36. Paramorphosen aus Norwegen. VI. 884. Partnach-Schichten. IX. 474, *V.* 16; X. 23, 95, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 130, 131. Partschin, Anal. X. Anh. 12. Paterait. VII. 195, 196. Pech-Eisenstein. VI. 97. Pegmatit im Glimmerschiefer. VI. 781. — in körnigem Kalk. IX. 682. — im Lager-Granit. VI. 380. — in Phyllit. IX. 684, 685. — von Ronsperg. VI. 177, 789, 790. — mit Turmalin und Granat. IX. 687. Pegmatit-Gneiss. VI. 512. — -Granit. VI. 381. Perlstein-Porphyr. X. *V.* 36. Petrefacte von Adneth. VIII. 156. — von Agordo. I. 167, 168; VIII. 157. — der Amaltheen-Mergel. IV. 381, 382. — aus dem Banat. VII. 844. — der Braunkohle in Nord-Ungarn. X. *V.* 65. — der Cerithien-Schichten (Polymorphismus der). X. *V.* 175. — von Dalmatien. III. a. 193, 194; IV. 646, 647. — des Diphya-Kalkes. VIII. 301. — der Dürrn- und Klaus-Alpe. III. a. 184. — des Flysch. VII. 10. — der Gailthaler Schichten. VII. 340. — des Gervillien-Kalkes. IV. 371, 372; VI. 448. — von Girgenti. V. 218. — der Gosau-Schichten. IX. *V.* 75. — von Gran und Umgegend. IV. 405. — von Grossau. II. b. 155. — von Grund. I. 362. — vom Haller Salzberg. VI. 349. — des

Jura und der Trias aus Elsass und den Vogesen. II. b. 144, 145. — des Klippenkalkes. VI. 305; X. *V.* 68. — der Kolimer Hügel. III. a. 167. — der Krainer Molasse. II. b. 189, 190. — der Kreide im nördl. Böhmen. VII. 327; IX. *V.* 73. — — in Sachsen und Böhmen. VIII. 810, 811. — — im Waag-Thal. X. *V.* 76, 77. — des Lagerschiefers von Bleiberg. VII. 84. — des Leitha-Kalkes. V. 565; VI. 351, 352; VIII. 227, 326; IX. *V.* 160. — — aus der Lombardie. VII. 607. — der lombardischen obern Trias. IX. 139. — von Lomniczka. II. d. 152; IV. 703. — von Malomeritz. III. a. 147, d. 77. — der Molasse im südlichen Bayern. VI. 435, 438. — des Neocoms. VI. 309, 310, 311. — aus Nord-Deutschland. II. b. 156. — der Nummuliten-Gesteine. IX. 114, 116, 117, 120, 121. — aus Ober-Oesterreich. I. 162. — des Oolith-Kalkes. VIII. 304. — von Passau. II. b. 189. — von Pirawart. IV. 426, 427. — des Quaders und der Kreide im Dresdener Museum. X. *V.* 178. — der Raibler Schichten im Keuper von Bayreuth. IX. *V.* 160, 161. — des Rheinischen Schichten-Systems in Nassau (G. und Fr. Sandberger's Werk über die). VII. 386, 387. — von Rosenau. VI. 405. — der St. Cassian-Schichten. IX. 141. — des Sternberger Gesteines. VII. 839, 840. — der Stramberger Schichten. VI. 306. — des Tegels. VI. 353, 354; VIII. 321; X. 504, *V.* 33. — aus Tirol. I. 165. — des Trias-Dolomites. VIII. 158, 159. — des untern Quaders. VIII. 157. — der Werfener Schichten. VIII. 213. — aus dem Zechstein des Thüringerwaldes. VII. 812. — (Adnether) des Achen-Thales. VII. 733. — (Gailthaler). IX. *V.* 59. — (Hallstätter). I. 154. — (A. v. Humboldt's und Degenhart's Werk über amerikanische). IV. 843. — (jurassische) in Mittel-Mähren. V. 695, 696. — — im nordöstlichen Ungarn. X. 411, 413, 415. — (Kreide- und eocene) aus Kärnthen. VI. 187. — (liassische) im nordöstlichen Ungarn. X. *V.* 22, 23. — — vom Randgebirg des Wiener Beckens. X. 259, 260. — (neocome) der nordwestlichen Karpathen. X. *V.* 46, 47. — (neogene) von Speising. X. *V.* 48, 49. — — in Unter-Krain. IX. 379, 380, 382, 383, 385, 396. — (nummulitische) von Unter-Krain. X. 282, 283, 293, 294, 295. — (silurische). VI. 610, 611; VII. 162. — — von Rokitzan. VII. 355, 357. — (tertiäre). um Belgrad. V. 891, 892. — — von Csurgo. VIII. 185. — — bei Fantsch. VII. 576. — — von Hirzenbüchel. VII. 565. — — von Imola. IV. 181, 182. — — beim Kreuz-Peter. VII. 575. — — zwischen Lassnitz und Glainz. VII. 571, 572. — — von Mährisch-Trübau. IX. 188. — — in Mittel-Mähren. V. 747, 748, 749, 750, 752, 753, 755, 757, 759, 761, 762. — — von Nemesey. IV. 192, 193. — — von Raussnitz. V. 210. — — von Reps. X. *V.* 191. — — von Steinabrunn. IV. 638; IX. *V.* 67. — — von Stuhlweissenburg. VII. 814. — — im Waag-Thal. X. *V.* 78. — — von Waldschach. VII. 576, 577. — — des Wiener Beckens. I. 662; III. a. 221; VII. 353, 364; X. *V.* 175. — (triassische) im Isonzo-Thal. IX. 335, 337. Petrefacten-Sammlung Seiner Excellenz J. Ritter v. Hauer. II. a. 142. — — Bergmeister Ramsauer's. II. b. 148, 149. Pfahl (Quarzzug) des Böhmerwaldes, VI. 768, 769. Pflanzen der Basalt-Tuffe. IX. 403. — der Braunkohle von Häring. I. 557; II. d. 159, 160; IV. 849. — — von Heiligenkreuz bei Kremnitz. III. d. 127, 128; V. 230. — des Bunt-Sandsteins der Vogesen. II. b. 145. — der Gosau-Schichten bei Aigen. IV. 168, 169. — der Liaskohle von Steierdorf. I. 357. — des Pilsener Steinkohlen-Beckens. VII. 264, 265. — des Quader-Sandsteines. IV. 185. — im Roth-Sandstein. VI. 102. — der Steinkohle im Badischen. VIII. 350. — — von Mährisch-Ostrau. III. d. 119; IV. 435. — — von Radnitz und Stradonitz. III. d. 123, 129. — — in Sachsen. VI. 407. — der Tertiär-Becken (tabellarische Uebersicht der). IX. 542. — des Wealden-Thones. II. b. 156. — (fossile) von Brennberg. IV. 638. — — aus dem Conglomerate bei Innsbruck. VIII. 367, 780. — von Davidsthal. VIII. 494. — — von Erlau. V. 211. — — von Fohnsdorf. IV. 176, 177. — — von Gleichenberg. VI. 285, 287, 288, 290. — — von Idria. IX. *V.* 18. — — von Kaiser-Steinbruch. III. d. 47. — — von Krottensee. III. d. 126. — — des Kuhgrabens. V. 559. — — von Libowitz. X. *V.* 69, 70. — — von Monte Bolca. VI. 886, 887. — — von Muthmannsdorf. I. 161. — — von Neckenmarkt. IX. *V.* 148, 149. — — aus Nord-Deutschland. II. d. 143. — — von Oedenburg. IX. *V.* 148. — — im Prager National-Museum. II. d. 165. — — von Schauerleithen. I. 163, 164; V. 525. — — vom Seegraben bei Leoben. I. 735. — — aus Toscana. IX. *V.* 135. — — des Wiener Beckens. I. 744, 745; II. a. 145, d. 39. — — von Wittingau. III. d. 144. — — von Wotwowitz. X. *V.* 194. — (miocene) von Eperies. II. b. 147; III. a. 169. — — im Venetianischen. IV. 114. — (tertiäre) von Belvedere in Wien. I. 361. — — von Bilin und Teplitz. II. a. 154. — — von Erdöbenye. II. b. 178. — — von Feistritz. IX. 345. — — von Köflach. VIII. 739; IX. *V.* 3, 4. — — von Kremniczka. III. c. 157, 158. — — des Oesterreichischen Kaiserstaates. I. 679. — — von Sagor. II. b. 185, 186, 188. — — von St. Florian. VII. 579. — — von Sotzka. I. 175, 552. — — von Szakadat und Thalheim. III. d. 134, 135. — — von Tokaj. III. a. 169. — (Gypsabgüsse fossiler) aus Italien. X. 142, *V.* 91. — (O. Heer's Werk über Schweizer tertiäre). IX. *V.* 134. — (Prof. de Visiani's Werk über fossile dalmatinische). X. *V.* 109. Pflanzenschiefer von Weissenbach. VII. 32. — (Anthracit führende) von Taninge. IX. *V.* 48. Phonolith im Duppauer Gebirg. VII. 330, 331. — im Leitmeritzer Mittelgebirg. IX. 412, 424. — im Saazer Erzgebirg. VIII. 604, 606. — im Saazer Tertiär-Becken. IX. 530. — -Tuff. IX. 416. — — im

nördlichen Böhmen. IX. 439. — — bei Rumburg und Hainspach. X. 396. Photographie mit salpetersaurem Uran-Oxyd. IX. *V.* 47. Phyllit im Egerer Kreis. VII. 485, 486, 493; VIII, 13. — im Granit. X. 392. — von Graslitz. X. 350, 351. — des Jeschken-Gebirgs. X. 384, 387, 388, 389. — mit körnigem Kalk. IX. 682, 683, 685. — von Mirotitz, Chlumetz und Střepsko. VI. 686, 703, 704, 716, 725, 729, 732, 733, 735. — der Schneekoppe. X. *V.* 117. — (massiger). VIII. 536, 537. — -Gestein des Iser-Gebirgs. X. 381. — -Gneiss. VI. 709, 716; IX. 687. Phyllite (Blätter-Abdrücke) aus dem Miocenen des Venetianischen. IV. 114. Piauzit. VII. 91. Pietra forte von Florenz. V. 228. — verde. IX. 361. Pikrolith. VI. 100; X. Anh. 12. Pinguit. VI. 99. Pistacit im Diorit. VI. 715, 718. — im grünen Thonschiefer. VI. 708. — in Grünstein. IV. 7; V. 100. — vom Sattelkar. V. 780. — -Schiefer der Central-Alpen. V. 774, 775. Pläner im Leitmeritzer Kreis. VIII. 776; IX. 431. — in Mittel-Mähren. V. 700, 703, 704, 705, 714, 742. — im nördlichen Böhmen. IX. *V.* 72, 74, 91, 92; X. *V.* 61, 62, 97, 113, 114, 115. — der Teplitzer Bucht. IX. 530. — -Kalk nördlich von Krakau. I. 246, 251. — -Mergel nördlich von Krakau. I. 243. — -Petrefacte. IX. *V.* 73. — -Sandstein im nördlichen Böhmen. VII. 326; X. *V.* 98. Planorben-Schichten in Mittel-Steiermark. VII. 536, 543. Plassen-Kalk. IX. 346, 361. Platten-Gneiss. VIII. 526, 527, 529. — -Kalk im Banat. VI. 220. — — des Fersina-Thales. VIII. 302. — — der Rothen Wand. VII. 17. — — des Wellitobels. VII. 13. Pleistocen- (Glacial-) Ablagerungen. IX. 601, 636. Pleochroïsmus des Amethystes. I. 158. — des Schwerspathes. III. d. 28, 29; V. 147. Pliocenes der Nord-Karpathen. III. c. 145, 146. Pliocen-Flora von Swoszowice. I. 235. Plumbocalcit, Anal. X. Anh. 12. Plutonisches der Nord-Karpathen. III. c. 146. — des Weitensteiner Kalkgebirgs. VIII. 429. Pluton-Gesteine (magnetisches Verhalten der). VIII. 681. Pochwerke von Vöröspatak. II. d. 89. Polarität (magnetische) einfacher Gesteine und Felsarten. VIII. 649, 654, 658, 663, 669, 681, 683, 684, 686, 806. — — von Felspartien. VIII. 691. — von Schlacken. VIII. 690, 691. — des Serpentines. VIII. 806. Polirschiefer des Mentauer Thales. IX. *V.* 35. Polybasit von Přibram. VI. 58, 59. Polyhalit, Anal. IV. 632; X. Anh. 12, 13. Polymorphismus der Conchylien in den Cerithien-Schichten. X. *V.* 175. Porphyr im Banat. VI. 242, 244, 245. — im Egerer Kreis. VIII. 25, 26. — im Granit von Mittel-Böhmen. VI. 390, 391, 392, 399. — des Grintouz. IX. *V.* 127. — im Hodritscher Thal. I. 159, 160. — von Karlsbad. V. 145. — im Körös-Thal. III. a. 35. — des Leitmeritzer Erzgebirgs. IX. 553. — magnetisches Verhalten. VII. 681. — in Oesterreich nördlich der Donau. III. c. 52. — im Rothliegenden. IX. 45, 240. — bei Rumburg und Hainspach. X. 393, 394. — im Saazer Erzgebirg. VIII. 554, 556. — im südl. Steiermark. VIII. 433, 435. — um Teplitz. IX. 431. — in Ungarn. X. *V.* 36. — in Unter-Steiermark. X. 163, 167, 178, 179, 192, 193, 195. — im Ur-Thonschiefer-Gebirg von Böhmen. VI. 721, 723. — von Vallalta. IX. 443. — bei Vöröspatak. III. c. 57, 61, 63. — der Werfener Schichten. VII. 636; X. 167. — (grauer) im östlichen Kärnthen. VI. 345. — (grüner). IX. 553; X. 195. — (rother) von Lienz. VII. 415, 416, 421, 430. — (silur.). 608, 617. — (Zinn führender). IX. 564. — -Gänge und Erzgang-Züge des sächsischen Erzgebirgs (Freih. v. Beust's Schrift über). VII. 180. — -Granit. VI. 21. — -Tuff von Cilli. VIII. 449. — — in Unter-Steiermark. X. 192, 194, 195, 196, 211, *V.* 14. Portland-Cement, Anal. VII. 606; X. Anh. 43. Porzellanerde (Kaolin) des Bayerischen Waldes. II. d. 145. — von Božetitz. VII. 362. — von Brenditz. III. a. 161; VII. 166, 167; X. Anh. 44. — von Kaut. VI. 618. — von Kottiken. VII. 259. — von Krummnussbaum, Anal. VII. 158; X. Anh. 44. — von St. Martin im Bacher-Gebirg. IX. *V.* 49. — von Schwarzbach, IV. 139. Prehnit. V. 100. Preise der Bergwerks-Producte. I. 180, 388, 572, 756; II. a. 173, b. 200, c. 180, d. 190; III. a. 220, b. 194, c. 176, d. 188; IV. 204, 459, 665, 881; V. 251, 464, 657, 913; VI. 216, 431, 663, 922; VII. 217, 402, 626, 864; VIII. 200, 399, 644, 827; IX. 183, 307, 517, 711; X. 153, 363, 477, 585. Preisfragen der Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher. VI. 865; VIII. 778. Přibramer Grauwacke. VI. 256. Probirkunst (Kerl's „Berg- und hüttenmännische"). VIII. 372. Production der Hüttenwerke in Ungarn und Siebenbürgen. IV. 825. — des Nagyáger Gold-Bergwerkes. III. a. 70. — der Oesterreichischen Berg- und Hüttenwerke im Jahre 1854. VII. 846, 847. — des Přibramer Hauptwerkes. I. 310. Profil des Hallstätter Salzberges. V. 196. Propylamin. II. a. 143. Protogyn. V. 90, 98. — -Geschiebe mit Eindrücken. V. 898. Pseudomorphosen nach Fassaït IV. 183. — nach Idokras. IV. 160. — von Kyanit nach Andalusit. I. 350, 358; X. Anh 10, 11. — nach Labrador. IV. 161, 162. — aus Norwegen. VI. 884. — aus Přibram. VI. 60. — aus dem sächsischen Erzgebirg. V. 433. — nach Steinsalz. IV. 101. — (steatitische). IV. 635, 699, 700. Pseudophit, Anal. X. Anh. 13, 14. Psilomelan. VI. 97, 763; VII. 609. Pumpe für sandige Wässer (Einachsige Mönchkolben-Hub- und Druck-). I. 93. Putzenwacke. VIII. 76. Pyrantimonit von Přibram. VI. 59. Pyrargyrit von Přibram. VI. 59. Pyrit, Analysen. X. Anh. 13. Pyrogen-Gestein von Nagyág. VIII. 125, 126.

Pyrolusit. VI. 698. Pyromorphit. X. 21. Pyrop-Ablagerungen im böhmischen Mittelgebirg. VII. 844, 845. Pyroxen. Magnetisches Verhalten. VIII. 677.

Quader von Melaphyr gehoben. X. *V.* 115. — in Mittel-Mähren. V. 704, 705, 721. — im nördlichen Böhmen. IX. *V.* 81. — (Grünsand im untern). V. 739, 740. — (unterer) in Mittel-Mähren. V. 721, 741, 742. — — im nördlichen Böhmen. VII. 326. — und Kreide-Petrefacte im Dresdner Museum. X. *V.* 178. — -Petrefacte. VIII. 157; IX. *V.* 73. — -Sandstein im Leitmeritzer Kreis. VIII. 776; IX. 570, 571, *V.* 72; X. *V.* 60, 61. — — im nördlichen Böhmen. X. *V.* 96, 97, 115. — — von Radowenz. IX. 240, 241. — — des Saazer Beckens. IX. 530. — — (Eisenerze im). V. 734, 735, 737, 738. — — (Kohlenflötze im). IV. 430; V. 198, 727, 729, 730, 731, 732, 735. — (Pflanzen im). IV. 185. Quartäres im Leitmeritzer Mittelgebirg. IX. 454. — der Lombardie. VII. 830. — im nördlichen Böhmen. VII. 332. — in Ober-Oesterreich und Salzburg. III. d. 147. — im Saazer Erzgebirg. VIII. 606. — im südwestlichen Böhmen. VI. 617, 618. — im Teplitz-Saazer Becken. IX. 534, 535. Quarz der Grauwacke. V. 473, 475, 507, 510, 512, 514. — von Přibram. VI. 52. — der Rochlitzer Erz-Lagerstätten. X. 15 — (blätteriger). IV. 697, 698. — (kugeliger) bei Malomeritz. IV. 321. — (Quetsch-Maschine für göldischen). V. 207. Quarz-Blöcke bei Bösing. V. 204. — -Brockenfels. VIII. 31. — -Conglomerat der Krems-Alpe. VI. 526, 527, 528, 539. — — (silurisches). VII. 119. — des Verrucano. IX. 459, 460. — -Fels in Nieder- und Ober-Oesterreich. III. c. 46. — — -Lagerzug am östlichen Fusse des Böhmerwaldes. VI. 767, 768, 782. — -Gang mit Kobalterzen. VII. 492. — — bei Prachatitz. V. 47, 48. — — bei Rumburg. X. 393. — — bei Unter-Sandau. VII. 499, 527, 528. — -Gänge im Egerer Kreis. VIII. 31. — — im Pilsener-Kreis. VI. 482, 483, 502, 503. — -Gesteine als Bau-Material. VII. 749, 750. Quarzit des Böhmerwaldes. V. 577, 578; VI. 762, 767, 810. — im Glimmerschiefer. VII. 484, 502, 521; VIII. 12, 533. — im Gneiss. V. 286, 293, 577, 578. — von Mirotitz, Chlumetz und Střepsko. VI. 689, 707. — in Mittel-Böhmen. VI. 382. — im nordöstlichen Ungarn. X. 407. — im Ur-Thonschiefer. VII. 487; VIII. 14, 15. — des Verrucano. X. 90. — (gewundener). VI. 690. — (silurischer). VI. 612; VII. 118, 121, 122. — -Etage D (Trilobiten der). VII. 357. Quarz-Krystalle von Reichenau (Böhmerwald). VI. 760. — — aus dem Bitizer Wald. II. d. 170. — -Porphyr in Süd-Tirol. VII. 841; IX. *V.* 7. — — von Vallalta. IX. 443. — — zu Alunit verwittert. IX. *V.* 118, 119. — -Sandstein der Eocen-Kohle. X. 213, 215. — — des Falkenau-Elbogener Beckens. VIII. 493. — — des Saazer Beckens und der Teplitzer Bucht. IX. 521. — — im Saazer Erzgebirg. VIII. 603. — — von Steierdorf. VI. 233. — -Schiefer im Jeschken-Gebirg. X. 385, 388. — — in k. k. Schlesien. IV. 9. — — des Taunus. V. 201, 202. — — (weisse) im Ur-Thonschiefer. X. 226, 227. — -Schotter (diluvialer). X. 513. — -Schwielen der Uebergangs-Schiefer. V. 354, 355, 360. — -Zone des Böhmerwaldes. VI. 762, 763, 767. Quecksilber in Quellen. VI. 813. — -Bergbau in Californien. II. c. 155. — — zu Vallalta. IX. 442, *V.* 122. — -Gang in Nord-Siebenbürgen. VI. 129. — Gewinnung aus Fahlerz. III. c. 148. — -Lagerstätte von Gagliano. VI. 810. — -Vorkommen in Ober-Krain. VIII. 385. Quelle (periodische) von Leutschdorf. VII. 171. — — nächst Sulzbach. VIII. 460. Quellen im Drann-Thal. X. 218. — von Gastein. III. a. 197, 198. — am nördl. Abhang der östlichen Alpen. I. 57. — (intermittirende) des Oliero. IX. *V.* 65, — -Absätze (alte) in den Hochalpen. V. 439. — -Stollen zu Gastein. VII. 307. — -Temperaturen von Gastein. VII. 316. — — in den östlichen und Central-Alpen. I. 289, 302; IV. 492. — — bei Radoboj. I. 278. Querthäler der Alpen. II. b. 36. Quetsch- und Amalgamir-Maschine Berdan's. V. 207.

Radioliten-Kalk. IX. 348, 349, 354; X. *V.* 10. Radstädter Kalke. V. 834, 835. — -Schichten. V. 444, 833, 844, 849; VI. 543. — -Schiefer. V. 812, 833, 834. Raibler Schichten. VII. 373, 638, 685; IX. 359, 361, 470, *V.* 32, 33; X. *V.* 192. — — der Lombardie. IX. 470. — — im Rhätikon. X. 118, 121, 123, 125, 131. — — in Vorarlberg und Nord-Tirol. X. 101. — — (Prof. Bronn's Arbeit über Fauna und Flora der). IX. *V.* 40. — — (Petrefacte der) im Keuper bei Bayreuth. IX. *V.* 160, 161. Rankenfüsser der Eiszeit. IX. 658. — (jetztlebende) der Britischen Meere. IX. 595. Rauchwacke des Grauwacken-Gebirgs. V. 510, 513. — bei Hall. VI. 341. — des Lavatsch-Thales. VI. 343, 344, 350. — der Lombardie. IX. 465. — der nordöstlichen Alpen. III. b. 54, 64, 79, 80. — des Pezzaze-Thales. VI. 891, 893, 894. — im Randgebirg des Wiener Beckens. X. 257. — im Rosalien-Gebirg. V. 493, 494, 510, 513. — der St. Cassian-Schichten. X. 23. — (gelbe) der Raibler Schichten. X. 131, 133. Regenverhältnisse der Alpen. I. 280. Reise in Brasilien (V. v. Helmreichen's). III. b. 163, 164. — in England und Californien (Juhoss'). I. 718. — nach Frankreich und England (Prof. Lanza's). VI. 877. — in Klein-Asien (Fischer's, v. Moltke's und v. Vincke's). V. 436. — — — (Bergrath Foetterle's). IX. *V.* 85. — — — (v. Tchihatcheff's). IV. 840; V. 233; VII. 821. — im Orient (Bialloblotzky's). III. a. 204. — in Persien (Czarnotta's). III. b. 105. Reisewerk über Süd-Russland und Krim (Fürst Demidoff's). VI. 864. Reissacherit. VII. 312; X. Anh. 13. Relief-Karte

von Nieder-Oesterreich (Streffleur's). VI. 190, 191. — — der Umgebung von Wien (Hauptmann Cybulz's). VIII. 815. Reptilien-Fauna (gegenwärtige) von Belgien, England und Irland. IX. 583. Rhipidolit. V. 83. Rhomben-Glimmer. II. c. 43. Riesen-Granit. VI. 789. Rittingerit. III. d. 121. Römergräber bei Bruck an der Leitha. II. d. 192, 193. Römerit. VIII. 759; X. Anh. 13, 14. Röstung der Erze (Gewinnung der verflüchtigten Metalle bei). V. 430, 431. Röthel von Wotwowitz. X. 353. — -Eisenstein, Anal. VIII. 313; X. Anh. 17. Roheisen, Proben. IX. 174; X. Anh. 29. Rohwand (Ankerit). Analyse. IV. 827; VIII. 613. 614, 615, 757; X. Anh. 21. Rossfelder Schichten. V. 593. Roth-Eisenstein, Analysen. V. 641; VI. 157; IX. 504; X. Anh. 16, 21, 22, 23. — — von Auwal. VIII. 169. — — der Bukowina. V, 221. — — im Egerer Kreis. VIII. 62, 65. — — im Klippenkalk. VI. 129, 130. — — Proben. VI. 157; VII. 806; IX. 504; X. Anh. 18, 19, 20, 23. — — im Saazer Erzgebirg. VIII. 594, 597, 598. — — im Silurischen. VI. 613, 615, 731. — — -Gänge im Egerer Kreis und im sächsischen Erzgebirg. VIII. 65. Rothliegenden (Eruptiv-Gesteine des). IX. *V.* 45. — (Sandstein des) bei Losoncz. IX. *V.* 93, 94. Rothliegendes in Böhmen. VII. 325; IX. 240, 241, 242. — im böhmischen Riesengebirg. VIII. 180. — im mittleren Mähren. V. 663, 678. — im Saazer Erzgebirg. VIII. 600. — im nordwestlichen Böhmen. IX. *V.* 37, 38. — im südlichen Mähren. IV. 54. — im westlichen Mähren. VII. 840. — (Kupfer führendes) in Böhmen. III. b. 96; IX. 241, 243, 244. Roth-Sandstein mit Erdpech und Pflanzenresten. VI. 98. — — von Lienz. VI. 445, 448. — — am Nord-Abhang der nordöstlichen Alpen. I. 31. — — des Pezzaze-Thales. VI. 889. — — in Vorarlberg und nordwestlichen Tirol. VII. 1, 23. — — (alter) in England und Schottland. VII. 184. Rudisten-Kalk in Dalmatien. VI. 899. — — im Drann-Thal. X. 209, 212. — — bei Idria. VII. 839. — — in Süd-Steiermark. VIII. 443. — -Zone (obere und mittlere). X. *V.* 10. — — (untere). X. *V.* 11.

Säugthier-Crag. IX. 627. — -Fauna (gegenwärtige) des arctischen Nord-Amerika. IX. 630. — — — der Britischen Inseln. IX. 580, 581, 585. — — des Leitha-Kalkes. IX. *V.* 160; X. *V.* 53. — — (marine) der jetztzeitigen Britischen Meere. IX. 594. — — (nach-glaciale) der Britischen Inseln. IX. 628, 629, 631. — — (tertiäre) des Wiener Beckens. II. d. 122; III. b. 161; VIII. 167, 185; IX. *V.* 87, 88. — -Faunen (tertiäre). X. *V.* 19. — -Petrefacte von Brogyan. VI. 908; IX. *V.* 113. — — von Hönigthal bei Gratz. VIII. 365. — — in der Jauling. IV. 711. — — von Leiding. V. 524. — von Monte Promina. IV. 165; VI. 184. — — aus Neu-Holland. X. *V.* 177. — — aus Oesterreich. I. 166. — — aus Piemont. X. *V.* 18, 19. — — von Sebenstein. V. 227, 527. — — von Theissholz. IX. *V.* 147. — — im Venetianischen. I. 194. — -Zähne (fossile). IX. *V.* 158, 159. Saldame (Quarzsand der Kreide). IV. 224. Salpeters (Bildung und Gewinnung des). I. 316, 453, 562; II. b. 166. Salpeter-Districte in Ungarn. I. 453. — -Proben. I. 317—342; II. b. 166, 186, 187; III. a. 164; X. Anh. 78. Salsen bei Reiszen. IV. 169. Salz zum Beizen der Dochte. III. d. 117; X. Anh. 78. Salze. Analysen. X. Anh. 74, 75, 76, 77. — (Apparat zur Bestimmung der Löslichkeit der) bei höherer Temperatur. VII. 186. Salz-Ablagerungen in den Karpathen und in den Salzburger Alpen. I. 234. Salzberg am Dürnberg bei Hallein. V. 590, 604, 608. — von Hall. VI. 328, 338, 345. Salz-Bergbaue (Ramsauer's Modelle der österreichischen). II. b. 177. Salzgebirg (ausgelaugtes). II. c. 120. Salzlecke. Anal. V. 640; X. Anh. 78. Salzquelle von Hengsberg. VII. 566. — von Luhatschowitz. IV. 194, 693; X. Anh. 71. — von Roggendorf. IV. 154; X. Anh. 73. Salzsäure (Aufschliessung von Mineralien durch). IV. 186. Salzstock von Vizakna. X. *V.* 88, 89. Salzthon von Hallein. V. 593, 602, 607. Sammelwerk (Bädeker's naturwissenschaftliches). IX. *V.* 155. St. Cassian-Mergel. VI. 895. — -Petrefacte. IX. 335; X. 24. — -Schichten. III. c. 134; IV. 776, 777; VI. 448; VII. 76, 80; VIII. 217; IX. 141, 267, 268, 271, 359, 335, 360, 361, 362, 467, *V.* 32, 33; X. *V.* 192. — — von Deutsch-Bleiberg. VII. 76, 80. — — in Krain. VIII. 217; IX. 267, 268, 271, 335. — — der Lombardie. IX. 141, 467; X. *V.* 192. — — (abnorme Lagerung der). VI. 907, 908. — — (Aequivalent der) in Keuper von Franken. X. 22. — — (geologische Stellung der). III. c. 134. Sand von Erdpech durchdrungen. Analyse. III. a. 28; X. Anh. 42. — -Concretionen in Siebenbürgen. IV. 177. Sandstein. Analysen. IX. 507; X. Anh. 34. — von Fogaras. VIII. 790. — der Gailthaler Schichten. X. 161. — — — (Bleiglanz im). X. 164, 165. — mit Halobia Lommeli. IV. 475. — des Lias. III. b. 74. 75. — des Rothliegenden bei Losoncz. IX. *V.* 93, 94. — (tertiärer). III. d. 19, 21; VI. 298. — — bei Nussdorf. X. 264. — — von Perg. IV. 189. — (unterer flötzleerer) von Steierdorf. VI. 231, 232. — -Quarzit. VIII. 118, 119. Satinober. V. 487. Säuren (Bewegung schwimmender Krystalle einiger organischer). VI. 263. Sauerquelle von Bartfeld. IX. *V.* 133, 144, 145. — von Jamnitza (Pisarovina). VII. 201. — von Ivanda. IV, 700; X. Anh. 68, 69. — von Kondrau. IX. 297; X. Anh. 74. — von Rohitsch. IV. 148; VI. 39, 165; X. Anh. 73. — von Sulzbach. VIII. 463. — von Szántó. IX. *V.* 152. — von Szt. Iván. X. *V.* 36. — von Szliács. VI. 314; X. Anh. 73. — von Windisch-Garsten. VIII. 463. Sauerquellen im Egerer Becken. VIII. 488. — im Kaiserwald. VII.

514. — von Korytnicza und Lutzky. X. V. 81. Seaglia. IX. 364, 494. Schall-Phänomen am Monte Tomatico. IV. 559. Scheelit. IV. 159. Schichtgebirge der Lombardie. IX. 446. — im Salzkammergut. I. 748. — der Venetianischen Alpen. I. 181. Schiefer. Analysen. I. 729, V. 869; X. Anh. 35, 41. — (bunte) in Ober-Krain. I. 402. — — von Raibl. I. 256. — (graue) der Central-Alpen. V. 778. — — in Kärnthen. VI. 534, 535, 544. — (grüne). Analysen. V. 872; X. Anh. 32. — — in Böhmen. VI. 693, 694, 716. — — der Central-Alpen. V. 775, 811. — — von Dobschau. X. V. 41. — — in Kärnthen. VI. 528, 531, 532, 534, 544. — — der Kor- und Sau-Alpe. IV. 195. — (rother) von Murau. V. 361, 362; X. Anh. 40. — (sandige und thonige) des Pezzaze-Thales. VI. 890. Schiefergebirg in Salzburg. I. 602. — um Tabor. IX. 679, 680. — von Turrach. IX. 183, 184, 199, 203, 211, 225. — der Zips. X. V. 60. — (Eisen führendes) in Ober-Krain. I. 399, 400. Schieferhülle der Central-Alpen. V. 829, 841. Schiefer- und Massen-Gesteine (krystallinische) in Oesterreich, nördlich der Drau. III. c. 35; IV. 232. Schieferschollen im Granit. X. 391. Schieferthon. Analysen. III. b. 157; IV. 398; X. Anh. 34, 40. — der Offenburger Kohlenschichten. VIII. 336, 339, 340, 345. — des Rothliegenden. V. 676. — der Steierdorfer Kohlenschichten. VI. 220, 221, 229, 230, 245. — der Steinkohlen-Formation. VII. 257, 262, 263. — (Kupfer führender). IX. 243, 244. — (tertiärer). VIII. 446, 447, 502. Schlacken aus einem altrömischen Eisenwerk in der Wochein. I. 204, 205. — Proben und Analysen. II. b. 175; III. a. 156, 175; VI. 854; VII. 806; VIII. 747; IX. 507; X. Anh. 29, 30. — magnetische Polarität der). VIII. 690, 691. — (vulcanische). I. 159, 160; V. 103; IX. 2, 68. Schlier (tertiärer Thon). IV. 190; X. V. 38. Schmidkohle von Oslovan. Proben. VII. 159; IX. 298; X. Anh. 56. Schörl-Granit. V. 99. Schrambach-Schichten. V. 593, 597. Schrift-Granit. III. d. 75; VI. 789. Schutt (diluvialer) des Buchberger Thales. II. c. 59. — — in Kärnthen. VI. 550, 551, 561. — — im obern Mur-Gebiet. VII. 46, 59. — — bei Plan. VI. 798. — — aus Quarz und krystallinischen Schiefern. X. 513. — — im Raab-Thal bei Mortantsch. V. 533. — — bei Raibl. I. 263. — — von Wagrain. V. 816. Schwallboden (Frischerei am). IV. 498. Schwarz-Eisenstein der Bukowina. VI. 116. Schwarzkohle. Proben. VII. 156; VIII. 152; X. Anh. 50, 62. Schwarzkohlen-Formation auf Borneo. IX. 287, 288. Schwefel. Proben. V. 191; X. Anh. 31. — (gediegener) aus dem Kirchenstaate. IX. V. 54. — -Antimons (Textur des). IV. 429. — -Arsen in Braunkohle. IV. 109; X. Anh. 14. Schwefelerde am Büdös-Berg. V. 217. Schwefelkies. Analysen und Proben. V. 870, 871; X. Anh. 24. — von Přibram. VI. 54, 55. — pseudomorph nach Bleiglanz. VI. 63. — — nach Polybasit. VI. 63. — — nach Schwerspath. VI. 60. — von Wotwowitz. VIII. 815. — (krystallinischer) von Rapitz. IX. V. 64, 65. Schwefelquelle von Baden bei Wien. I. 57. — von Mehadia. II. a. 151, b. 93; X. Anh. 69. — von S. Stefano. IX. 689, V. 100, 121; X. Anh. 72. — von Trentschin-Teplitz. IX. V. 132; X. 1. — von Vöslau. I. 57. — von Warasdin-Teplitz. III. d. 16; IX. 165, V. 68; X. Anh. 70. Schwefel-Vorkommen von Kalinka. 155, 157. — — von Radoboj. I. 272, 276. — — von Swoszowice. I. 235, 351. Schwemm-Canal (fürstl. Schwarzenberg'scher) im südlichen Böhmen. V. 625. Schwerspath von den Karlsbader Quellen abgesetzt. V. 142. — von Přibram. VI. 48, 49. — pseudomorph nach Kalkspath. VI. 61. — von Reichenau. II. b. 148. — der Spath-Eisenstein-Formation von Hüttenberg. VI. 641. — im Tertiären. VIII. 317. — (himmelblauer) von Naurod. III. d. 26. Schwerspathes (technische Verwendung des). III. a. 172. Secundär-Gebilde der Joachimsthaler Erzgänge. VII. 837. — -Gebirg im nördlichen Ober-Oesterreich. III. a. 102. Sedimentär-Gebilde in Vorarlberg und Nord-Tirol (ältere unbestimmbare). X. 87. Seelen (hohle Kugel-Concretionen im Granit). VI. 375. Seen des Böhmerwaldes. VII. 149. — des Salzkammergutes. II. b. 170, 171. Seifengebirg im böhmischen Ur-Thonschiefer. VI. 727. — im Egerer Kreis. VIII. 80, 81. — von Oláhpian. IV. 484, 487, 489. — in Süd-Slavonien. IV. 493. 494. Senarmontit. IV. 167. Senkung der Kreidegebilde in Galizien. IX. V. 125, 126. Sericit-Schiefer. IV. 837, 838; V. 201. — — von Murau. V. 359, 360, 361, 362. Serpentin. Analyse. VI. 156; X. Anh. 14. — im Banat. VI. 224, 253. — in Böhmen. VI. 719. — im Böhmerwalde. V. 24, 25, 28, 31, 35, 37, 38, 39, 46, 51, 60; VI. 753, 790, 791. — der Central-Alpen. V. 831, 832. — bei Dobschau. X. 551. — im Enns-Thal. IV. 469. — des Kaiserwald-Gebirgs. II. b. 31. — in Karlsbader Gebirg. VII. 322. — in Nieder-Oesterreich. IV. 271, 272, 273. — im nordwestl. Mähren. X. 227. — in Oesterreich, nördlich der Donau. III. c. 53; IV. 164. — im Rosalien-Gebirg. V. 500, 503, 504, 505. — im Saazer Erzgebirg. VIII. 566, 567. — im Silurischen. VII. 110. — im südl. Böhmen. V. 2. — der Tarnthaler Köfel. IX. V. 120, 121. — des Zdiar-Berges. V. 101; X. 228. Serpentins (magnetische Polarität des). VIII. 658, 659, 676, 682, 806. — (metamorphe Entstehung des). V. 41, 42; X. 227, 228. Servino. IX. 456, 457, 459, 465. Severit. IV. 826; X. Anh. 14. Sewerkalk. VII. 1, 3, 15, 25, 38. Sideroplesit. VI. 123. Silber aus dem Schacht eines Eisen-Hochofens. III. a. 199. — (gediegenes) von Přibram. VI. 53. — — von Rochlitz. X. 13. — (haarförmiges) von Joachimsthal. IV. 835. — (Krystalle und

gestrickte Gestalten von). I. 150. — (Vorkommen von) in Erzen und Gewinnung nach Malaguti und Durocher. I. 749, 750. — -Anbrüche des Joachimsthaler Geisterganges. V. 630. — -Bergbau von Adamsthal und Rudolphstadt. V. 107, 112, 116. — — von Bergreichenstein. V. 285. — — in der Bukowina. V. 222, 223. — — im Egerer Kreis. VII. 32, 41. — — von Elischau. V. 301, 302. — — im Leitmeritzer Erzgebirg. IX. 556, 572. — — von Michaëlsberg. IV. 435, 436. — — im Saazer Erzgebirg. VIII. 569, 575, 580, 582. — — von Schönficht. VII. 510, 511. — -Einlösung (Verordnung über). VIII. 189. Silbererze (Zugutebringung der reichen Joachimsthaler). V. 611; VI. 871. Silber-Extraction auf nassem Weg. I. 573; II. a. 109, 156, c. 52; III. a. 201, 202, b. 166, 167; IV. 545; V. 612. — — zu Tajova. II. a. 109; V. 406. Silbergänge von Joachimsthal. VIII. 77. — von Kirlibaba. VI. 122. — von Přibram (Mineralien der). X. *V.* 177. — im Trachyt des nördl. Siebenbürgens. VI. 129. Silbergeschicke (Behandlung der) im Banat und zu Schmölnitz. IV. 807. — im Schemnitzer Bezirk. IV. 785. Silber-Glanz pseudomorph nach gediegenem Silber. VI. 62. Silberhütten von Felsöbánya. IV. 623, 624. — von Fernezely. II. c. 157; IV. 613, 614. — des Nagybányer Bezirkes. IV. 568, 579. — -Process von Přibram. VII. 171. Silicat-Gesteine (krystallinische) der Trias. VII. 444. Silurisches in Böhmen. VI. 172, 730; VII. 99, 101, 324. — am nördl. Abhange der nordöstlichen Alpen. I. 59. — im südwestl. Böhmen. VI. 594, 596, 597, 609. Silur-Becken von Mittel-Böhmen. VI. 189; X. *V.* 111, 112. — -Colonien in Central-Böhmen. X. 479, 481, *V.* 175. — -Grauwacke am Semmering. I. 577. — -Petrefacte. VI. 610, 611. — — von Rokitzan. VII. 162, 355, 357, 372. — -Schiefer von Diorit durchbrochen. VI. 607. Sinterbilder (Karlsbader). V. 894; VI. 195. Skapolith in Steatit metamorphosirt. V. 101, 102. Skorodit von Lölling. IX. *V.* 155. Skripautz (Quarz-Sandstein) des Gonobitzer Eisenlagers. X. 207, 208. Smithsonit pseudomorph nach Kalkspath. VII. 610. Solfataren. I. 157, 158. Soolenquelle bei Unken. V. 142. Spath-Eisenstein. Analysen und Proben. III. a. 157; VII. 155; VIII. 151, 613, 614, 615, 757; X. Anh. 16, 19. — — im Enns-Thal. IV. 468. — — von Gollrad. II. a. 155; III. a. 4. — — von Gonobitz. X. 206, 207. — — von Hüttenberg. VI. 638, 639, 646. — — von Jauerburg. I. 404; VII. 369. — — als Kern von Braun-Eisenstein-Geoden. V. 183; VI. 647. — — von Přibram. VI. 48. — — von Reichenau. II. b. 148. — — im Salzburgischen. V. 372, 379. — — von Tragöss. VIII. 425. — — von Zeyring. V. 335. Sphaerosiderit. Analysen und Proben. IV. 631; VII. 808; VIII. 151, 613—615, 757; IX. 173, 506, 508; X. Anh. 16, 17, 18, 19, 23. — von Brandeisl. IV. 631, 648; X. Anh. 16, 17. — im Egerer Kreis. VIII. 72, 475. — im Karpathen-Sandstein. VI. 130, 131, 132, 183; VII. 837. — im Lias von Fünfkirchen. VIII. 804, 805. — im Silurischen. VII. 610. — von Steierdorf. VI. 240, 245. — im Süsswasser-Becken von Eger. VIII. 475, 476. — von Weitenstein. VIII. 425. Spinell von Hodritsch. IV. 835. — (Hercynit). VI. 785. Spodium. Analyse. IV. 398; X. Anh. 31, Sprödglaserz, pseudomorph nach Polybasit. VI. 63. Sprudel-Ausbrüche des Karlsbader Quellen. VII. 202, 203, 205. Stahl. Analysen. V. 868; X. Anh. 29. Stahl-Fabrication in England. III. b. 168, 169. Starhemberg-Schichten. IV. 729, 730, 731. Staurolith im Glimmerschiefer. V. 333. Steatit aus Fassaït. IV. 183. — von Hodritsch. IV. 183. — aus Skapolith. V. 101, 102. — -Pseudomorphose (Strakonitzit). IV. 699. Steinbrüche am Hundskogel bei Wien. VI. 201, 202. — in Mähren. IV. 431. — k. k. Schlesien. V. 394. Steinkohle von Grünbach. II. b. 108, 117; VIII. 152. — von Rossitz. V. 140, 870; VI. 139, 140. — von Steierdorf. Proben. I. 707; II. b. 108. — des Vulcan-Passes. VI. 409. — (vermeintliche) von Senoschetz. X. *V.* 45. Steinkohlen. Proben. III. a. 158, 161, 164, 165, c. 155; IV. 154; V. 140, 870; VI. 140, 160, 409; VII. 152, 153, 156; VIII. 152, 153, 362; IX. 298; X. Anh. 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 62, 63, 64. — (Verordnung über die Rechte der Grundherren auf die). VIII. 191; X. 469. — -Ablagerung von Jaworzno. VII. 385. — — in Krain und Küstenland. X. *V.* 49. — -Becken von Karwin und Peterswald. IV. 649. — — von Merklin. VI. 164; VII. 266. — -Bergbau zu Grünbach. II. b. 111. — — zu Steierdorf. I. 708, 717; II. b. 167. — -Bergbaues im Saalkreis der pr. Provinz Sachsen (Cramer's Darstellung der Hauptmomente u. s. w. des). VIII. 774. — -Flora von Böhmen. II. d. 165; III. a. 188, d. 123, 129, 130; IX. 240. — — von Brandau. VIII. 166, 600, 602. — — der Central-Alpen. V. 826, 839. — — von Libowitz. X. *V.* 69, 70. — — der Lombardie. IX. 455. — — von Mährisch-Ostrau. III. d. 119; IV. 435; VII. 325. — — von Offenburg. VIII. 334, 342, 346, 350. — — von Pilsen. VII. 249, 264. — — von Sachsen. VI. 174, 407. — — der Stang-Alpe. VI. 540. — — von Steierdorf. VI. 225, 234, 235, 238, 253. — — von Stradonitz. III. d. 129, 130. — — in Unter-Steiermark. X. 161. — — des Windischen Grabens. VI. 192. — — von Wotwowitz und Buschtiehrad. X. *V.* 14, 15, 194. — — der Zips und des Gömörer Comitates. X. 553. — -Formation (Dolomit der). VII. 653, 660. — — (Faunen der englischen und schottischen). VII. 184. — — (Prof. Göppert's künstliches Profil zur Erläuterung der). VII. 832. — — (Schichtenstörungen der). VII. 651. — -Formationen des Kaiserthums Oesterreich. II. c. 95. — — (Sturz's tabellarische

Darstellung der). VI. 196. — -Gebilde der Carnia und des Comelico. VII. 437. — — des Isonzo-Thales. IX. 333. — — der Karawanken. VII. 630, 631, 644, 648, 651, 660, 664. — — im Saazer Erzgebirg. VIII. 600. — — im Süden der Gail. VII. 424, 427. — -Gebirg von Padochau. V. 226. — — von Westphalen (Süsswasser-Mollusken aus dem). X. *V.* 178. — -Kalk bei Edelény. VII. 700, 701, 705. — -Mulde von Brandau. VIII. 166. — — von Budweis. V. 268. — — von Mährisch-Ostrau. VIII. 162. — — von Miröschau. IV. 411, 412. — — von Pilsen. VI. 411, 412; VII. 251, 262, 263. — — von Radnitz. VI. 411, 412; VII. 268. — -Schichten von Eibiswald. I. 359. — — von Grünbach. II. b. 107. — — in Ober-Krain. VIII. 208, 210, 221. — — von Radowenz. X. 241, 242, 243. — — der Stang-Alpe. V. 366, 839; VI. 175, 178, 523, 536; IX. 183, 214, 227. — — von Steierdorf. I. 357, 706; III. a. 187, 194. — -Statistik (Taylor's Werk über). III. a. 104. — -Vorkommen (vermeintliches) bei Cattaro. IX. *V.* 111, 112. Stein- und Braunkohlen in Deutschland (W. Hermann's Karte über die Verbreitung der). VIII. 168, 169, — — (Untersuchung der österreichischen). I. 367, 609. Steinmannit von Přibram. VI. 56. Steinmark von Rochlitz. X. 17. — von Szaszka. VII. 362; X. Anh. 14. Steinsalz (blaues). II. b. 155; IX. 175. — (Pseudomorphosen nach). IV. 101, 473. — -Formation in Galizien. IX. 149, 151, 152. — -Lager von Bayonne. V. 428. — — von Bochnia. I. 239; II. c. 30. — — von Wieliczka. I. 237. — -Metamorphosen (Foith's Theorie der). III. b. 130. Stilbit von Přibram. VI. 51. Stilpnomelan. V. 106. Stilpnosiderit von Přibram. VI. 53. Stinkkalk von Bleiberg. VII. 75. Stollberger (Neocom-) Schichten. X. 416. Strakonitzit. IV. 635, 695, 699; X. Anh. 14. Stramberger Schichten. IX. 346, *V.* 57, 58; X. *V.* 28. Strassen-Nivellements in den Sudeten. VII. 295. Strontianit von Radoboj. I. 606. Struvit. VIII. 364. Subapennines der Lombardie. IX. 496. Subapennin-Petrefacte. IV. 638. Subfossil-Petrefacte von Kalamaki. VII. 173. Sud-Rückstände der Ischler Soole, Analyse. IX. 295; X. Anh. 77. Süsswasser-Ablagerungen in Mittel-Steiermark. VII. 221, 543, 560. — -Becken von Rein. IV. 433, 434. — -Diluvium im nordwestl. Ungarn. X. 463. — — in der ungarischen Ebene. X. 464. — -Gebilde von Eger und Falkenau. VIII. 466. — — (tertiäre) in Unter-Krain. IX. 393, 395. — -Kalk von Alt-Ofen. VI. 416. — — von Kostenblatt. II. a. 155. — -Mollusken aus dem Steinkohlen-Gebirg von Westphalen. X. *V.* 178. — -Quarz des Falkenau-Egerer Beckens. VIII. 494. — — von Hlinik. I. 360. — — des Saazer Beckens. IX. 521. — -Tegel mit Lignit. VII. 642. Syenit im Banat. II. b. 151. — bei Hermannstadt. X. *V.* 181. — der Hüttenberger Eisenlager. VI. 641. — von Malomeritz. III. a. 140; IV. 322. — um Marienbad. II. b. 10. — in Ober-Oesterreich. IV. 255. — im südwestl. Böhmen. VI. 606. Syenits in Süd-Tirol (Contact-Wirkungen des). VIII. 164. Syenit-Schiefer in Oesterreich, nördlich der Donau. III. c. 38, 39.

Tabaschir. VIII. 177. Taborer Granit. IX. 678. Tachert (Töpferthon). IV. 276, 277. Tachylits (Magnetismus des). VIII. 677. Talk-Gang im Serpentin. V. 25. — -Glimmer-Gneiss. VI. 758. — -Gneiss. V. 90. — -Greisen. IX. 567. — -Schiefer. IV. 11; V. 93, 94, 98, 469, 492, 537. — — Analysen. V. 642; VII. 806; X. Anh. 35, 41. — — der Central-Alpen. V. 774, 831. Tassello (Eocen-Kalk). IV. 224, 547; X. *V.* 8. — Nummuliten-Schichten. IV. 424; IX. *V.* 8. Tegel von Berchtoldsdorf. X. *V.* 33. — des Eichkogels. X. 27. — auf Glimmerschiefer. V. 469, 475. — in der Jauling. IV. 713. — mit Meeres-Mollusken. VII. 192. — im mittleren Mähren. V. 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 755, 757, 759, 761. — in Mittel-Steiermark. VI. 353, 354; VII. 192. — von Pirawart. IV. 427. — mit Sand und Sandstein. III. d. 19. — im südlichen Mähren. IV. 42. — in Unter-Krain. IX. 378, 379, 389. — im Viertel unter dem Mannhardtsberg. III. d. 21. — (brackischer). VII. 697, 699; X. 569, *V.* 33. — (Braunkohlen führender). I. 599, 600; V. 565; VII. 560, 697; IX. 394, *V.* 149. — (eocener) um Ofen. VIII. 318. — (mariner) in Mittel-Steiermark. VII. 561, 585, 592, 593. — (neogener) um Ofen. VIII. 320, 321, 322. — -Molasse. V. 575, 576, 580. — -Petrefacte. IV. 178, 427; V. 747, 748, 749, 750, 751, 753, 755, 757, 759, 761; VI. 353, 354; VII. 565, 572, 575, 580; VIII. 321; IX. 379; X. 27, 28, 569, *V.* 33. Tellurs (Aequivalent-Zahl des). VIII. 372. — -Formation der Nagyáger Erzgänge. VIII. 115, 116, 117. — -Schrifterz. II. a. 134. — -Silber von Nagyág. VIII. 123. Temperaturen mittelst Gaslampe (Apparat zur Erzielung gleichförmiger). VI. 64. Terebratel-Schicht (tertiäre). X. 314, 321. Terrainlehre (Freih. Schmidburg's „Grundzüge" der). VII. 172. Terrasse (tertiäre) von Mölk. IV. 282. — — von Raune. I. 395. — — im salzburgischen Saale-Gebiet. V. 139, 140. Terrassen-Diluvium im Gail-Thal. VII. 646, 647. — — des Gurk-Thales. VI. 555, 557. — — von Hieflau. I. 103. — — in Kärnthen. VI. 553, 556, 560. — — im Mur-Thal. VII. 61. — — in Ober-Krain. I. 392. — — des Pettauer Feldes. VI. 303. — — im salzburgischen Saale-Gebiet. V. 139, 140. — — im Sann-Thal. VIII. 456, 457. — — bei Wagrein. V. 816. — — von Wildalpen. I. 102. Tertiäres bei Agram. VI. 173. — der Carnia und des Comelico. VII. 457. — von Cattaro und Montenegro. X. *V.* 24, 25. — in

Dalmatien. II. d. 139, 140; III. a. 193; IV. 157; VI. 898. — des Drann-Thales. X. 213, 215, 216. — von Edelény. VII. 694, 705. — am Eichkogel. X. 26, 28. — im Enns-Thal. IV. 478. — bei Eperies. II. b. 146, d. 135, 136; III. a. 169; X. 439. — von Erlau. V. 212, 213. — zwischen Flachau und Wagrein. V. 206. — in Galizien. IX. 152; X. V. 124, 126, 128, 129. — in gefalteten Schichten. X. 331. — von Gleichenberg. VI. 286. — um Hainburg. III. d. 39, 41. — der Hegyallya. X. 445. — der Jauling. IV. 711. — in Inner-Krain und Istrien. X. 272, 275, 285, 287, 292, 295, 296, 297, 302. — des Indischen Archipels. IX. 293, 294. — des Isonzo-Thales. IX. 344, 355. — von Judendorf. VII. 42. — in Kärnthen. VI. 416, 549; VII. 334. — im Kaiserthum Oesterreich. II. c. 104. — der Karawanken. VII. 641, 645, 659, 669. — des Körös-Thales. III. a. 23. — zwischen Kor-Alpe und Sausal. VIII. 282, 287. — von Kreideschichten überlagert. X. 326, 327. — im Lavant-Thal. V. 889, 890. — des Leitha-Gebirgs. III. d. 45. — des Liburnischen Karsts. X. 333, 336. — der Lombardie. IX. 494. — der Marmaros. X. 433, 434, 457, 458. — im mittlern Böhmen. VI. 362. — im mittlern Mähren. V. 743, 764. — im mittlern Steiermark. VII. 535. — im mittlern Ungarn. X. 494, 496, 497, 498, 506, 507, 508, 512 Anmerk. — des Moslaviner Gebirgs. III. b. 94, 95. — bei Nagybánya und Kapnik. X. 457. — in Nieder-Oesterreich. I. 662; III. d. 69; IV. 273, 274, 282; V. 879, 897; IX. 103. — im nördlichen Böhmen. X. V. 62, 63. — der nordöstlichen Alpen. III. b. 79, 86. — im nordöstlichen Ungarn. X. 431, 438. — von Nová Hora. IV. 77. — in Ober-Krain. I. 392, 394, 397; VIII. 222, 223, 226, 228, 371. — in Ober-Oesterreich und Salzburg. III. d. 147; IX. 103. — um Ofen. VIII. 313, 319. — in Ost-Galizien. II. a. 87. — bei Passau. II. b. 189, 190. — von Pirawart. IV. 426. — der Quarnerischen Inseln. X. 336, 337, V. 99. — bei Raibl. I. 261, 262. — des Rosalien-Gebirgs und des Wechsels. V. 519. — im Rottenmanner Thal. VII. 40. — der Ruster Berge. III. d. 53, 54. — im Saazer Erzgebirg. VIII. 603. — im Salzburgischen. II. c. 116; V. 258. — von St. Florian. VII. 192, 567, 578. — des Sann-Gebietes. X. V. 13. — der Saroser und Zempliner Comitate. X. 432. — in Siebenbürgen. X. V. 182, 183. — in Steiermark. V. 556, 557; VIII. 443, 444, 451. — im südöstlichen Kärnthen. VII. 175. — von Tinnye. X. 567. — in Unter-Krain. IX. 269, 270, 366, 374, 386; IX. 8, 9, 49. — der Venetianischen Alpen. I. 192. — im Viertel unter dem Mannhartsberg. III. d. 18, 19. — des Vihorlat-Gutin-Zuges. X. 450. — in Vorarlberg und Nord-Tirol. X. 78. — im Waag-Thal. X. V. 76. — im westlichen Mähren. IX. 49, 61. — der Wochein. VII. 687. — von Zeyring. VII. 43. — (kohlenführendes) von Rinegg. V. 202. — (marines) in Mittel-Steiermark. VII. 222. — — des Windischen Bühel. VI. 295, 296; VII. 567. — (v. Morlot's „metamorphisches"). VIII. 405, 424, 449. — (oberes) am nördl. Abhang der nordöstlichen Alpen. I. 53, 60. — — in Nord-Steiermark. I. 104; III. d. 59. — — des nordöstlichen Alpen-Gebiets. VI. 383, 384. — — der Nord-Karpathen in Schlesien. III. c. 145, 146. — — im nordwestlichen Frankreich. I. 587, 597, 598. — — von Radoboj. I. 270, 275; II. a. 141. — — im südlichen Mähren. IV. 37. — (unteres) der Nord-Karpathen. III. c. 143, — (vor-basaltisches). 428. Tertiär-Becken von Budweis. V. 215. — — von Eger. I. 688, 692, 693; VII. 327, 380, 509; VIII. 466. — — von Falkenau-Elbogen. VII. 185, 328, 509; VIII. 492. — — von Liescha. VII. 176. — — von Mainz (Dr. Fr. Sandberger's Monographie über das). VIII. 370. — — von Passail. V. 562. — — von Rank. X. 441. — — von Rein. IV. 433, 434; V. 562, 563; VII. 543, — — von Saaz. IX. 519, 536. — — von Sagor. VIII. 231, 232. — — von Telkibánya. V. 442. — — von Tulln und St. Pölten. III. a. 98. — — von Wien. I. 373, 662, 677, 744; II. a. 142, 150, d. 93, 104; III. a 140, 203, b. 166, c. 112, 115, 135; IV. 165, 166, 851; VI. 178; VII. 189, 353, 364, 833; VIII. 373; IX. V. 87, 88, 101; X. 257, V. 174. — — von Wittingau. V. 208. — — (Einbruch des Meeres in die Wiener). IX. V. 101. — -Bryozoën und Foraminiferen von Mittel-Steiermark. VI. 193, 194, 351. — -Bucht von Teplitz. IX. 519. — -Dolomit um Ofen. VIII. 313, 314, 315. — -Flora von Eger. VIII. 473. — — des Falkenau-Elbogener Beckens. VIII. 494. — — von Feistritz. IX. 345. — — von Häring. I. 557; II. d. 159; III. a. 171; IV. 849. — — von Idria. IX. V. 18. — — von Köflach. VIII. 738; IX. V. 3. — der Schweiz (Prof. O. Heer's Werk über die). V. 232; IX. V. 134, 135. — — des Venetianischen. IV. 113, 114. — — des Wiener Beckens. I. 261, 744; II. a. 145, 163, d. 39. — -Floren (vergleichende Tabelle der). IX. 542. — -Kohle im Arvaër Comitat. II. d. 160. — — in Brasilien. VI. 196. — — von Cadibona. X. V. 18. — — von Carpano. X. V. 117, 118. — — von Cosina. VIII. 363, 814. — — in Croatien. VII. 738; VIII. 161. — — des Drann-Thales. X. 213, 217. — — von Edelény. VII. 697. — — von Eger. VII. 327; VIII. 468. — — von Falkenau-Elbogen. VII. 186, 187; VIII. 495, 502. — — von Fohnsdorf. VI. 172, 176, 177. — — von Gottschee. IX. 395. — — um Gran. IV. 140, 403; VIII. 796, 797; X. 500, 501. — — von Hagenau und Starzing. III. a. 189, b. 40; X. 134, 135. — — des Hausruck-Waldes. VII. 164, 174. — — von Hrastnigg. II. c. 11; X. 181. — — des Isthmus von Korinth. IX. V. 86. — — von Istrien und Dalmatien. II. d. 138, 140. — — von Klein-Semmering. V. 559, 560, 561. — — von Leoben. I. 739. — — des Lubnitzer Grabens. VIII. 815. — — von Miesbach. VI. 435, 436, 437, 439, 440. — — in Mittel-Ungarn. X. V. 64. — — von Mottnig. X. 185,

POLITECHNIKA GDAŃSKA ZAKŁAD GEOLOGII

186. — — von Monte Promina. II. d. 139; IV. 165. — — von Parschlug. IV. 171, 172. — — von Petschoje. X. 1. — — des Pristova-Thales. VIII. 288, 289. — — von Pulle. IX. 394. — — von Rein. IV. 434. — — von Rietzing. IX *V.* 149. — — von Rinegg. V. 202. — — des Saazer Beckens. IX. 523, 525, 531. — — von Sagor. VIII. 229, 230, 231, 232. — — von Salzhausen. X. 521, *V.* 108. — — von Strakonitz. V. 315. — — im südlichen Mähren. IV. 44. — — von Thallern. IV. 277. — — von Trifail. X. 181. — — von Tüffer. X. 178, 179. — — in Unter-Steiermark. X. 171, 172, 175, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 191. — — (von Voitsberg, Köflach und Lankowitz. VI. 872, 873; VII. 543, 556, 560. — — von Wildshuth. I. 599. — — von Zillingdorf und Neufeld. II. d. 47. — -Miude von Guttaring. VI. 188. — — der Recca. X. 302, 323, 324. — — der Thurócz. X. *V.* 78. — -Petrefacte von Baden bei Wien. II. d. 105. — — von Belgrad. V. 891, 892. — — von Brunn am Gebirg. II. d. 119. — — von Csurgo. VIII. 185, 186. — — vom Eichkogel. II. d. 122; IX. *V.* 160; X. 25, 26. — — der Faluns. I. 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597. — — von Gainfahren. II. d. 106. — — von Gauderndorf. I. 668; II. d. 113. — — von Gaunersdorf. II. d. 117. — — von Girgenti. V. 218. — — des Graner Gebiets. IV. 405. — — von Grinzing. II. d. 107. — — von Grund. I. 362; II. d. 112. — — von Imola. IV. 181, 182. — — des Kienbergs. I. 675; II. d. 111. — — von Lemberg. II. a. 163. — — von Littenschitz, Lomnitz und Rossitz. IV. 703. — — von Loibersdorf. I. 665; II. d. 113. — — von Malomeritz. III. a. 147, d. 77; IV. 324; VI. 184. — — von Margarethen. II. d. 121. — — von Meissau. I. 663; II. d. 114. — — von Molt. I. 666. — — von Monte Promina. III. a. 193, IV. 165. — — von Nemesey. IV. 192, 193. — — von Neudorf. I. 676. — — von Nikolsburg. II. d. 111. — — aus dem nordöstlichen Kärnthen. VI. 187. — — von Nussdorf. II. d. 109. — — in Ost-Galizien. II. a. 88. — — von Ottnang. I. 163; IV. 190. — — von Pirawart. IV. 426. — — vom Plattensee. VI. 652; VII. 197. — — von Pötzleinsdorf. II. d. 115. — — von Polschitza. VIII. 223. — — von Porstendorf. IV. 188; V. 761, 762. — — von Radoboj. II. a. 141. — — von Raussnitz. V. 209, 210. — — von Reps. X. *V.* 191. — — von Schallendorf. I. 671. — — von Schildbach, Löfflbach und Totterfeld. V. 565. — — aus Siebenbürgen. II. b. 173. — — von Steinabrunn. II. d. 110; IX. *V.* 67. — — von Tinnye. X. 568, 569. — — in Unter-Krain. IX. 379, 380, 382, 383, 385, 393, 396, *V.* 8. — — von Ursprung bei Mölk. IV. 275. — — im Waag-Thal. X. *V.* 76, 77, 78. — — der Windischen Bühel. VI. 296, 297. — — von Zogelsdorf. I. 667. — -Pflanzen von Aix in der Provence. III. a. 186. — — vom Belvedere bei Wien. I. 361; II. a. 145, 163, c. 39. — — von Bilin. II. a. 154. — — von Brennberg. IV. 638. — — aus dem Conglomerat bei Innsbruck. VIII. 367, 780. — — von Erdöbenye. II. b. 178. — — von Erlau. V. 211. — — der Euganeen. III. b. 171; IV. 114; VI. 886. — — von Fohnsdorf. IV. 177. — — von Gleichenberg. VI. 287, 288, 289, 290. — — von Heiligenkreutz bei Kremnitz. III. d. 127, 128; V. 229, 230. — — im Kaiserthum Oesterreich. I. 679. — — von Kremniczka. III. c. 157. — — des Leitha-Gebirgs. III. d. 47. — — von Oedenburg. IX. *V.* 148. — — von Radoboj. I. 364. — — von Sagor. II. b. 185, 186, 188. — — vom Seegraben. I. 735. — — von Sotzka. I. 552. — — von Szakadat und Thalheim. III. d. 134, 135. — — von Tokaj. III. a. 169; V. 202. — — von Trofajach. IV. 424, 425. — — von Wittingau. III. d. 144. — — (dicotyledone). II. b. 178, 179; IV. 175. — -Sand von Malomeritz. III. a. 145, d. 78, 80. — — bei Stockerau. IX. 129, 130. — — im südlichen Mähren. IV. 39. — — im Viertel unter dem Mannhartsberg. III. d. 19. — — (gelber) bei Ofen. VIII. 320, 323. — — — bei Speising. X. *V.* 48. — -Sandstein im Falkenau-Elbogner Becken. VIII. 493. — — im Viertel ob dem Wienerwald. IV. 275. — — im Viertel unter dem Mannhartsberg. III, d. 21. — -Schotter der Karawanken. VII. 645, 646, 659, 669. — — (gelber) im westlichen Mähren. IX. 61. — -Terrasse von Mölk. IV. 282. — — von Raune. I. 395. — — der Wochein. VII. 687. — -Tuffe. VIII. 405, 447, 449. — -Wiener-Sandstein. II. c. 117, 118; IX. 122, 126; X. 264, 269, *V.* 5, 6, 8. Thalbildung in den Alpen. II. b. 33, 36, 43, 54. — des Böhmerwaldes. VI 11. — der Bukowina. VI. 114. — der Carnia und des Comelico. VII. 431, 432, 435. — in den Central-Alpen. V. 794, 800, 803. — im Enns-Thal. IV. 481, 482. — der Kalk-Alpen. II. b. 49. — des Mur-Thales. VII. 713, 714. — in Ober-Krain. IX. 267. Thierschädel aus den Keltengräbern bei Hallstatt. I. 352. Thon mit Bohnerzen im Dachstein-Gebirg. V. 198. — von Elhotten. VI. 799. — aus zersetztem Glimmerschiefer. V. 487. Thone, Analysen. V. 641; VII. 151, 603; VIII. 152; X. 697, Anh. 44. Thon (feuerfester) von Rév. III. a. 25, 160; X. Anh. 44. — — von Turrach. IX. 228. — — von Wobora. VII. 128. — — Analysen. V. 868; VIII. 154, 361; IX. 172; X. Anh. 43, 44. — (plastischer). V. 104; VIII. 483, 500, 501. — -Eisenstein im Karpathen-Sandstein. VI. 131, 132. — — Proben und Analysen. IV. 398, 824; VI. 161; VII. 153, 806; VIII. 362; X. Anh. 16, 17, 18, 25. — — im Salzburgischen. V. 385. — — im südlichen Böhmen. V. 233. — — (jurassischer) im mittlern Mähren. V. 686, 687. Thonerde-Präparaten (Verfahren zur Darstellung von). VII. 166. Thongeschirr aus dem Diluvium. X. *V.* 113. Thon-Glimmerschiefer. III. c. 45, d. 37; VI. 194, 195, 623, 624; VII. 718; IX. *V.* 120. — — der nordöstlichen Kalk-Alpen in

Tirol. VII. 718; IX.V. 120, 121. — -Gyps von Hallein. V. 607, 608. — -Kieselschiefer (eisenhältige). V. 376. — -Mergel, Anal. VIII. 810; X. Anh. 42. — — (hydraulischer) Anal. III. a. 161; X. Anh. 43. — -Porphyr als Gang. VII. 109. — -Schiefer, Analysen. V. 872; X. Anh. 32. — — der Central-Alpen. V. 778. — der Gailthaler Schichten. X. 161, 162, 163, 164, 169, 205, 206, 207. — — des Hüttenberger Erzberges. VI. 623, 624. — — in Kärnthen. VI. 515, 517, 518, 527. — — von Lienz. VI. 445. — — im mährischen Gesenk. V. 93, 94, 95. — — am nördlichen Abhang der nordöstlichen Alpen. I. 28. — — im Pilsener Kreis. VI. 488. — — des Rosalien-Gebirgs. V. 491, 492. — — in Steiermark. V. 544, 564. — — in dem Zips und dem Gömörer Comitate. X. 541. — — (Eisensteine der Gailthaler). X. 206, 207. — — (Kupfer führender) von Grasslitz. X. 350. — — (silurischer). VII. 101, 103, 116. Tiden-Phänomen der Ostsee. IX. V. 123. Tiefen (vereinfachte Darstellung der Höhen und). IX. 234, V. 59, 60. — -Zonen der jetztlebenden Flora und Fauna der Britischen Meere. IX. 607, 608, 609, 610, 611, 612. Titan in Hochöfen. I. 151. — -Eisen. IV. 249. Titanit in Amphibolit. VI. 718, 784. — in Granit. VI. 370. — in Syenit. III. a. 142. Töpferthon von Rév. III. a. 26. Topas. (Dupoisat's vermeintlicher Demant.) IX. V. 108. Topfstein von Chiavenna. VII. 749. Topographie des Körös-Thales. III. a. 16. — von Nagyág und Umgebung. VIII. 86, 711, 722. — (neuere Arbeiten im Gebiete der). IV. 283. Torf. Analysen und Proben. III. a. 158, 166; IV. 152; IX. 298; X. Anh. 66. — im Arvaër Comitat. II. d. 161; III. a. 166; X. Anh. 68. — in Kärnthen. VI. 566, 567. — im nordwestlichen Mähren. X. 232. Torflager im Kaiserwald. VII. 513, 514. — bei Laibach. VII. 200. — von Ronach. V. 791. Torfmoore in Bayern. III. a. 195. — im Böhmerwald. VI. 171. — im Egerer Kreis. VIII. 81, 487. — im nördlichen Böhmen. VII. 332. 494. — im südlichen Böhmen. V. 233, 270. Trachyt, Analysen. X. 71, 78; X. Anh. 34. — des Büdös-Bergs. IV. 169. — von Eperies-Tokaj. X. 436, 438. — von Gleichenberg. VI. 267, 268, 292. — von Király-Helmécz. IX. V. 156. — des Leitmeritzer Mittelgebirgs. IX. 412, 417. — von Mittel-Ungarn. X. 486, 490, 508, 515. — um Nagyág. VIII. 99, 100, 106, 113, 714, 715, 723. — Nulliporen-Kalk durchbrechend. X. 510. — von Orgiof. IX. 2, 3, 9, 66, 73. — von Telkibánya. IX. V. 98, 150. — im westlichen Mähren. IX. 58. — in Bezug zum Wiener Sandstein. IX. 66. — (Bruchstücke fremder Gesteine im). IX. 78. — (erzführender) im nördlichen Siebenbürgen. VI. 129. — (phonolithischer). IX. 414. — (secundäre Mineralbildungen im). IX. 75, 76. Trachytes (chemische Beschaffenheit des). IX. 70. — (mineralogische Zusammensetzung des). IX. 69, 72. — (Verwitterung des IX. 77. Trachyt-Gebirg von Banow. IX. 63, 72, 75, 79, V. 44. — — der Hargitta. X. V. 133, 134. — — (edle Erz-Lagerstätten im ungarischen). X. V. 71, 72. — -Gesteine (magnetische Polarität der). VIII. 684, 686. — -Porphyr in Ungarn. X. V. 36. — — von Vöröspatak. II. d. 67; III. c. 57, 61. — — (Abscheidung der überschüssigen Kieselsäure im). IX. V. 47, 48. — -Tuff von Telkibánya. IX. V. 151; X. 444. Trapp der Kupfer- und Eisen-Region in Nord-Amerika. IV. 408, 409, 411, 413, 415, 416; VII. 787, 789. Trias bei Bleiberg. VII. 69, 76, 77, 80, 337. — der Carnia und des Comelico. VII. 440, 441, 445, 454. — der Central-Alpen. V. 849, 851, 852. — bei Eisenerz. V. 401. — bei Idria. VII. 838, 839. — von Inner-Krain und Istrien. X. V. 11, 12. — des Isonzo-Thales. IX. 334, 335, 359, 360, 361. — in Kärnthen. VI. 347. — in den Karawanken. VII. 645, 649, 652, 654, 661. — über Lias und Flysch. X. 117. — der Lombardie. VI. 887, 888. — von Montenegro. X. V, 25, 26. — der nordöstlichen Alpen. III. b. 47, 59, 60, 61, 62, 65; IV. 715, 716, 721, 725, 774, 784. — der nordöstlichen Kalk-Alpen in Tirol. VII. 721. — im nordöstlichen Ungarn. X, 408. — in Nord-Tirol. X. 87. — in Ober-Krain. VIII. 212, 215, 216, 221, 228, 229. — im östlichen Kärnthen. V. 893; VII. 337, 374. — im Randgebirg des Wiener Beckens. X. 257, 261. — des Rhäticons. X. 114. — in Süd-Steiermark. VIII. 436. — in Süd-Tirol. X. 85, 87. — in Unter-Krain. IX. V. 48, 49. — in Vorarlberg. VIII. 796; X. 78, 79, 80, 85, 112. — um Weimar. IX. 158. — in der Zips und im Gömörer Comitat. X. 544. — der Zugspitzwand. VII. 378, 379. — (dunkle Kalke der). III. b. 65, 69, 71; V. 402, 834, 835; VII. 417; VIII. 216; IX. 260. — (Grenze der obern und untern). X. 80. — (krystallinische Silicat-Gesteine der). VII. 444. — (obere) der Lombardischen Alpen. IX. 137, 456, 465. 466. — (untere) der Lombardie. IX. 462, 465. — -Kalk (unterer) der Lombardie. IX. 462, 463. — -Petrefacte. VIII. 157, 213; IX. 139, 267, 335, 337, 340, 465, V. 40. Trochiten-Schichten des Muschelkalkes. IX. 159. Trümmer-Porphyr um Marienbad. II. b. 27. Tuff von Gleichenberg. VI. 276, 278, 280, 282, 283, 284, 293. — des Leitmeritzer Mittelgebirgs. IX. 400, 408, 409, 410, 411, 424, 425, 427, 434, 435, 438. — mit Lignit. X. 511. — in Unter-Steiermark. X. 194, 195, 196, V. 14. — (basaltischer) zu Alt-Warnsdorf. X. 398. — (organische Einschlüsse im). VI. 285; IX. 403. — (trachytischer) der Hargitta. X. V. 134. — — im nordöstlichen Ungarn. X. 437. — — von Telkibánya. IX. V. 151. — -Gebirg der Avás. X. 455. — -Plateau von Munkács. X, 453. Tunnel am Semmering. I. 375, 579, 580. Turmalin von Eibiswald. I. 359, 360. — in Quarz. VI. 760; VII. 483. — -Granit. IV. 135, 136; V. 19; VI. 380, 381. — -Granulit. V. 15.

Turonien. IX. 359. Turritellen-Schichten. IX. 391. Tyres (Fabrication der) in England. III. a. 200.

Uebergangs-Gebirg in Böhmen. VI. 682. — — des böhmisch-mährischen Gebirgs-Systems. II. c. 101. — — der Karpathen. II. c. 99. — — in Mittel-Steiermark. VII. 236. — — in Ober-Krain. I. 402. — — in Süd-Steiermark. VIII. 414, 429. — — in der südwestlichen Steiermark. V. 345, 349, 356. — — von Turrach und der Stang-Alpe. V. 363. — — von Voitsberg und Köflach. VII. 247. — -Kalk am nördlichen Abhang der nordöstlichen Alpen. I. 28. — — im nordwestlichen Schlesien. IV. 11. — — in Steiermark. V. 548. 564. — -Schiefer des Bacher-Gebirgs. VIII. 272, 273, 287. — — in Nord-Steiermark. I. 117. Ueber-Schwefelblei. VI. 1. Uebersichts-Karte von Deutschland der deutschen geologischen Gesellschaft. II. b. 89. Unghvarit. VI. 96, 97; X. Anh. 14. Unio (Lea's Monographie der Gattung). IX. V. 4. Uran-Erze von Joachimsthal. VIII. 37, Anmerk. 2. — -Gelb. IV. 427, 428. — -Kalk-Carbonat. IV. 221; X. Anh. 15. — — -Kupfer-Carbonat. IV. 221, 222; X. Anh. 15. — -Oxyd-Oxydul. IV. 557. — Pecherz von Joachimsthal, Probe. III. c. 166; X. Anh. 28. — — von Přibram. IV. 105, 186; VI. 52. X. Anh. 28. Urgebirgs-Geschiebe auf den Dachstein. II. b. 159, 160. Urgonien. VII. 38; IX. 359. Ur-Thonschiefer in Böhmen. VI. 682, 686, 693, 701, 703, 730, 732, 733, 735; VII. 331. — — des Böhmerwaldes. VI. 753, 802, 806. — — des böhmischen Fichtelgebirgs. VII. 522, 524, 525. — — in Central-Böhmen. VI. 167. — — bei Edelény. VII. 700, 705. — — im Egerer Kreis. VII. 485, 489, 492; VIII. 13, 19, 21, 23, 24, 29, 41, 48, 59. — — des Kaiserwaldes. VII. 503, 508. — — von Melaphyr bedeckt. X. V. 115. — — im nordwestlichen Mähren. X. 224, 226. — — im nordwestlichen Riesengebirg. X. 388. — — der östlichen Sudeten. V. 388, 390. — — von Rabenstein. VII. 467. — — des Saazer Erzgebirgs. VIII. 533, 534, 539, 540, 543, 544, 547, 565. — — der Schneekoppe. X. V. 116, 117. — — (Erz-Lagerstätten im). VIII. 41, 48, 59. Urwälder des Böhmerwaldes. VI. 170, 171.

Vanadin-Bleierz. VII. 371. Variolit in Aphanit. VI. 606. Variolit-Fels in Mähren. III. b. 130. Vegetation-Beschaffenheit (Verhältniss der) zur Mächtigkeit der Kohlenflötze. III. a. 188. Vegetations-Grenzen in den Alpen. I. 223, 225, 302. — — im Böhmerwald. VII. 149. — bei Fiume. I. 231. Verdichtung der beim Erzrösten verflüchtigten Metalle. V. 430. Verdienst-Ordens (Friedens-Classe des k. preussischen) an Director Haidinger verliehen. VIII. 159, 160, 770. Verkieselung von Hölzern. IX. V. 2. Vermächtniss des k. k. FML. Mayer an die k. k. geologische Reichsanstalt. IX. V. 39, 40. Verordnungen über Bergwesens-Gegenstände. II. d. 171; III. a. 208, b. 173, c. 161, d. 151; IV. 197, 438, 867; V. 448. 646. 901; VI. 205, 656, 912; VII. 390, 615; VIII. 189, 390, 621, 818; IX. 511, 699; X. 143, 357, 469, 577. Verrucano. IV. 776, 782, 784; VI. 889, 890; VII. 17, 30; VIII. 166, 167, 183, 184, 796; IX. 456; X. 81, 89, 544. — der Lombardie. IX. 456, 457, 458, 461, 462, 463, 465. — in Vorarlberg und Nord-Tirol. X. 81, 83, 88, 89, 91, 118, 130. — in der Zips und im Gömörer Comitat. X. 544. — -Conglomerat. IX. 460. Versteinerungen: siehe „Petrefacte". Versteinerung des Holzes VIII. 729, 730, 731, 732; IX. V. 2. — lebender Pflanzen. VIII. 737, 738. Verwerfungen der Kreideschichten. VIII. 801. — der krystallinischen Schiefer. VIII. 543, 544. — des Rothliegenden. VIII. 708. Verwitterung der Kalkgesteine an der Oberfläche. II. a. 164. — des Quarz-Porphyrs zu Alunit. X. V. 118, 119. — des Trachytes. IX. 77. Verzinnungs-Legirungen. Analysen. VII. 158. Vesuvian im körnigen Kalk. VI. 486 Anmerk., 696; VIII. 165. Vesuv-Glimmer. VI. 410. Viehsalz. Analysen. II. d. 140, 141; III. d. 116, 117; X. Anh. 77, 78. Vilser Kalk in Vorarlberg und Nordwest-Tirol. VII. 30, 31, 33, 38. Vilser Schichten. IV. 768; VIII. 150, 801, 802; X. 415. Virgloria-Kalk. X. 82, 83, 87, 93, 94, 118, 119, 121, 123, 125, 130, 135, 136. Vitriolschiefer im südwestl. Böhmen. VI. 601, 603, 604. — (Tagbau auf) zu Hromitz. VI. 602. Vivianit. VII. 332; VIII. 66, 122, 479, 705. Vögelknochen in der Langenauer Höhle. VIII. 169. Voglit. VIII. 369. Voltzin. IV. 221; VIII. 35; X. Anh. 15. Vorgebirg der Alpen. III. b. 79. Vorhauserit. VIII. 358; X. Anh. 15. Vulcan (erloschener) im Hodritscher Thal. I. 159, 160. — — des Kammerbühels. VII. 533. — — von Orgiof. IX. 1, 67. Vulcane (erloschene) im Egerland. I. 687; VII. 493, 533. — — in Mähren und k. k. Schlesien. IX. 1, 10, V. 34, 35, 45. — — im mährischen Gesenk. V. 102, 103, 104. — — auf Taïti und Taïarapu. X. 570, V. 188. — — in Ungarn. II. c. 193. Vulcane (thätige) auf den Inseln Amsterdam und St. Paul. IX. V. 26, 27. Vulcan-Gebilde im nordwestlichen Riesengebirg. X. 394. 395. — — der Tertiärzeit im nordöstl. Ungarn. X. 436, 458. — -Gebirg von Leitmeritz. VIII. 812, 813; IX. 398. — — von Telkibánya. IX. V. 98, 150, 151; IX. 443, 444. — -Gesteine (magnetische Polarität der). VIII. 683, 689, 808.

Wad in einer Geode von Braun-Eisenstein. V. 188, 189. Wald (versteinerter) an der obern Aupa. VIII. 811, 812. — — bei Radowenz. VIII. 725, 728; IX. V. 1. Walderde Analysen. III. a. 160; X. Anh. 47. Wälder- (Wealden-) Formation. III. a. 180.

— -Thon. Pflanzenreste. II. b. 156, d. 143; III. a. 178. Warmquellen von Baden bei Wien. I. 57. — von Bikszád. X. *V.* 89. — von Dobel- (Topel-) Bad. VII. 243. — von Einöd. III. d. 139; V. 353. — von Franz Joseph-Bad. X. 199, 200. — von Gastein. I. 57; III. a. 197, 198; VII. 307, 316, 608, 609. — von Grosswardein. X. *V.* 89. — von Krapina-Teplitz. VII. 841; VIII. 805, 806; IX. 229, 276; X. Anh. 70, 71. — von Lucsky. IX. *V.* 133. — von Mehadia. II. a. 151, b. 93; X. Anh. 69. — von Monfalcone. IX. 471, *V.* 99; X. Anh 73. — von Neuhaus. VIII. 460. — von Okonina. VIII. 462. — von S. Stefano. IX. 689, 695, *V.* 100, 121; X. Anh. 71. — von Stubitza. VII. 603, 838; X. Anh. 70. — von Topolschitz. VIII. 461. — von Trentschin-Teplitz. IX. *V.* 132; X. 1. — von Tüffer (Römerbad). X. 199. — in Unter-Steiermark. X, 199. — von Vöslau. I. 57. — von Warasdin-Teplitz. III. d. 13; IX. 165, *V.* 68; X. Anh. 70. Waschgold in Australien. III. a. 148, 150. — im Bistritz-Thal VI. 132, 133. — im Böhmerwald. V. 210, 567, 569, 581, 582. — in Californien. II. c. 150. — in Mittel-Böhmen. VI. 403. — im Oesterreichischen Kaiserstaat. II. b. 164. — in Siebenbürgen, Ungarn und Böhmen. V. 230, 231. — im Silur-Gebiet von Böhmen. VII. 131. — im Ur-Thonschiefer von Böhmen. VI. 727, 728. Wasser (Hydrothion hältiges) im Halleiner Salzberg. V. 605. — (Pumpe für sandige). I. 93. Wassers (Bewegung des) in Canälen. II. b. 179, 180. — (Einwirkung des Kohlensäure hältigen) auf metallisches Eisen. X. *V.* 80. Wasserdampf-Röstung nach Cumenge's Methode. V. 421. Wasserfälle des Logar-Thales. VIII. 410. Wassergehalt (Zusammensetzung einiger Mineralien mit Rücksicht auf deren). V. 67. Wasserglas zur Präparirung von Petrefacten. II. d. 113, 114. Wasserkies in Braunkohle der Kreide. IV. 65, 66. Wasserlauf (unterirdischer) der Ponkva. VIII. 414. — — der Recca. II. a. 146, b. 184, 185. Wasserläufe (unterirdische) im Croatischen Küstenlande. VI. 418. — — im Isonzo-Thal. IX. 327. — — in Unter-Krain. IX. 263, 264, 265. — — in Unter-Steiermark. VIII. 410. Wasserleitungs-Röhren aus Kalkstein (Gossleth'sche). VII. 752, 753. Wasserrad von 36 Fuss Durchmesser. III. d. 132. Wasserwirthschaft des Přibramer Bergbaues. VII. 177. Wawellit auf Roth-Eisenstein. VII. 606; VIII. 66. Wehren-Verwässerung (continuirliche) im Salzberg zu Aussee. I. 411. Weichthier-Fauna der Eiszeit. IX. 605, 606, 613, 615, 616, 617, 620, 621, 626, 627, 637. — — (jetztlebende) der Britischen Küste. IX. 596, 597, 598, 608, 609, 610, 611, 612, 621. Weiss-Bleierz von Přibram. VI. 50. — — von Rochlitz. X. 21. Weisserz (Spath-Eisenstein). V. 335; VI. 639, 640, 647; VIII. 427. Weissigit. IV. 647. Weissstein im Böhmerwald. V. 11, 13, 575. — in Nieder- und Ober-Oesterreich. III. c. 40; IV. 268, 269, 280. — in Oesterreich, nördlich der Donau. I. 623. — im Rosalien- und Wechsel-Gebirg. V. 478, 491. — im Serpentin. IV. 168, 281, — siehe auch: „Granulit". Wellenkalk. III. a. 154; VIII. 298. Wenger Schiefer. Analyse. I. 733. — — in Tirol. III. c. 134, 135. Werfener (Trias-) Schichten. I. 602; IV. 716, 721, 784; VIII. 167. — — von Arnoldstein. VII. 645. — — im Birnbaumer Wald. IX. 359. — — des Dachstein-Gebirges. V. 196. — — bei Deutsch-Bleiberg. VII. 69, 76, 88. — — bei Dobschau. X. *V.* 79. — — des Drann-Thales. X. 205, 212. — — bei Füred am Plattensee. VI. 652. — — des Grintouz. IX. *V.* 127. — — bei Idria. VII. 839. — — in Kärnthen. V. 892, 893; VI. 547; VII. 339, 373, 374, 375, 634, 635, 666, 668. — — des Kanker-Thales. VII. 674. — — des Karawanken-Gebirges. VII. 635. — — in Krain. VII. 650, 651, 661. — — im Leogang-Thal. V. 149. — — der Lombardie. IX. 456, 462, 465. — — in Ober-Krain. VIII. 210, 212, 213. 214, 216, 218. — — von Perkupa. VII. 702. — — des Pezzaze-Thales. VI. 889, 895. — — von Pontafel. VI. 744. — — auf Porphyr. VIII. 438. — — des Posruk-Gebirges. VIII. 287. — — im Randgebirg des Wiener Beckens. X. 257, 261. — — im Salzburgischen. V. 118, 119, 149, 154, 155, 259, 371, 618, 609. — — mit Spath-Eisenstein. VIII. 184, 787. — — im Süden der Save. VII. 681, 682. — — des Sulzbacher Gebirges. VIII. 436. — — in Unter-Krain. IX. 267, 269, 271, 361; X. *V.* 60. — — in Unter-Steiermark. VIII. 270, 278; X. 163, 166, 180, 205, 212. — — in Vorarlberg und Nord-Tirol. VIII. 796; X. 78, 83, 87, 91. — — des Waag-Thales. X. *V.* 28. — — in der Zips und dem Gömörer Comitat. X. 554. — — (Analogon der) in der Lombardie. IX. 462, 465. — — (Breccien der). VII. 635, 661. 668. — — (Conglomerat der). VIII. 279, 280. — — (Erzführung der). VIII. 215. — — (gehobene). VIII. 682. — — (Gypse der). VII. 643, 651. — — (Petrefacte der). IV. 721; VIII. 213. — — (Porphyre der). VII. 636, 674; X. 197, 211. — — (Schichtenspaltung der). VII. 660. Werkzeuge, Waffen, Münzen u. dgl., in alten Bergbauen, Grabstätten u. s. w. gefunden. I. 197, 198, 206, 366, 553; II. b. 193; IV. 407; VII. 784; IX. *V.* 114; X. *V.* 113. Wetzschiefer in Nord-Amerika. VII. 780. — der Vilser Schichten. VII. 31, 33, 38. — (alpine) des Jura. VIII. 150. Widmannstetten'sche Figuren. V. 867. Wiener Sandstein. Analysen. V. 880; VI. 43, 44; X. Anh. 36, 37, 38. — — bei Greifenstein. IX. 123, 124, 126. — — des Gschliefgrabens. IX. 118. — — in Inner-Krain und Istrien. X. *V.* 8. — — der Kainach. VII. 220, 221. — — der Kreide. II. c. 119. — — bei Luhatschowitz. VII. 377. — — in Nieder-Oesterreich. III. a. 97. — — am nördl. Abhang der nordöstlichen Alpen. I. 47, 58, 624, 631, 632. — — zwischen Nussdorf und Greifenstein. X. 262, 264,

V. 5. — — im Randgebirge des Wiener Beckens. X. 257, V. 4, 37. — — von St. Pangraz. IX. 120. — — im Waag-Thal. X. V. 29. — — im westl. Mähren. IX. 55. — — zwischen Wien und Linz. X. V. 37. — — (Bruchstücke von) im Trachyt. IX. 78. — — (eocener). I. 58; II. c. 117, 118; V. 879, 897; IX. 104, 106, 108, 122, 126, V. 144; X. 264, 269, V. 5, 6. — — — in Nieder-Oesterreich. IX. 104, 108, 115, 120. — — (neocomer). IX. 108, 133; X. 263, V. 29, 37. — — (Thon-Eisenstein im). V. 385; IX. 57, 58. — — (Beziehungen des Trachytes zum). IX. 66. — — (Wülste im). V. 226. Wiener Sandsteine (Bindemittel der). V. 880; VI. 42; IX. 105; X. Anh. 36, 37, 38. Winkeleisen. Probe. VIII. 758; X. Anh. 29. Winkl (Seitenthäler) im Lungau. V. 819. Wismuths (Magnetismus des regulinischen). VIII. 655, 808. Wismuth-Erze von Joachimsthal. VIII. 37 Anmerk. 2. Wochenschrift (bergmännische) des schlesischen Vereines für Berg- und Hüttenkunde. X. V. 6. — (Dr. F. Stamm's technische). VIII. 803, 804. Wogen (Wirkung der) auf Glacial-Absätze. IX. 619. Wollaston-Medaille (Verleihung der). VIII. 177; IX. V. 54, 90; X. V. 45. — -Preises (Verleihung des). VIII. 177; X. V. 45. Woltschacher Kalk. IX. 347, 360, 361, 362, 364.

Xanthokon. III. d. 122.

Zechstein-Petrefacte aus Thüringen. VII. 812; IX. 175. Zerklüftung (rhomboïdale) des Granulites. V. 17. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen (Freiherrn v. Hingenau's Oesterreichische). IV. 171. — „The Geologist" in London. IX. V. 55. — für Realschulen (Dr. Hornig's). VIII. 372. Ziegelei (Mayerhofer's) im Schöttlgraben. V. 332. Ziegeleien (Miesbach'sche) bei Inzersdorf. II. a. 147, b. 80, 86. Ziegelerz von Rochlitz. X. 19. Ziegellehm im südwestl. Böhmen. VI. 618. Zink-Bergbau von Silberleiten. VIII. 802. Zink- (Galmei-) Bergbau von Wiesloch im Badischen. II. b. 175. Zinkblende in Gailthaler Schichten. VIII. 170, 212, 386. — mit Grünstein und krystallinischem Kalk in Ur-Thonschiefer. VII. 324. — mit Kern von Bleiglanz. VIII. 45. — von Přibram. VI. 59. Proben. VI. 157; VIII. 155; X. Anh. 28. — mit Spath-Eisenstein und Schwefel-Cadmium. VI. 123, 124. — auf Sphärosiderit. VII. 610. — in Ur-Thonschiefer. VII. 367. Zinkerze im Bleigebiet von Nord-Amerika. VII. 795, 797; IX. 504; X. Anh. 29. — von Petzel. VIII. 169, 170. — Proben. VI. 157; VII. 807; VIII. 155; IX. 296, 504, 697; X. Anh. 28, 29. Zinkindustrie in England. III. a. 172. — -Lagerstätten in Arkansas. IX. V. 104. — — von Schönstein, VIII. 438, 439. — -Oxyd (Lösung von salzsaurem) zur Aufbewahrung zoologischer Gegenstände. VI. 899. Zinkschliche. Proben. VII. 157, 807; X. Anh. 31. Zinkspath, pseudomorph nach Kalkspath. VII. 610. Zinkweiss. Probe. V. 871; X. Anh. 31. Zinnes in Böhmen (Vorkommen des). IV. 190, 191. Zinn-Bergbau im böhmischen Erzgebirg. VIII. 53, 56, 59, 61, 586. — — (alter) im böhmischen Fichtelgebirg. VII. 530. Zinnerze im Amphibol-Gestein. VIII. 61. — im Greisen. IX. 566. — (Beziehung der) zum rothen Gneiss. VIII. 583 Anmerk. Zinnerz-Formation im böhmischen Erzgebirg. VII. 323, 366; VIII. 49. 52, 53, 59, 71, 569; IX. 563, 564, 566, 573, V. 41, 42. — — im Karlsbader Gebirg. VII. 323, 324, 366, 499, 512. — — in Niederländisch-Indien. IX. 284, 285, 286. Zinnganges (Verwerfung eines). VII. 172. Zinngänge im Felsit-Porphyr. IX. 564. — im grauen Gneiss. IX. 562. — von Quarzgängen mit Mangan-Erzen durchsetzt. VIII. 71. Zinngewinnung in England. III. a. 173. Zinn-Granit im Egerer Kreis. VIII. 7. — — in Nord-Böhmen. VII. 319, 499, 366; VIII. 7, 53. Zinnseifen im nordwestl. Böhmen. VII. 319, 366; VIII. 80, 81, 491. Zinnober in Californien. II. c. 155. — bei Eisenerz. I. 31; II. b. 156. — in Guttensteiner Schichten. VII. 643. — im Karpathen-Sandstein. VI. 814. — im Kohlenschiefer von Monte Torri. VIII. 183. — von Pachernegg. V. 549, 563. — von Schemnitz. V. 223. — am Turrach-See. V. 365. — in Werfener Schichten. VI. 418. Zirbelkiefer (fossile) in Kalktuff. VII. 65, 66. Zirkon im Serpentin. V. 101. — (wasserheller) vom Pfitsch-Thal. IV. 836. Zoisit im Amphibolit. VI. 784. Zündung von Minen und Bohrschüssen durch Reibungs-Elektricität. VII. 828. Zuschlag-Schiefer von Werfen. Analyse. VI. 852. Zwerglöcher (Lagerstätten fossiler Baumstämme) im Basalt-Tuff. VII. 195, 231.

IV. Namen-Register (paläontologisches).

Abietineae (fossile). I. 361, 745; II. a. 155, b. 147; IV. 613. Abra alba. IX. 639. — Boysi. IX. 626. — intermedia. IX. 639. — obovalis. IX. 626. — prismatica. IX, 639. Acacia auriculata. I. 552. — Parschlugiana. II. b. 146. — phyllodinea. II. b. 179. Acanthodes pedestris. VII. 831 Anmerk. — sp. VIII. 182. Acer Aequimontanum. VI. 287. — campylopteryx. IV. 115. — eupterygium. IV. 115. — Hörnesi. VIII. 494. — Lignitum. IV. 115. — megalopteryx. IV. 115. — obtusilobum. IV. 115. — pegasinum. IV. 115. —

productum. IV. 300. — pseudo-campestre. IV. 115. — pseudo-creticum. II. d. 42. — pseudomos. IV. 115. — sepultum. III. d. 135. — tricuspidatum. IV. 115. — trilobatum. I. b. 186; IV. 115; V. 230; VI. 287; VII. 335; VIII. 367, 780; IX. *V.* 148. — sp. II. b. 188; IV. 287; VIII. 482. Acerites integerrima. I. 235. Acerineae (fossile). I. 745. Acerotherium incisivum. II. a. 136, 147, b. 83 (Tabelle), 161, d. 47, 121, 154; III. d. 46, 48; V. 521; VII. 608, 610; VIII. 320, 327, 365, 772; X. 512 Anmerk. Achatina porrecta. VII. 544. — sp. IV. 434. Acidaspis Buchi. VII. 357. Aclis des Wiener Beckens. VIII. 379. Acme des Wiener Beckens. VIII. 382. Acocephalus crassiusculus. VII. 832 Anmerk. Actaeon Ovum. I. 190. — ringens. VI. 311. — Stassyci. III. c. 136. — sp. II. a. 13. Actaeonella conica. VII. 737. — gigantea. I. 190; II. d. 55; IV. 485; IX. *V.* 131. — laevis. I. 190; II. d. 56. — Lamarcki. II. d. 58; VII. 737. — obtusa. VII. 737. — Renauxiana. VII. 735, 737. Actaeones des Wiener Beckens. VIII. 377. Adansonia (fossile Früchte von). VI. 886. Adeorbis (fossile) des Wiener Beckens. VII. 191. Aeger crassipes. IX. A. 40. Aeglina prisca. VII. 357. Aethophyllum stipulare. II. b. 145. — speciosum. VI. 896; IX. 460. Agathelia asperella. II. a. 161. Agathistegia. V. 749. Agaricia alveolina. IX. 115. — colliculata. IV. 379. — granulata. IV. 379. — infundibuliformis. IX. 115. — parallela. II. a. 162. Agnostus tardus. IV. 610; VII. 357, 358. Agrion (fossile). I. 365. — coloratum. VII. 831 Anmerk. Agromyza protogaea. VII. 831 Anmerk. Alecto ramea. II. a. 160. Alethopteris asplenioides. VIII. 218. — Defrancei. I. 403. — Lonchitidis. V. 197. — pteroides. VIII. 346, 350; X. *V.* 69, 194. — Sulziana. II. b. 145. — sp. I. 357. Algae im Alaunschiefer. IX. *V.* 78. Allamanda (fossile). II. A. 155; IV. 192. Alnites lobatus. VI. 287. Alnus Kefersteini. I. 235; II. b. 186, d. 41; III. d. 47, 126; IV. 179; VI. 297. — Nostratum. V. 559. — Prašili. VI. 287. — sp. II. b. 188; V. 211. Alphitonia sp. II. b. 188. Alveolina longa. III. a. 193, 194; IX. 115. — Melo. IV. 584. — sp. I. 272. Alyxia (fossile). IV. 192. Amblypterus sp. VIII. 182. Ammonites Aalensis. VI. 308. — abnormis. IV. 753, 757; V. 881; VI. 177; VII. 420. — Achilles. VI. 307. — Actaeon. II. c. 26; IV. 746. — Adelae. VI. 306, 307; X. 411, 415, *V.* 68. — Adeloides. III. a. 185; IV. 767. — Adnethicus. IV. 746, 748. — Altenensis. IV. 305. — alternans. VI. 306. — Amaltheus. II. c. 26; IV. 85, 382, 736; VI. 900, 901; X. 108. — amoenus. II. c. 29. — anceps. I. 188; IV. 780; IX. *V.* 48; X. 494. — — albus. VI. 305, 307. — angulatus. II. a. 165, c. 21, 24; IV. 736. — annularis. V. 682, 695. — Aon. I. 38, 49, 168, 645; II. b. 149, 150; IV. 723, 726, 728; V. 216; VI. 745; VII. 179, 338, 339, 444, 449, 453, 637, 729, 842; VIII. 217; IX. 268, 335, 338, 468, *V.* 18, 33; X. 82. — aratus. VIII. 143. — armatus. IV. 383. — asper. VI. 309. — asperrimus. VI. 311. — Astierianus. I. 189; II. d. 162; III. c. 141; IV. 333, 351, 391; VI. 309. — Athleta. I. 188; IV. 386, 780; V. 682, 695; VIII. 307; IX. *V.* 48; X. *V.* 68. — Beaumontianus. IV. 336. — Belus. III. a. 141. — Benacensis. III. a. 185. — Beudanti. VII. 20, 24. — bicarinatus. IV. 726. — bidichotomus. VI. 309. — bifrons. IV. 385, 746, 750; VIII. 144, 145; IX. 481, 484, 486. — bifurcatus. IV. 387, 775; V. 305. — binodosus. V. 893; VII. 724; VIII. 215. — bipartitus. VI. 306. — biplex. I. 188; II. d. 162; III. a. 143, 144; IV. 76, 86, 387, 775, 778, 780; V. 690, 695; VI. 306; VII. 19. — biplicatus. X. *V.* 101. — Birchi. II. c. 30; IV. 746, 749. — biruncinatus. IX. *V.* 48. — bispinosus. V. 305. — bisulcatus. IV. 735, 736, 782; VIII. 144. — brevispina. IV. 753, 754; VII. 420; VIII. 156. — Bronni. III. a. 185. — Bronnianus. IV. 385. — Buchardianus. III. c. 143. — Bucklandi. I. 39; II. b. 170, c. 24; III. 59; IV. 382, 386, 777, 782; VIII. 143, 144. — Cadomensis. IX. 483. — Callisto. VI. 307. — callosus. IV. 752, 753. — Calypso. I. 41; III. c. 137, 188; IV. 385, 751; VI. 304, 306, 307; VIII. 145; IX. 482. — canaliculatus. III. a. 185; IV. 767. — Carachtheis. III. c. 137, 138; VI. 306, 307; X. *V.* 68. — Cassida. VI. 311. — Cassianus. IV. 721, 723; V. 893. — Ceras. IX. 483. — ceratitoides. IV. 746, 747; V. 131; VII. 733. — Charmassei. II. c. 21. — Charpentieri. IV. 382, 747. — Collenoti. IV. 755. — colubrinus. VI. 311. — Comensis. IV. 385, 746, 750; IX. 482, 484. — complanatus. IV. 746, 749; IX. 484. — compressissimus. VI. 311. — Conybeari. II. b. 170, c. 20, 21, 24, 25, d. 58; IV. 382, 736, 746, 747, 777, 783; VII. 37, 733; X. 141, 259, *V.* 4, — Constantii. VI. 306. — convolutus. VII. 19. — — parabolis. III. a. 185; V. 682, 695. — cordatus. IV. 728; V. 682, 695. — Cornu copiae. II. c. 30; IV. 783. — Cornuelianus. III. c. 141. — Corona. VI. 305. — coronatus. VI. 307. — costatus. III. c. 134; IV, 85, 92, 95, 96, 381, 393. — Cottae. I. 250. — Coynarti. IV. 755. — Credneri. IV. 728. — crenatus. V. 682, 695; VI. 305, 306. — Cridion. II. c. 24, 28, 29; IV. 735, 736. — Crioceras. I. 50. — cristatus. III. c. 143. — Cryptoceras. I. 42, 162, 189, VI. 311, 312; IX. 45; X. *V.* 47. — cylindricus. IV. 753, 755, 783; VI. 177. — Cymodoce. VI. 307. — Čžjžeki. IV. 753, 756; IX. 482. — denarius. III. c. 142. — dentatus. VI. 306. — denticulatus. VI. 306. — depressus. VI. 308. — Deshayesi. VI. 311. — Desplacei. II. c. 30; IV. 749; IX. 482. — Didayanus. VI. 311. — Didayi. VII. 735. — difficilis. I. 189; VI. 311. — difformis. IV. 383; VIII. 145. — diphyllus. III. c. 137, 141; VI. 306. — discoides. IV. 385. — Dontianus. X. 95. — Doricus. IV. 754. — Duncani. VI. 306. — Duvalianus.

III. c. 141; VI. 311. — Dux. X. 95. — Emerici. III. c. 141; VI. 311. — Erato. III. a. 185; IV. 765, 768; VI. 307; X. 415. — Erbaënsis. IX. 482. — Eucharis. VI. 306. — Eudesianus. IV. 765, 767, 779; IX. *V.* 48. — Eugenii. VI. 305. — Eumelus. VI. 306. — Eupalus. VI. 307. — eximius. IV. 746, 758; VII. 733; IX. 482.. — exornatus. IX. *V.* 58. — Falcula. VI. 306, 307. — fasciatus. IV. 387; IX. *V.* 48; X. *V.* 69. — fascicularis. III. c. 138, 141; VI. 311. — Ferstli. IV. 746, 748. — fimbriatus. I. 254; II. c. 30; IV. 385, 746, 781, 782, 783; V. 131; VI. 308; VII. 37, 732, 733; VIII. 145; IX. 482, 483, 484. — floridus. I. 43; VI. 743, 908; VII. 67, 72 Anmerk., 78, 83, 84, 338, 373; VIII. 179. — galeatus. II. c. 29; VI. 311. — galeiformis. I. 38; II. b. 149; IV. 726, 864; VI. 743; VII. 839; VIII. 216. — Gaytani. I. 37; IV. 726; VII. 339. — Germari. III. c. 142. — Gervillei. IX. 482. — Gosavicus. IX. *V.* 75. — granulatus. IX. *V.* 47. — Grasianus. I. 42, 189, 641; III. c. 137, 138, 141; VI. 305, 306, 307, 309, 311; VII. 735; IX. 45; X. 494. — Greenoughi. VIII. 156. — Grenouillouxi. II. c. 26. — Guettardi. III. c. 137. — Haloricus. IV. 765. — hecticus. IV. 85; VI. 306. — heliacus. IX. 487. — Henrici. IV. 767. — heterophyllus. III. a. 184, 185; IV. 360, 385, 746, 750, 751, 756, 766; V. 131; VI. 308; VII. 8, 37, 607, 732, 735; VIII. 156; IX. 482, 484, 486. — Hierlatzicus. IV. 753, 754. — Hommairei. I. 188; II. c. 26; IV. 745, 765, 766, 779, 780; IX. 343. — Hugardianus. III. c. 143. — Humphriesianus. I. 41, 168; III. a. 185; IV. 477, 751, 765, 766, 779; IX. *V.* 48. — Jamesoni. II. c. 25, 27, 30; IV. 746, 753, 754; V. 131; VI. 183. — Janus. V. 882. — Jarbas. I. 38; II. c. 27, 29; IV. 726, 734; VI. 908; VII. 67, 84, 339, 637, 729, 839; VIII. 216. — Jeannoti. VI. 309. — imbricatus. IV. 86, 360. — inaequali-costatus. I. 189; III. c. 141. — incertus. I. 189. — inflatus. I. 168, 635; II. b. 191; IV. 305; IX. *V.* 48. — — *β* binodosus. X. *V.* 69. — Infundibulum. I. 189; III. c. 138, 141; IV. 756; VI. 311; IX. 45. — intermedius. III. c. 141; VI. 311. — intricus. II. b. 150. — involutus. II. b. 191; VI. 305. — Joannis Austriae. I. 37; IV. 726, 734, 756; VI. 896, 908; VII. 67, 72 Anmerk., 84, 178, 338, 339, 373, 444, 453, 727. — Juilleti. I. 189; III. c. 141; IV. 311; X. *V.* 47. — Jurensis. I. 162. — Keindeli. IV. 382; VIII. 156. — Kudernatschi. IV. 765, 766; VI. 307; VII. 335. — laevis. V. 132; X. *V.* 68. — Lallierianus. VI. 305. — Lamberti. V. 695; VII. 19. — lamellosus. V. 132; X. *V.* 68. — latus· IV. 86; V. 133. — Lavizzarii. IX. 482. — Layeri. II. b. 150; VIII. 156. — Lilli. VIII. 144. — lineatus. II. a. 165, c. 26; IV. 385. — lingulatus canalis. VI. 306. — Lipoldi. IV. 753, 756; VII. 335. — Lynx. IV. 755. — macrocephalus. II. b. 191. — Majorianus. III. c. 142, d. 34; IV. 336. — mammillatus. III. c. 142; VII. 20. — Mantelli. II. a. 140; IV. 336; VI. 311; VIII. 157. — Martinii. III. c. 141; IV. A. 391; VI. 311. — Masseanus. II. c. 26; IV. 746, 749. — Matheroni. III. c. 141; VI. 311. — Maugenesti. II. c. 25; IV. 746, 748. — Mercati. IX. 482, 484. — Metternichi. II. b. 149, 150; III. c. 135. — Milletianus. III. c. 142; IV. 336; VI. 312. — Mimatensis. IV. 385, 386, 746, 750; V. 131; IX. 482. — Moreanus. I. 189; II. c. 21; IV. 735, 736. — Morelianus. X. *V.* 47. — Morloti. I. 38. — mucronatus. IV. 385, 586; IX. 482. — Mulgravius. IV. 749. — Murchisonae. VI. 308, 312. — Neocomiensis. III. c. 138; VI. 307, 311; X. *V.* 47. — Neo-Jurensis. I. 38; II. b. 150; IV. 724. — Neubergicus. IX. *V.* 75. — Nisus. X. *V.* 47. — nodosocostatus. I. 189. — nodosus. III. a. 154. — Nodotianus. IV. 745, 746, 747; IV. 183. — obliquecostatus. IV. 735, 736. — oculatus. IV. 780; VI. 306, 307. — oolithicus. IV. 768; IX. *V.* 48. — opalinus. VI. 308. — ophioides. IV. 754. — oxynotus. III. b. 59; IV. 753, 754; VIII. 156. — Parkinsoni. IV. 751. — Partschi. II. c. 26; IV. 746, 751, 753, 756; IX. 482, 486. — peramplus. I. 250, 252; V. 721; IX. *V.* 73, 75. — perarmatus. I. 188; IV. 780; V. 682; VI. 305, 307. — Petersi. VIII. 156. — Pettos. IX. 486. — picturatus. III. c. 138; IV. 756; X. 411. — planicosta. IV. 385, 753. — planicostatus. IV. 746, 748, 754, 781. — planulatus. IV. 336. — plicatilis. II. b. 191; VI. 305, 306; X. *V.* 68. — polygyratus. II. b. 191; VI. 305, 307; IX. 481. — polyplocus. II. b. 191: IV. 386; VI. 307. — polystoma. III. a. 185; IV. 766. — ptychoicus. III. c. 137, 138; IV. 765, 766; VI. 304, 306, 307, 311; IX. *V.* 47; X. 411, 415, *V.* 68. — pulchellus. VI. 311. — pustulatus. VI. 306. — pygmaeus. IV. 385, 386, 757. — quadrisulcatus. I. 162, 189; III. a. 185; IV. 387; X. *V.* 47. — Quenstedti. IV. 382, 747. — radians. II. c. 26, 30; IV. 383, 385, 477, 746, 749, 781; V. 131; VI. 743, 900, 901; VII. 10, 18, 27, 30, 31, 35, 36, 37, 420, 423; IX. 481, 482, 484, 486; X. 108. — Radisensis. VI. 306. — Ramsaueri. II. c 29; IV. 726. — rarecostatus. I. 39; II. d. 162; IV. 382, 745, 746, 748; VII. 27, 420, 733; IX. *V.* 94; X. 108. — rectecostatus. I. 189; III. c. 141; VI. 310. — Regnardi. II. c. 25; IV. 748. — Requienianus. IV. 385; IX. 482. — respondens. IV. 724, 726; VII. 729. — Reussi. IV. 746, 751. — Roberti. IV. 746, 748. — robustus. V. 204. — Rogosnicensis. VI. 305. — Roissyanus. I. 189. — Rothomagensis. VII. 326. — Rouyanus. III. c. 141; IV. 756. — Rüppeli. IV. 726. — salinarius. VIII. 150. — Salisburgensis. VIII. 156. — scaphiformis. V. 204. — semilaevis. IV. 753. — semistriatus. I. 162; VI. 309. — semisulcatus. II. c. 28; III. c. 137, 138. — Seranonis. III. c. 138; VI. 307. — seroplicatus. IV. 746, 750. — serpentinus. IV. 385; VIII. 145. — serratus. VIII. 143, 144. — Simonyi. I. 38. — simplus. VI. 305, 306, 307. — sinuatus. VI. 311. — solaris. IV. 749. — Stella.

IV. 753, 755, 783; VI. 177; VIII. 156. — stellaris. IV. 746, 747. — strangulatus. III. c. 138, 141; VI. 306, 307. — striato-costatus. IV. 360. — striato-sulcatus. III. c. 141. — subarmatus. IV. 746, 749; IX. 481, 484. — subfascicularis. II. b. 191. — subfimbriatus. I. 50, 189. — subobtusus. III. a. 185; IV. 765, 766. — subradiatus. IV. 765, 767. — subumbilicatus. I. 38; IV. 726; VII. 338. — Suessi. V. 881. — tardecrescens. IV. 746, 747. — tardefurcatus. III. c. 142; X. *V.* 29. — Tatricus. I. 162, 188; II. a. 147, c. 26; III. a. 185, 195, 307, 308, c. 127; IV. 387, 745, 746, 750, 751, 765, 769, 779, 780; V. 131; VI. 306; VII. 335, 607, 732, 733; VIII. 145; IX. 343, 481, 482, 483, 484, 486, *V.* 48, 82; X. 494, *V.* 68, 69. — Taylori. II. c. 26. — Texanus. IX. *V.* 75. — Thouarsensis. IV. 749. — tornatus. I. 38; II. c. 29; IV. 724; VII. 444. — tortisulcatus. I. 168; VI. 306; IX. *V.* 48; X. *V.* 69. — Toucasianus. VI. 306, 307. — tripartitus. IV. 765, 766, 780; VI. 307. — triplicatus. I. 41; X. 494, *V.* 69. — — albus. VI. 305, 306. — Turneri. IV. 746, 747, 777; VII. 8. — undatocostatus. VII. 735. — Valdani. II. c. 26; IV. 382, 746; VII. 10, 35; X. 108. — variabilis. VIII. 145. — Velleda. I. 181; IV. 336. — Viator. I. 188. — Walcotti. VIII. 143, 144. — Waterhousi. IV. 767. — Zetes. IV. 746, 750; VI. 307; IX. 482, 486. — Zignodianus. I. 188; II. c. 26, 28, 30; III. a. 185; IV. 745, 746, 748, 751, 765, 766, 779, 780; VI. 307; VII. 19, 335; IX. *V.* 47; X. 411. — sp. nova. I. 44, 163; VIII. 156. — sp. I. 635; II. c. 3; IV. 372, 385, 771; V. 697; IX. 470, *V.* 76; X. 95, 415. Amorphospongia incrustans. II. a. 162. Amphidesma minima. VI. 297. Amphimorphina Haueriana. V. 750, 752, 759. Amphion Lindaueri. VII. 357. Amphistegina sp. II. d. 108. — Haueri. III. d. 40, 50; VI. 351, 352; VII. 580, 583, 588, 589, 591; X. 264. — Haueriana. V. 752. — pusilla. V. 749, 751, 752. — rugosa. V. 752. Amphisyle Heinrichi. IX. 50. Amphitragulus communis. X. *V.* 19. Ampullaria perusta. X. 497, 506. — scalariformis. X. 499, 506. — Vulcani. VIII. 223. — sp. II. a. 13. Amygdalus Hildegardis. VIII. 473. — pereger. I. 393; IV. 115. — persicoides. VIII. 473. — Querculus. IV. 115. Ananchytes analis. I. 249. — bicordatus. I. 188; VIII. 301. — ovatus. I. 191, 244, 248, 250, 251, VII. 21; IX. 116; X. *V.* 77. — pyramidalis. I. 249. — striatus. I. 248, 249. — tuberculatus. I. 191, 192; VIII. 301. — sp. I. 247; VII. 836. Anatifa Bohemica. VII. 357, 358. Anatina Praecursor. IX. 478. Ancillaria buccinoides. III. a. 147; VI. 187. — canalifera. IV. 190. — glandiformis. I. 664, 671, 675, 676; II. b. 173, d. 106, 110, 111, 112, 165; III. d. 77; IV. 182, 188, 644, 704; V. 210, 747, 751, 891; VII. 353, 569, 571, 574; VIII. 323. — inflata. I. 671, 675; II. b. 180; III. a. 147; IV. 704. — obsoleta. IV. 182, 706. — sp. nova. I. 671. Ancillariae (fossile) des Wiener Beckens. II. d. 164, 165. Ancyloceras distans. VI. 306. — Duvalianum. III. c. 141. — Emericianum. VI. 311. — Matheronianum. III. c. 141; VI, 311. — Puzosianum. VI. 311. Andromeda protogaea. II. b. 186; III. a. 169; VII. 335. — sp. III. d. 135, 144. Andromedites paradoxus. II. d. 41, 43. Annularia longifolia. II. b. 172, d. 143; III. b. 170, d. 129; X. *V.* 194. — minuta. IV. 435. — sphenophylloïdes. VIII. 346, 350. — sp. VI. 226, 887; VII. 265. Anodonta lucida. X. *V.* 178. — minima. X. *V.* 178. — procera. X. *V.* 178. Anomalina Badensis. V. 758. — Rotula. V. 754, 758. — variolata. II. a. 163, 164. Anomalon mecolepis. VII. 831 Anmerk. Anomia aculeata. IX. 606. — costata. I. 663, 673; II. b. 170; X. *V.* 65. — electrica. IV. 645. — Ephippium. IX. 606, 626, 627, 649. — Squamula. IX. 649. — striata. V. 219. — truncata. V. 709, 711. — sp. VIII. 323. Anomopteris Mougeoti. II. b. 145. Anona limnophila. VI. 287. Anthomyia atavina. VII. 832 Anmerk. — latipennis. VII. 832 Anmerk. — Morio. VII. 832 Anmerk. Anthracotherium Dalmatinum. IV. 165; V. 873; VI. 184, 652, 898. — hippoideum. IX. *V.* 121. — Neostadiense. I. 166. — magnum. IX. *V.* 121, 135; X. *V.* 19, 53. — minimum. X. *V.* 19. — Sandbergeri. IV. 165. — Vindobonense. I. 166; II. a. 83. — sp. von Zovencedo. IX. *V.* 89, 121. Aphis macrostyla. VII. 832 Anmerk. — Morloti. VII. 832 Anmerk. — pallescens. VII. 832 Anmerk. Aphrophora spumifera. VII. 832 Anmerk. Apiocrinites ellipticus. I. 193; II. a 14. — rotundus. II. b. 165. — sp. II. a. 19. Apiocrinus Meriani. II. d. 168; IV. 54.—sp. IV. 386; VIII. 442. Apocynaceae (fossile). II. a. 188. Apocynophyllum lanceolatum. I. 236. — latifolium. VIII. 494. — primaevum. V. 740. — Russeggeri. III. c. 157; V. 230. — Sotzkianum. IX. *V.* 19. — sp. V. 211. Aporhaïs Pes pelecani. VII. 571, 574; IX. 606, 627, 652. Aptychus Alpinus. VI. 900; VII. 35, 36. — angulo-costatus. V. 441; X. *V.* 47. — applanatus. V. 443; IX. 43, *V.* 52. — depressus. V. 444; VII. 336. — Didayi. I. 236, 254; II. d. 162; III. c. 141; IV. 333, 351, 391; V. 440, 441; VI. 309, 311; VIII. 150, 810; IX. 45, 479, 488; X. 252, 416, *V.* 4. — Didayanus. I. 189. — fasciatus. IV. 387. — Gigantis. VI. 306. — imbricatus. II. d. 162; IV. 332; VII. 734: IX. 43. — — depressus. V. 444. — laevis. X. *V.* 68. — laevislatus. V. 443. — lamellosus. I. 41, 42, 254; III. c. 1, 4; IV. 97, 770, 777; VI. 306; VII. 336; IX. 343, 487; X. 411, 412, *V.* 68, 69. — latus. I. 41; II. d. 162; III. c. 1; IV. 91, 327, 332, 360, 387, 388, 770; V. 443; VI. 306, 448; VII. 346. — lineatus. V. 441; X. *V.* 47. — obliquus. VI. 306. — profundus. V. 443, 444. — pusillus. V. 441. — radians. I. 189. — rectecostatus. V. 442; VII. 743. — reflexus. V. 442. — striatopunctatus. V. 442; VII.

844; IX. 43, 52. — undatocostatus. V. 441. — undulocostatus. VII. 336. — sp. VII. 31; X. 413, 415, 417. Araneïtes Radobojanus. VII. 832 Anmerk. Araucarites Brandlingi. VIII. 727; IX. *V.* 1. — Rhodeanus. VIII. 728. — Schrollianus. VIII. 727, 728; IX. *V.* 1, 64, 105. — Sternbergi. II. a. 155; III. d. 144; IX. 345. — sp. VI. 887. Arbutus (fossile) sp. I. 734; III. d. 144. Arca antiquata. I. 597; II. A. 6; IV. 645. — barbata. VII. 355. — cardiiformis. I. 596. — Diluvii. I. 362, 665, 666, 673, 676; II. a. 141, b. 174, d. 106, 111, 113, 115, 152; III. d. 77; IV. 183, 189, 645, 707; V. 219, 748, 890, 892; VII. 192, 193, 355, 567, 571, 573, 575, 577, 578, 580; IX. 379, 380, 382, 383, 385; X. 187, *V.* 32, 65. — Génei. IX. 115. — glabra. II. b. 191; IX. *V.* 73; X. 230. — idonea. I. 668. — impressa. X. 24. — Ligeriensis. IX. V. 73. — Matheroniana. IX. *V.* 73; X. 230, *V.* 61. — mytiloides. I. 597; IV. 645. — Noae. I. 673; IV. 645; VII. 355. — nodulosa. I. 676; VII. 355, 576. — oblonga. I. 673; II. d. 112. — pectinata. I. 362, 673; II. d. 112; IV. 189; V. 748; VII. 355. — tetragona. I. 668. — undulata. II. b. 191. — sp. II. a. 14, 25, d. 56; IX. 385; X. *V.* 32, 33. Archegosaurus. IX. *V.* 96. Argiope Cistellula. VII. 589. — pusilla. VII. 589. Artemis exoleta. IX. 605, 644. — lineta. IX. 644. Artocarpidium cecropiaefolium. II. d. 41, 43. — integrifolium. II. b. 186. Arundo Goepperti. VII. 544; VIII. 367, 780. Asaphus nobilis. X. 482. — sp. VI. 611. Asilus bicolor. VII. 832 Anmerk. Aspidaria tetragona. VIII. 343, 351. — undulata. VIII. 343, 351. Aspidium Mayeri. X. 511. Aspidonectes sp. IV. 178. Asplenites elegans. III. d. 123. — sp. novae. III. d. 129. Astarte borealis. IX. 606, 607, 626, 627. — compressa. IV. 605, 607, 626, 627, 643. — — var. nulli-costata. IX. 606. — Danmoniensis. IX. 605, 642. — elliptica. IX. 606, 607, 620, 642. — Gayrensis. IX. 642. — Laurentiana. IX. 642. — incrassata. IV. 644; V. 219. — obruta. I. 672. — pisiformis. IX. 626, 643. — sinuata. II. a. 25. — suborbicularis. IV. 188; V. 748. — sp. II. b. 190, d. 56; IV. 707; VIII. 305; IX. 627, 642; X. 411, *V.* 23. Asterias laevis. I. 592. — quinqueloba. I. 244. — sp. II. a. 11. Asterigerina planorbis. II. a. 163; V. 751, 758, 762; VI. 351. Asterolepis. X. *V.* 19. Asterophyllites longifolius. VIII. 346, 350. — charaeformis. IX. 403. Asterophyllitae. II. d. 165. — (Uebergang der) in Calamiten. II. b. 192. Astraea Bouéana. II. a. 162. — composita. VII. 584. — corollaris. II. a. 161. — crenulata. IV. 189. — deformis. II. a. 162. — echinulata. IV. 355. — eminens. II. a. 162. — funesta. IX. 115. — helianthoides. VIII, 223. — lepida. II. a. 161. — microphylla. II. a. 161. — Moravica. II. b. 174. — porosa. VII. 240. — rudis. IX. 115. — Simonyi. II. a. 161. — spectabilis. II. a. 162. — vesicularis. II. b. 191. — sp. IV. 355; VII. 736. — sp. nova. III. d. 125. Astraeomorpha Goldfussi. II. a. 161. — pachyphylla. II. a. 161. Astrocoenia decaphylla. II. a. 161, d. 59. — formosa. II. a. 161. — formosissima. II. a. 161. — magnifica. II. a. 161. — ramosa. II. a. 161. — reticulata. II. a. 161. — tuberculata. II. a. 161. Astychus sp. V. 886. Atrypa sp. III. a. 181. Aucuba sp. II. b. 188. Auerochs (sub-fossiler) von Moosseedorf. VIII. 779. Aulophyllia astraeoides. II. a. 161, d. 5. — asperrima. II. a. 161. — Morloti. II. a. 161. — tenui-septa. II. a. 161. Aulopora ramosa. I. 248. — Serpens. III. a. 167. — sp. IV. 378. Auricula sp. II. a. 13. Avellana sp. II. d. 56. Avicennia (fossile). II. a. 155. Avicula Albertii. III. A. 153; VIII. 339. — bidorsata. VII. 84; IX. 335. — ceratophaga. X. 24. — contorta IV. 737; IX. 477; X. 107, 410, *V.* 23. — Cornueliana. IV. 361, 392; V. 139. — decussata. IV. 95, 361, 376. — Escheri. IV. 731, 735, 737; V. 127; VII. 26, 419, 730, 731. — gryphaeata. II. d. 162; IV. 376. — inaequiradiata. IV. 375, 392, 735, 737; VII. 731. — inaequivalvis. II. c. 23, 25; IV. 92, 361, 375, 383, 392, 738, 775, 781; V. 127, 139; IX. 176; X. 107. — intermedia. IV. 375, 376, 731, 734, 735, 738, 742, 744; V. 127. — lineata. I. 245. — macroptera. V. 139. — Münsteri. IV. 375, 775. — phalaenacea. I. 596. — Sinemurensis. VIII. 380. — socialis. I. 183; IV. 780. — speciosa. IV. 737; VII. 37, 336. — speluncaria. VI. 611. — striatapunctata. IV. 721. — Valenciennesi. X. *V.* 59. — Venetiana. IV. 721; V. 893; VI. 890, 894; VII. 340, 654; VIII. 157, 213; IX. 267. — Zeuschneri. IX. 267. — sp. IV. 91, 744; VII. 84, 424; IX. 267, 268, 478. Axinus angulatus. IX. 641 Anmerk. — obscurus. IX. 641 Anmerk.

Bactryllium Meriani. VII. 35. — Schmidti. VII. 35; VIII. 796; X. 95, 96, 100, 119, 124, 131. Bactrynium bicarinatum. VI. 449. Baculites Alpaghina. I. 190. — anceps. I. 162, 250; III. d. 34. — baculoides. VII. 20. — Faujasi. III. d. 34; IX. 48. — flexuosus. I. 190. — incurvatus. II. b. 190. — vertebralis. III. c. 142, d. 34. — sp. IV. 333, 351, 391; VI. 312. Bairdia abscissa. X. 28. — crystallina. V. 752. — latissima. V. 751. — procera. IX. 159. — Pyrum. IX. 159. — recta. V. 754. — Seminulum. X. 28. — subdeltoidea. VI. 352. — subradiata. V. 751. — teres. IX. 159. — tumida. V. 752, 763. Bakewellia costata. X. 24. Balaena Mysticetus (fossil). IX. 636. Balaenodon Lintianus. I. 163, 629. Balaenoptera boops (fossil). IX. 636. Balani (neogene). IX. 381. — auf fossilem Coniferen-Holz. IX. 813. Balanophyllia varians. V. 750, 751. Balanus balanoides. IX. 627, 658. — communis. IX. 658. — Coronula. II. a. 141. — Holgeri. I. 663, 665, 673; II. d. 113, 114. — miser. II. b. 190; IX. 656. — ornatus. II. b. 190. — porosus. I. 673.

— pustulatus. II. b. 190. — Scoticus. IX. 595, 602. — stellaris. VII. 593. — sulcatus. IX. 603. — Uddevallensis. IX. 658. — sp. III. d. 51; VII. 568, 569. Balsamifluae (fossile). I. 745; II. a. 152. Bambusa sepulta. III. d. 135; IV. 114. — sp. I. 364. Banisteria Gigantum. II. b. 186. Banksia longifolia. II. b. 186. — Ophir. II. b. 186. — Ungeri. II. d. 135; VIII. 495. — sp. II. b. 188; III. a. 176; VI. 886. Barysmilia tuberosa. II. a. 161. Bechera. II. d. 165. Belemnitella mucronata. II. d. 54. Belemniten (jurassische). VIII. 302. — (optische Eigenschaften der). VII. 830, 831. Belemnites acuarius. IV. 383. — — macer. VIII. 146. — bipartitus. I. 236, 254; III. c. 140; VI. 309, 311; IX. 488. — brevis. VII. 8, 10, 35. — canaliculatus. III. c. 1. — clavatus. I. 41. — Coquandianus. VI. 306. — digitalis. VII. 35. — dilatatus. I. 236; III. c. 140; VI. 309, 311; VII. 735. — d'Orbignyanus. IV. c. 140. — Grasianus. VI. 311. — hastatus. IV. 387, 770; V. 690, 695, 697; VI. 306; VIII. 306. — — impressus. VI. 307. — minimus. I. 245; VI. 251; VII. 24. — mucronatus. I. 245, 250, 252. — paxillosus. IV. 742. — pistilliformis. I. 236, 254; VI. 251. — polygonalis. III. c. 138; VI. 305, 307. — quadratus. VI. 310. — semicanaliculatus. VII. 735. — semihastatus. V. 682; VII. 19. — subdilatatus. III. c. 140. — subfusiformis. VI. 309; VII. 20. — subventricosus. I. 245. — tripartitus. IX. 481, 482. — — brevis. VIII. 146. — sp. II. c. 3; IV. 332, 372, 383, 387, 735, 752; VI. 332; VII. 732, 733; VIII. 156, 306, 307; IX. 334. Bellerophon bilobatus. VII. 357. — decussatus. X. *V.* 59. — nitidus. VII. 357. — sp. III. a. 168; VI. 611. Belonorhynchus striolatus. IX. *V.* 40, 75. Berenicea Flabellum. VI. 353. — sparsa. VI. 353. Betula affinis. III. d. 135. — Brongniarti. II. d. 41, 43; VIII. 739, 744. — Dryadum. IV. 115. — prisca. II. d. 41, 43, 45, 49; III. c. 157; IV. 478; V. 230; VIII. 507; IX. *V.* 149. — sp. I. 364, 600; V. 211. Betulineae (fossile). II. a. 152, 153, b. 147. Bibio enterodelus. VII. 832 Anmerk. — firmus. VII. 832 Anmerk. — fusiformis. VII. 832 Anm. — giganteus. VII. 831, 832 Anmerk. — gracilis. VII. 832 Anmerk. — incrassatus. VII. 832 Anmerk. — linearis. VII. 832 Anmerk. — maculosus. VII. 832 Anmerk. — Morio. VII. 832 Anmerk. Bibiopsis brevicollis. VII. 832 Anmerk. — maculata. VII. 832 Anmerk. — Murchisoni. VII. 832 Anmerk. — sp. VII. 832 Anmerk. Bifrontia sp. IV. 434. Biloculina iuornata. IV. 426. — sp. VIII. 227; X. *V.* 33. Biradiolites fissicosta. IX. 349. Bittacus sp. I. 365. Bivalva des Wiener Beckens. X. *V.* 174 Bolina Raibliana. IX. *V.* 40. Bolivina antiqua. II. a. 163; V. 748, 749, 751, 752, 754, 755, 758, 760, 761, 762, 763. — dilatata. V. 758. — sp. V. 763 Bombaceae (fossile). II. b. 188. Bombur Aonis. IX. *V.* 40. Borelis melanioides. X. 282, 293, 319. — ovoidea. X. 282, 293, 295, 319. Bos longifrons. IX. 628. — primigenius. IX. 628, 630; X. *V.* 52. — priscus. IX. *V.* 88; X. *V.* 52. — Urus (subfossiler). VIII. 779. Brachiopoda des Diphya-Kalkes. VIII. 300. — des schwarzen Encriniten-Kalkes. VII. 239. — im Sphärosiderit. VIII. 425, 429. — der Stramberger Schichten. IX. *V.* 55, 56, 57. — (Davidson's Classification der). VII. 386. — (devonische). VIII. 780 — (silurische). VI. 612; VII. 357, 359. Braconites (fossiler). VII. 831 Anmerk. Brachyphyllia depressa. II. a. 161. — glomerata. II. a. 161. Bridelia spinosa. VIII. 755. Brissopsis sp. VI. 354. Bromites Transsylvanicus. II. d. 74. Bronteus sp. IX. *V.* 57, 127. Brosmius sp. II. a. 157. Bryozoa des Caprotinen-Kalkes. VII. 24. — der Gosau-Schichten. II. a. 160 — der Nummuliten-Schichten. II. a. 162. — (tertiäre). VI. 353; VII. 584, 588, 589. Bubalus moschatus (fossil). VI. 874. Buccina (fossile) des Wiener Beckens. III. d. 136. Buccinum angiostoma. IV. 643. — angulosum. IV. 643. — asperulum. II. d. 152. — baccatum. I. 666, 668, 671; II. b. 146, d. 116; III. d. 137; V. 565; VI. 297, 300; VII. 698, 699; VIII. 321; X. 443, *V.* 65. — Badense. I. 671; IV. 706; V. 753, 754. — Caronis. I. 664, 671. — ciliatum. IX. 654. — clathratum. IV. 182, 642; V. 218. — columbelloides. I. 671, 675. — conglobatum. IV. 182, 642. — Conus. IV. 182. — costatum. I. 671. — costulatum. III. d. 77; IV. 182, 188, 643, 706; V. 747, 753, 754; IX. 383, *V.* 9. — Desnoyersi. I. 671. — Dujardini. IV. 643; VIII. 454; IX. 379, *V.* 149; X. *V.* 65. — duplicatum. VII. 353. — gibbosulum. IV. 182. — gibbulosum. IV. 643. — granulare. IV. 643. — Haueri. X. *V.* 65. — Humphreysianum. IX. 606, 654. — incrassatum. IV. 643, 706. — Labellum. IV. 643. — miocenicum. IV. 643; VII. 571, 574. — musivum. IV. 182. — mutabile. I. 671, 675; II. b. 174, d. 106; IV. 182, 188, 643, 711; V. 218, 747, 890; VII. 571, 574, 578; VIII. 454; IX. 379. — neriteum. IV. 182, 643. — obliquatum. IV. 182, 643. — Philippii. X. *V.* 33. — polygonum. IV. 182, 188, 643, V. 747. — prismaticum. I. 671, 675; IV. 182, 643, 707; V. 210. — pseudo-clathratum. IV. 643. — reticulatum. I. 675; II. a. 88, d. 106, 110; IV. 182, 188, 643; V. 747; VII. 574. — Rosthorni. I. 671, 675; III. d. 77; IV. 706; IX. 339, *V.* 149. — semistriatum. II. d. 152; IV. 182, 643; V, 218; X. *V.* 33. — senile. IV. 643. — serraticosta. IV. 182, 643; V. 218. — serratum. IV. 182, 634; V. 218. — subquadrangulare. IV. 190. — turbinellum. IV. 190, 643. — undatum. IX. 605, 607, 620, 627, 654. — Veneris. I. 596. — sp. II. a. 5, b. 190; IV. 426; VII. 565; VIII. 227; IX. 379. Büttneriaceae (fossile). II. a. 152, b. 188. Bulbus Smithi. IX. 606. Bulimina aculeata. II. a. 163; V. 748, 752, 754. — Buchiana. V. 754,

763. — elongata. II. a. 163; V. 750, 754, 762, 763. — pupoides. V. 754. — Pyrula. V. 752, 754. — ventricosa. V. 748, 750, 754, 755, 758, 760, 762, 763. — sp. VIII. 227. Bulimus sp. VIII. 479. Bulla Brocchii. II. b. 190; IV. 639. — convoluta. II. b. 190. — cylindroides. II. d. 117. — lignaria. I. 193; II. b. 190; IV. 639. — obtusa. IX. 626. — utricula. V. 753, 754. — sp. II. a. 5, 13. Bullae (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 382, 383. Bullina Lajonkairiana. II. d. 117. — sp. II. b. 190; VI. 297. Bumelia ambigua. II. d. 41. — eleaena. II. b. 186. — Oreadum. VI. 285. — sp. I. 558. Bythoscopus melanoneurus. VII. 832 Anmerk. Bythothrephis sp. IX. 333, *V.* 77.

Caecum des Wiener Beckens. VIII. 376. Caesalpineae (fosssile). II. b. 188. Caesalpinia miocenica. II. d. 45; III. d. 47. Calamitea sp. IX. *V.* 38. Calamites arenaceus. II. d. 143; IV. 742; VI. 956; VIII. 218; IX. 152, 458, *V.* 18; X. *V.* 58, 69. — Brongniarti. II. b. 192. — cannaeformis. VIII. 342, 344, 345, 347, 350, 603. — Cistii. V. 197. — communis. IX. 266. — cruciatus. II. b. 192. — ramosus. II. b. 192. — Suckowi. VIII. 603. — Transitionis. IX. *V.* 86. — varians. II. b. 192. — verticillatus. II. b. 192. — Volkmanni. III. d. 123. — sp. VI. 540; VII. 265, 273; VIII. 209. Calamophyllia fasciculata. II. a, 162. — fastigiata. II. a. 161, d. 59. — Simonyi. II. a. 161. — sp. IV. 329, 378. Calamopora Gothlandica. VII. 240. — sp. IV. 59; VII. 240. Callianassa antiqua. I. 46; V. 708. — Faujasi. I. 46. — sp. VI. 249. Callicoma. II. b. 159. Callipteris conferta. VII. 840. Callistemophyllum ambiguum. V. 740. Callitrites Brongniarti. III. a. 186; IV. 115. Calymene Arago. VII. 357, 358. — incerta. X. 482. — parvula. VI. 64. — pulchra. VII. 357. Calyptraea deformis. I. 672. — muricata. I. 668, 672, 676; II. a. 141; IX. 383. — Sinensis. IV. 639; VII. 354. — vulgaris. II. a. 89. — sp. I. 362; IX. 385. Calyptraeae des Wiener Beckens. VIII. 383. Camarophora Kissi. X. 554. Camptopteris credneriaeformis. III. a. 194. Campylodiscus Clypeus. VIII. 488. Cancellaria acutangula. I. 596. — acutangularis. III. d. 77; IV. 704. — ampullacea. IV. 706. — Bonellii. IV. 707. — buccinula. I. 672, 675. — calcarata. IV. 642. — cancellata. IV. 182, 188, 641; V. 747; VI. 179, 180. — costellifera. IX. 600, 627, 656. — hirta. II. b. 190; IV. 182; V. 218. — inermis. I. 672; II. d. 112; VI. 180; VII. 353. — lyrata. I. 672, 675; III. d. 77; IV. 182, 641; V. 210; VI. 180; IX. 379, *V.* 867. — mitraeformis. IV. 182, 642. — nodulosa. I. 672, 675. — paxillosa. IV. 641. — piscatoria. IV. 641. — serrata. IV. 182, 641. — spinifera. VI. 180. — suturalis. I. 672. — umbilicaria. I. 672, 675; II. d. 111. — uni-angulata. VI. 180. — varicosa. I. 672; II. b. 173; IV. 641; VI. 180; IX. 379, *V.* 8. — Westiana. V. 891. — sp. IV. 190. Cancellariae (fossile) des Wiener Beckens. VI. 179. Cancer Bosci. V. 886. — Bruckmanni. II. a. 13. — hispidiformis. IX. 116. — hispidus. V. 194. — Kressenbergensis. I. 52. — punctulatus. V. 886; VI. 187. — sp. II. a. 141; IX. 117. Canda elliptica. VI. 353. Canis Vulpes (fossil). I. 194. — sp. (fossil). IX. 629. Capitodus sp. IV. 189. Caprina Aquillonii. II. d. 59. — Coquandiana. II. d. 59. — paradoxa. I. 162. — Partschi. II. b. 122. Caprinae (Organisation der). V. 202, 203. Caprotina ammonia. I. 46; VII. 20, 24; IX. 347, 354; X. *V.* 11. — gryphoides. VII. 20. — Lonsdali. VI. 304; IX. *V.* 71. — trilobata. IX. 348. Capuli des Wiener Beckens. VIII. 383. Capulus Hungaricus. IV. 639; V. 890; IX. 650. Caranx Carangopsis. III. b. 161. — Carangus. III. b. 160. Carcharias heterodon. IX. 120. — megalodon. I. 239, 667; II. a. 13, b. 189; VI. 302. — productus. II. b. 189. — turgidens. II. b. 189. Carcharodon megalodon. VIII. 322. — polygyrus. II. a. 149. — rectidens. II. a. 149. — subauriculatus. II. a. 149. Cardinia concinna. IV. 743, 781. — Curionii. IX. 140. — depressa. X. 259, 411, *V.* 23. — Escheri. IX. 140. — Listeri. IV. 742, 743. — Meriani. IX. 140. — problematica. X. 103. — Securis. IX. 140. — sinuosa. IX. 140. — spissa. IX. 140. — sp. VI. 349, 893. Cardiocarpum acutum. III. d. 130. Cardiola interrupta. I. 29; V. 370. Cardita Corbis. IX, 643. — crenata. IV. 85; V. 127; VI. 347, 349, 896; VII. 728; X. 24, 102, 104. — decussata. IV. 346. — elongata. I. 672. — intermedia. IV. 645; V. 751. — Jouanneti. I. 596; IV. 645. — rhomboidea. IV. 645. — scalaris. IX. 627, 643. — trapezia. IV. 188; V. 748. — sp. II. a. 14; IV. 91; V. 756. Cardium aculeatum. I. 668; V. 219. — alutaceum. II. b. 190. — ambiguum. IX. 121. — apertum. II. b. 83 Tab., d. 118; IV. 427; IX. 383; X. 28. — Austriacum. IV. 735, 736, 777; VII. 37; IX. 477; X. 107. — bimarginatum. II. a. 25. — Carnuntinum. II. b. 83 Tab. 86; III. d. 41; IX. 381, 393. — ciliatum. IV. 183. — cingulatum. II. b. 190. — conjungens. II. b. 83 Tab., 86, 190, d. 118; IV. 274, 426, 427. — Convianum. X. *V.* 77. — Cottaldianum. II. a. 25. — Deshayesi. I. 673, 676; II. b. 174; VII. 192, 355, 564, 565, 572, 575; V. 383, 384. — Diluvii. IX. *V.* 114. — echinatum. V. 219; IX. 646. — edule. I. 668; IV. 183; IX. 620, 626, 645. — exiguum. V. 219; IX. 646. — gracile. I. 29; V. 370. — Groenlandicum. IX. 645. — Guerangeri. I. 162; II. a. 25; IX. *V.* 73. — hians. I. 597, 665, 668, 672; IX. 382, 383. — Hillanum. I. 50, 162; II. d. 58; VII. 327; IX. *V.* 113; X. *V.* 77. — hippopaeum. VIII. 185. — irregulare. II. b. 190. — Islandicum. IX. 645. — Kübecki. I. 665; II. d. 113. — laevigatum. IX. 646. — latesulcatum. II. d. 117. — minimum. V. 219. — oblongum.

I. 676; IV. 183. — Orbignyanum. IX. 121. — Ottoi. II. b. 191. — plicatum. II. d. 118; IV. 40, 709; V. 565, 566; VI. 290, 291, 297, 302; VII. 699; IX. 381, 382, 383, 384, 393. — productum. I. 162. — protractum. VI. 285, 291, 297. — Regelianum, X. 27. — Rhaeticum. IV. 735, 736; VI. 449; IX. 476, 477, 478. — ringens. V. 219. — striatulum. IV. 373. — subhillanum. III. c. 143. — transversum. VI. 290. — triquetrum. I. 37. 154, 162, 644; III. d. 135; VI. 894 und Anmerk.; VII. 67; VIII. 304, 305; IX. 139, 474; X. *V.* 192. — Vindobonense. II. d. 117; IV. 276, 405, 426, 427; V. 565, 566; VI. 285, 290, 291, 297, 301; VII. 355, 698, 699; VIII. 326; IX. 383; X. 27, 568, *V.* 65. — sp. II. a. 6, 7, 14, b. 190; IV. 426, 427, 704, 707; IV. 756; VI. 299, 349; VII. 564, 565, 650; VIII. 216, 227, 358; IX. 107, 121, 382, 385, 393; X. 127, 213, 568, *V.* 65. Carpinites macrophyllus. VI. 287. Carpinus grandis. IX. 403; X. *V.* 78. — Heeri. VIII. 739, 745. — macroptera. I. 235. — vera. III. d. 135. — sp. I. 364; VII. 334. Carpophyllum. VI. 240. Carya sp. IX. *V.* 149. Cassia ambigena. IV. 115. — ambigua. II. d. 41; V. 525; VIII. 494. — hyperboraea. IV. 115; VIII. 494. — Memnonis. IV. 115. — petiolata. IV. 115. — sp. II. b. 188; V. 211. Cassidaria bicarinata. IX. 121. — carinata. II. a. 53; IX. 120. — depressa. III. d. 139. — echinophora. III. d. 77, 139; IV. 182, 190, 642. — subcarinata. IX. 121. — tricarinata. IX. 121. — Tyrrhena. I. 671; III. d, 139. — (fossile) des Wiener Beckens. III. d. 139. Cassides (fossile) des Wiener Beckens. III. d. 138. Cassidulina crassa. V. 749, 758, 760, 763. — oblonga. V. 763, Cassidulus testudinarius. I. 355. — sp. X. 283, 294, 320. Cassis Cithara. I. 671. — Crumena· III. d. 138. — mammillaris. III. d. 138. — nodulifera. I. 675, 676. — Saburon. I. 664, 671; III. d. 138, 139; IV. 182, 190; V. 218; VII. 353. — sulcosa. III. d. 138, 139. — texta. I. 163, 165, 671, 675; II. b. 174; IV. 642; VII. 591; X. 217. — tuberosa. II. d. 106, 115. — variabilis. III. d. 138. — sp. III. d. 48. Castanea atavia. VI. 287, 290; IX. *V.* 19. — Kubinyi. II. b. 178; III. c. 157; V. 230; X. 456. Castellinia Aularthrophytum. X. 142. *V.* 91. Casuarina eocenica. II. b. 186. — sp. II. b. 188. Caulinites nodosus. IV. 115. Ceanothus Bilinicus. IV. 177. — macrophyllus. VIII. 739, 754. — polymorphus. I. 235, 396; VI. 300. — tiliaefolius. VII. 579. Celastrineae (fossile). II. a. 152. Celastrus Andromedae. II. b. 186; IX. 403. — eucleaeformis. VIII. 752. — Europaeus. I. 393; X. 511. — oreophilus. X. 215. — paucinervis. VIII. 750. — stylosus. VIII. 752. — sp. II. b. 186. Cellaria marginata. VI. 353. Cellepora angulosa. II. a. 162, 163. — Endlicheri. II. a. 163. — formosa. II. a. 162, 163. — globularis. II. a. 141, 162, 163; V. 746. — incompta. II. a. 162. — leptosoma. II. a. 162, 163. — megalota. II. a. 162, 163. — Münsteri. II. a. 162, 163. — multiradiata. II. a. 162. — ovoidea. II. a. 162, 163. — physocheila. II. a. 163. — polythele. V. 210. — pumicosa. IX. 659. — rarepunctata. II. a. 164. — rudis. II. a. 162. — tetragona. II. a. 163; V. 756. — trapezoidea. III. d. 77. — verrucosa. II. a. 163. — sp. II. b. 174. Celleporaria Reussi. VI. 352. Celtis sp. II. b. 185; IX. 345. Cemoria Noachina. IX. 606, 651. Cenopora sp. VIII. 305. Cephalaspis asterolepis. X. *V.* 35. Cephalopoda der Gosau-Schichten. IX. *V.* 75. — (liassische). VI. 183; VII. 826; VIII. 156, 763. — (silurische). VI. 611; VII. 357, 358. Ceratites binodosus. V. 893; IX. 464, 465. — Cassianus. V. 893; VII. 339, 684, 839; VIII. 213, 437; IX. 337, 340; X. 82, 83, 84, 164. — costatus. III. c. 135. — nodosus. IX. 159. — sp. VII. 441. Ceratopetalum Haeringianum. IX. 345. — sp. I. 557; II. b. 159, 186. Ceratotrochus duodecimcostatus. IX. *V.* 67. Cercopis Charpantieri. VII. 832 Anmerk. — fasciata. VII. 832 Anmerk. — Glückseligi. VIII. 502 Anmerk. — Haidingeri. VII. 832 Anmerk. — lanceolata. VII. 832 Anmerk. — pallida. VII. 832 Anmerk. — (fossile). III. a. 186. Ceriopora Globulus. II. a. 11. — nuciformis. I. 248. — radiciformis. II. a. 10. Cerithia der Gosau-Formation. II. a. 149, 150. — des Süsswassers. X. 317, 497. — (fossile) des Wiener Beckens. VII. 188, 189 — (Synonymik der). VI. 297 Anmerk. Cerithium angustum. V. 753, 754. — anomalum. II. d. 152. — articulatum. VII. 737. — bidentatum. I. 672. — Bronni. I. 675; IV. 188; V, 747; VII. 354. — calcaratum. VIII. 318, 778; X. 495, 499, 504, 506. — combustum. X. 504, 506. — conoideum. I. 162; II. d. 58. — convexum. VII. 573. — Cornu copiae. III. a. 194. — corrugatum. X. 504, 506. — crenatum. I. 675; II. b. 174; IV. 182, 640. — crenulatum. X. 504, 506. — Diaboli. VIII. 233. — disjunctum, VI. 297; VII. 354, 573; X. 569. — Doliolum. I. 675; X. 510. — Duboisi. VIII. 353. — elongatum. VI. 187. — gibberosum. I. 590. — gibbosum. IV. 188; V. 747. — giganteum. I. 52, 192; IV. 548; IX. 114. — granosum. II. c. 50. — granulinum. VII. 574, 577. — hexagonum. VI. 187. — inconstans. II. b. 146; V. 890; X. 443. — lamellosum. VI. 186. — Latreilli. II. a. 88; X. *V.* 128. — lemniscatum. I. 590. — Lignitarum. I. 675; II. b. 174; IV. 282, 704, 711; VII. 353, 571, 573, 575, 576, 577, 590, 592; X. 510, *V.* 65. — margaritaceum. I. 596, 666, 668; II. a. 5, 7, 8; VI. 437, 438, 439, 440, 441, 442; VII. 687; VIII. 223, 224, 321, 323, 778; IX. 345; X. 186, 508, 512 Anmerk., *V.* 29, 65, 78. — minutum. IV. 182, 188; V. 747; VII. 353, 581, 591. — mitrale. VII. 574, 575, 576, 577, 581. — mixtum. II. d. 152. — Moravicum. VII. 574. — mutabile. I. 672; VI. 186. — Obeliscus. II. c. 50. — papaveraceum. I. 672; VII.

353, 573. — pictum. I. 675; II. b. 174, d. 116; IV. 405, 426, 711; V. 565; VI. 285, 290, 296, 297, 300; VII. 354, 574, 575, 577, 578; VIII. 326; IX. *V.* 114; X. 27, 508, 569, *V.* 65, 128. — plicatum. I. 666, 668, 672: II. d. 116; IV. 405; V. 565; VI, 438, 441, 442; VIII. 321; IX. *V.* 83; X. 504 Anmerk., *V.* 29, 65, 78. — protum. VI. 291. — Provinciale. II. a. 150. — punctatum. IX. 626, 652. — rubiginosum. I. 675; II. d. 116; IV. 405; VI. 291, 296, 297, 300, 301; X. 569, *V.* 65, 128. — scabrum. IV. 182; V. 210; X. *V.* 124. — striatum. IV. 404; VIII. 318, 778; X. 497, 499, 506. — submitrale. VI. 296, 297. — tenuistriatum. II. b. 174. — Theodiscum. VII. 573. — Tiara. VII. 576, 577. — tricinctum. VII. 573. — trimonile. II. a. 150. — undosum. VI. 186. — varicosum. IV. 182, 640. — variolatum. IV. 640. — vulgatum. I. 666; IV. 182, 640; VI. 297; VII. 353. — sp. II. b. 174, d. 56, 58; IV. 426, 548; V. 753, 756; X. 281, 314. Cervus Dama-giganteus. V. 227, 527; VI. 307. — Elaphus (fossil). VIII. 338; IX. 628. — euryceros. I. 194; VI. 320, 327. — haplodon. II. b. 83, d. 121, 122; III. d. 46. — megaceros. IV. 861; VI. 198, 310, 416; VII. 161; VIII. 778, 779; IX. 433, 582, 628, 630, *V.* 113. Cetacea (fossile). IX. 636. — (tertiäre). VII. 163; VIII. 367, 780. Ceutastraea sp. IV. 378. Chaetetes pygmaeus. II. a. 11. — triasinus. X. 99. Chaetoëssus longimanus. IX. 51. Chama calcarata. IX. 121. — echinulata. IV. 183; V. 748. — florida. I. 595, 596. — gryphina. I. 665, 666, 668, 673, 676; II. d. 113; V. 210. — gryphoides. IV. 645. — Placentina. IV. 645. — sublamellosa. II. a. 14. Chamaecyparites Hardti. II. b. 186. Chara Helicteres. IX. 152. — inconspicua. X. 26. — Rollei. VII. 546. — Sadleri. II. d. 45; III. d. 47. — Stacheana. X. 282, 314, 316, 318. — sp. IV. 426, 427; X. *V.* 10, 49. Chelonii (Fährten von) im Wiener Sandstein. IX. 57, 127. Chemnitzia acutissima. IV. 753, 757. — Aldrovandi. IX. 137, 142. — Beyrichi. VII. 735, 736. — Escheri. IX. 142, 470, *V.* 124. — eximia. VI. 895 Anm.; VIII. 157, 179; IX. 341, 477, 478; X. 98. — gradata. VI. 895 Anmerk.; IX. 141, *V.* 124; X. *V.* 60. — Haddingtonensis. IX. 142. — Haueri. IX. 142. — Helix. IX. *V.* 124. — lactea. X. 504, 506. — Obeliscus. IX. 137. — Periniana. IV. 753, 757. — Petersi. VII. 672. — Pini. IX. 142. — Rosthorni. VI. 895 Anmerk.; VII. 72. 637, 729; VIII. 786; X. 99. — scalata. VIII. 801. — striata. IV. 753, 757. — tumida. VI. 895 Anmerk.; X. 98. — sp. 341; VII. 306, 307, 429, 795; IX. 138; X. 504, *V.* 46. Chemnitziae des Dachstein-Kalkes. VI. 895; VIII. 306, 307. — des Hallstätter Kalkes. VIII. 146. — (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 379. Chenopus. Pes graculi IV. 642. — Pes pelecani. IV. 166, 182, 188, 642; V. 218, 747; VII. 353; VIII. 319, 322; IX. 379, 380, 383, *V.* 8, 9; X. 506, 512 Anmerk., *V.* 33. — tridactylus. II. d. 152. Chilostomella Čžjžeki. V. 760. Chirocentrites microdon. IV. 158. — Cheirurus insignis. X. 482. Chondrites aequalis. I. 48. — Bollensis. IX. 481. — furcatus. I. 48; II. d. 45. — Haueri. II. d. 45; III. d. 47. — intricatus, I. 48; VII. 2, 16, 25, 29, 36; IX. 125; X. 264, 270, — latus. VII. 9, 10, 27, 35; X. 109. — minimus. VII. 9, 19, 27, 35; X. 109. — Targionii. I. 48; VII. 2, 25, 29, 36. — sp. III. d. 130. Chonetes Buchiana. VII. 340. — sp. VII. 424. Chrysomela Haidingeri. VII, 831 Anmerk. — Ungeri. VII. 831 Anmerk. Cicadellites nigriventris. VII. 832 Anmerk. Cidaris coronata. I, 188; II. c. 3, 4, d. 168; IV. 54, 77; V. 690, 695, 696, 697. — decorata. IX. 335. — dorsata. VI. 446; VII. 728; IX. 335, 339, 361. — glandifera. IV. 390. — granuloso-striata. VIII. 318, — Hausmanni. VIII. 216. — hirta. VIII, 322. — marginata. V. 696. — punctata. VI. 310. — similis. VII. 727. — subnodosa. IX. 159. — vesiculosa. VI. 249. — sp. IV. 707; VIII. 317, 318; X. 283. Cidarites vesiculosus. I. 249. — sp. II. c. 2, 3; VII. 588, 592. Cinchonaceae (fossile). I. 364; II. b. 186. Cinchonidium sp. II. b. 146, 147. Cinnamomum Rossmaessleri IX. *V.* 19. — Scheuchzeri. IX. 403, *V.* 35. — spectabile. IX. *V.* 19. Cissus platanifolia. II. d. 42, 44. — sp. II. b. 179. — Citriobatus sp. I. 558. Cladocora conferta. I. 676; IV. 189; V. 748. — granulosa. IV. 646. — sp. IV. 707; IX. *V.* 71; X. *V.* 24. Cladographus sp. VI. 612. Clathropteris meniscioides. II. d. 143. Clausilia Grohmanni. IV. 713. — grandis. VII. 544. — plicata. X. 463. — sp. I. 56; IV. 434; VII. 544; IX; 62, *V.* 95. Clansiliae des Lösses. VIII. 331. Clavagella bacillaris. V. 219. — coronata. II. a. 14; VII. 572; IX. 121. Clavulina communis. VI. 354. Clethra sp. I. 735. Clupea sp. I. 698; IX. 380, 381. Clymenia laevigata. VII. 241. — sp. VII. 239, 241. Clypeaster crassus. VII. 591. — crassecostatus. VI. 302; VII. 591; X. 217. — grandiflorus. III. c. 132, d. 51; VII. 591, 813; IX. 508. — Linki. I. 668. — marginatus. I. 593. — sp. III. b. 95; VII. 583, 592. Cobitis fossilis. II. b. 185. Coccosteus. X. *V.* 19. Coleoptera (fossile). I. 365; II. a. 142. Coeloptychium agaricoides. I. 248. Columbella Bellardi. IX. *V.* 67. — curta. III. d. 77, 135; IV. 188; V. 747; VII. 353. — erythrostoma. IV. 643. — nassoides. III. d. 135; IV. 182, 643; V. 890; IX. *V.* 67. — rustica. V. 218. — scripta. IV. 182. — semicaudata. IV. 188, 643; V. 747. — subulata, III. d. 135; IV. 182, 643, 707; IX. *V.* 67. — Tiara. IV. 182, 643. — sp. I. 671. Columbellae (fossile) des Wiener Beckens. III. d. 135. Columellastraea striata. II. a. 161. Columnaria sp. IV. 378. Combretaceae (fossile). I. 364; II. b. 186. Comptonia angustifolia. IX. 521. — Oeningensis. VIII. 744 Anmerk. Confer-

vaceae (fossile). II. a. 152. Congeria amygdaloides. II. b. 83 Tab. — Partschi. II. d. 118, 119; IV. 40; X. 457, 512 Anmerk. — spathulata. II. b. 83 Tab., 87, d. 47, 118; IV. 40. — subglobosa. I. 745; II. b. 83 Tab., d. 87, 47, 118, 119; VII. 355; X. 28. — triangularis. IV. 405; VII. 39, 40, 699; X. 512 Anmerk., V. 191. — sp. VII. 197. Congeriae der Molasse. VI. 437, 439. Coniferae des Rothliegenden. VIII. 180. — (fossile). VI. 435; VII. 266. — — mit aufsitzenden Balanen. IX. 813. — (tertiäre). VIII. 507. Coni des Wiener Beckens. II. a. 151, 123, 128. — (neogene). VIII. 285, 326. Conoclypeus Bordae. I. 593. — conoideus. II. a. 17; IX. 121. — costellatus. IX. 121. — sp. IV. 548. Conocyclus conoideus. VI. 743. Conularia sp. VII. 357. Conus Aldrovandi. II. d. 129. — antediluvianus. II. d. 133; IV. 182, 190, 644; V. 210. — Avellana. II. d. 131. — Berghausi. II. d. 115, 129. — betulinoides. II. d. 128. — betulinus. II. a. 151. — Brocchii. III. a. 147; IV. 182, 644. — catenatus. II. d. 134. — clavatus. II. d. 130. — deperditus. I. 591; II. a. 13; IV. 644. — diversiformis. IX. 120. — Dujardini. I. 675; II. b. 173, d. 134; III. d. 77; IV. 188; V. 210, 747, 890; VII. 353; X. V. 32. — extensus. II. a. 151, b. 173, d. 133. — fuscocingulatus. I. 675; II. b. 173, d. 109, 115, 129; VII. 353. — Haueri. II. a. 151, d. 133. — Mediterraneus. II. a. 151, d. 106, 108, 109. — Mercati. I. 675, 676; II. d. 130; IV. 644, 709; VII. 353. — Noae. II. d. 131; IV. 644. — pelagicus. II. d. 132. — ponderosus. I. 675; II. d. 130. — Puschi. II. d. 133. — rarestriatus. II. d. 131. — striatulus. IV. 644. — Tarbellianus. I. 675; II. d. 106, 132. — ventricosus. I. 675; II. b. 173, d. 132; IV. 182, 188; V. 218, 747, 891; VII. 353. — sp. III. d. 40, 48; IV. 707; VII. 575, 584, 588, 591; IX. V. 114; X. V. 32. Convex astraea sp. IV. 378. Coprolithi. VI. 899. Corallinae (Kalk absondernde). VII. 582, 583. Corallinites Pomeli. IV. 114. Corax sp. II. a. 149. Corbis Mellingi. VIII. 787; X. 103. — ventricosa. I. 672. — sp. VIII. 442; IX. 384. Corbula angustata. II. a. 25. — Austriaca. IX. 114. — carinata. II. b. 190; X. V. 49. — complanata. II. a. 141; V. 210, 750, 751, 753, 754; VI. 297. — exarata. X. 499, 506. — gibba. IV. 644. — lamellosa. IX. 114. — Morloti. I. 672. — Nucleus. II. b. 190, d. 152; IV. 644, 707; V. 210, 219, 753, 754; IX. 626, 640; X. V. 65. — Pectunculus. IX. 114. — Pisum. IV. 707. — revoluta. I. 672, 676; II. b. 174; IV. 188; V. 748, 751, 892; VII. 354, 567, 571, 572; IX. 379. — Rosthorni. VI. 745; IX. 139, V. 28; X. 103, V. 11. — rugosa. I. 665; IX. 378, 379, 381, V. 9; X. V. 33, 124, 126. — striata. VI. 188. — truncata. X. V. 77. — sp. II. a. 6, d. 108; VI. 246; VIII. 322, 323; X. V. 105. Cordaïtes borassifolia. III. d. 129; V. 197. — sp. VII. 265. Coriocella perspicua. IX. 657. Corylus Wickenburgi. VI. 289. Cottaïtes Lapidariorum. VI. 289. Crania Mladeki. V. 690. Crassatella dissita. II. d. 117; IV. 188, 427; V. 210, 748; VII. 354; X. 569. — Ligeriensis. I. 162. — tumida. I. 592; VIII. 445; X. 502. — sp. II. a. 14, d. 56; IV. 427; VIII. 224, 316. Credneria der Kreidekohle. VIII. 157. Crenatula sp. V. 684. Crepidula ovata. VII. 357. — unguiformis. I. 362; II. d. 112; IV. 639; V. 210; VII. 354. Crepidulae (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 383. Crescentia (fossile). VI. 887. Creusia Verruca. IX. 658. Crinoidea. I. 249; VII. 33, 238, 239. — des Hallstätter Kalkes. IX. 267. — im Nummuliten-Gestein. IX. 115. — im Sphärosiderit. VIII. 425, 429. Crioceras Cornuelianus. VI. 309, 311. — Duvali. I. 42, 162, 189; III. c. 141; V. 592; IX. 45; X. V. 47. — Emerici. I. 188, 189; III. c. 141; IV. 391. — Puzosianus. III. c. 141; VI. 309. — Villiersianus. I. 189; VI. 311. — sp. II. d. 158, 162; IV. 333, 351, 391; VI. 901. Crisia Edwardsi. VI. 352, 353. Cristellaria acuta. V. 753. — aspera. V. 758. — auriformis. V. 758. — Auris. V. 758. — Cassis. V. 750, 758, 759. — elegantula. V. 757. — Ensis. V. 753. — galeata. V. 758. — hirta. V. 753. — incompta. V. 757. — incrassata. V. 758. — inops. V. 758. — Josephinae. V. 757. — minuta. V. 762. — simplex. V. 753, 755, 757. — variabilis. V. 759. Crocodilus (fossil). IX. 534. Crustaceen (Fährten vorweltlicher). X. V. 35, 36. — (silurische). VII. 357, 358. — (tertiäre). VII. 570. Cryptina Raibeliana. VI. 745, 893; VII. 373, 443, 452, 453, 454. Cucullaea Beyrichi. IX. 159. — glabra. V. 710. Culmites arundinaceus. II. d. 40. — ambiguus. II. d. 40, 45, 49; VIII. 741. — bambusioides. II. d. 45; III. d. 47. — Goepperti. VIII. 494. — priscus. III. c. 141. Cunninghamites Oxycedrus. IV. 168. Cupania melaena. II. b. 186. — miocenica. I. 604. Cupanoides miocenicus. II. d. 42, 44. Cupressina sp. I. 604. Cupressineae (fossile). I. 361, 745; II. a. 152, 186, d. 41. Cupressites aerophyllus. V. 725. — Aequimontanus. VI. 289. Cupuliferae (fossile). I. 745; II. a. 152, 153, b. 147. Curculionites prodromus. X. 133. Cyatheïtes aequalis. VIII. 603. — arborescens. X. V. 69. — asper. VIII. 342, 350, 351. — oreopteroides. VIII. 603. — Schlotheimi. II. d. 143. — undulatus. V. 197. — unitus. VIII. 344, 350. Cyathocrinus pinnatus. VII. 240. — sp. IV. 407. Cyathophyllum Mactra. IV. 378. — turbinatum. III. a. 167. — vermiculare. III. a. 167. — sp. IV. 59, 378, 407; VII. 243. Cyathoseris Haidingeri. II. a. 162. — raristella. II. a. 162. Cybium Partschi. II. b. 83 Tab. Cycadeae (fossile). II. b. 145. Cycadites Brongniarti. III. c. 141. Cyclas sp. II. b. 6; VI. 437. Cyclocrinus sp. IV. 386. Cycloïdae (eocene). VIII. 319. — (neogene). VIII. 322.

Cyclolites depressa. II. a. 162; VIII. 443. — elliptica. II. a. 162. — hemisphaerica. II. a. 162. — macrostoma. II. a. 162. — undulata. II. a. 162. Cyclophthalmus sp. VII. 250. Cyclopteris auriculata. IV. 197. — digitata. II. d. 143. — flabellata. VIII. 344, 351. — rhomboidea. III. d. 123. — sp. III. d. 129; VII. 265. Cyclostoma Rubeschi. VIII. 479. — sp. VII. 699; X. 27. Cydnopsis scutellaris. VII. 832 Anmerk. — tertiaria. VII. 832 Anmerk. Cyperaceae (fossile). III. c. 159. Cyperites plicatus. IX. *V.* 148. — tertiarius. II. d. 40; IV. 638. Cypraea affinis. IV. 182. — annularia. I. 664, 671, 675. — Coccinella. I. 671. — Europaea. IV. 664; IX. 656. — flavicula. IV. 644. — leporina. III. a. 177. — Pyrum. V. 891; VII. 353. — sanguinolenta. IV. 182. — sphaericulata. IV. 644. — splendens. I. 591. — stercoraria. III. a. 178. — voluta. I. 671. — sp. II. a. 13; VII. 591; IX. 114, 121; X. 178. Cypraeae (fossile) des Wiener Beckens. III. a. 177, 178, b. 166. Cypricardia antiqua. VII. 373. — coralliophaga. IV. 645. — Werneri. I. 665. — sp. VII. 656. Cypridina Brunnensis. II. b. 83 Tab. — folliculosa. II. b. 83 Tab. — galeata. IV. 426. — Kostelensis. II. b. 83 Tab. — lacunosa. II. b. 83. Tab. — loricata. II. b. 83 Tab. — omphalodes. II. b. 83 Tab.; IV. 427. — opaca. II. b. 83 Tab. — punctata. IV. 426. — reniformis. II. b. 83 Tab. — sp. IX. 381. Cyprina communis. IX 607. — Islandica. IX. 605, 614, 020, 626, 643. — Ligeriensis. II. b. 191. — oblonga. II. a. 25. Cyprinoïdae (fossile). II. b. 83 Tab. Cypris angusta. I. 689; VIII. 469, 477, 478, 479. — sp. VII. 227, 380. Cyrena Brongniarti. I. 596. — cuneiformis. II. a. 5. — subarata. VI. 438, 441. — trigonalis. IX. 627. — sp. I. 594; II. a. 6, 7, 8; IX. 154, 629. Cystidea sp. VII. 357, 359. Cystoseirites communis. IV. 114. — gracilis. IV. 114. — Helii. IV. 114. — Partschi. II. b. 178. Cythere asperrima. V. 749, 751, 760. — calcarata. V. 763. — cinctella. V. 754. — corrugata. V. 754. — deformis. VI. 352; VII. 585. — diodon. V. 754. — dispar. IX. 159. — hastata. V. 754. — Haueri. V. 754. — longipora. V. 754. — obesa. X. 28. — plicatula. V. 754, 763. — punctata. V. 754; VI. 352; VII. 585. — spinuloso-pertusa. V. 754. — sulcato-punctata. V. 751. — Transsylvanica. V. 754. — trigonella. V. 754. — Ungeri. V. 754. — venulosa. X. 28. Cytherea apicalis. V. 219. — Chione. I. 362, 672; II. b. 190, d. 112, 115; IV. 709; V, 892. — cincta. I. 665. — Deshayesiana. I. 672; VII. 354. — Erycina. X. *V.* 65. — erycinoides. I. 665, 668, 672; II. d. 113. — Haidingeri. I. 665. — Islandicoides. II. b. 190. — Lamarcki. II. b. 190. — leonina. VII. 580. — multilamella. IV. 644; V, 119. — Pedemontana. VII. 345. — petricola. X. 504. — rugosa. I. 672; X. *V.* 33. — trigoniata. X. 504. — sp. I. 668; IV. 282; VIII. 224. Cytherella subelliptica. V. 763. Cytheridea Mülleri. V. 749, 751, 760. Cytherina abbreviata. II. b. 83, Tab.; IV. 426. — abscissa. II. b. 83 Tab. — auriculata. II. b. 83 Tab. — compressa. IV. 426. — dilatata. II. b. 83 Tab. — heterostoma. II. b. 83 Tab. — obesa. II. b. 83 Tab. — Prunella. VII. 357. — recta. II. b. 83 Tab.; IV. 427. — semicircularis. II. b. 83 Tab. — Seminulum. II. b. 83 Tab. — setigera. II. b. 83 Tab. — strigulosa. II. b. 83 Tab. — subteres. II. b. 83 Tab.; IV. 427. — Unguiculus. II. b. 83 Tab.

Dachstein-Bivalve. I. 37, 154, 162, 644; III. d. 90; IX. 139, 269, 341, 469, 474, 477, 478, 479, *V.* 93, 96, 138. Dadocrinus gracilis. X. 82, 86, 94. Dahlbergia podocarpa. X. 27. Dalmannia Mac-Coyi. III. b. 143. Dalmannites atavus. VII. 351. — socialis. VI. 610; X. 482. Daphnogene cinnamomifolia. II. b. 147; V. 230; VIII. 473, 494. — paradisiaca. II. b. 186. — polymorpha. II. b. 186, d. 41; III. d. 126; IV. 478; VIII. 482, 494, 502 Anmerk., 507; IX. 345, 403. — sp. IV. 175; IX. *V.* 149. Davallia Haidingeri. I. 552. Defrancia conjuncta. II. a. 162. — prolifera. II. a. 11; IV. 353. — rotellaeformis. VIII. 375 — stellata. VI. 353. Delphinus sp. (fossil). III. b. 161. Delphinula marginata. I. 592. — reflexilabra. IV. 753, 759. — scobina. I. 592. — sp. II. d. 56; IV. 329. Delthyris sp. VI. 192. Dendracis Stiriaca. II. a. 162. Dendrastraea sp. IV. 329. Dendrophyllia Morloti. II. a. 162. Dentalina acuta. V. 757. — acuticauda. V. 757. — Adolphina. V. 753, 757, 759, 762. — Badenensis. V. 753, 757, 759. — Bouéana. V. 743, 757, 759. — consobrina. V. 753, 757. — depauperata. V. 753, 759. — elegans. V. 749, 750, 753, 754, 757, 759, 761; VI. 354. — floscula. V. 753, 757. — guttifera. VI. 354. — hirta. V. 753. — inornata. V. 748, 750, 757, 759, 761, 762. — moniliformis. V. 753. — mucronulata. V, 753, 757. — multilineata. VI. 354. — nitens. V. 750. — polytoma. V. 753. — scabra. V. 753, 757, 759. — striata-costata. V. 757. — sub-globularis. V. 761. — Verneuili. V. 749, 753, 757, 759, 762. — sp. V. 750, 753, 755, 759, 761. Dentalium Badense. VII. 354; IX. *V.* 67. — bi-striatum. II. d. 152. — Bouéi. I. 672; II. b. 174; IV. 638; V. 890; VII. 354; X. 502. — elephantinum. I. 163; II. d. 105; III. a. 147, d. 77; IV. 704, 706; V. 219, 750, 890. — Entale. IX. 378, 606, 620, 627, 649. — Fissura. IV. 639. — Gadus. IV. 639. — inaequale. IV. 638. — incurvum. IV. 639; V. 219; IX. 378. — laeve. IX. 159. — mutabile. IV. 638. — planatum. IV. 638. — rectum. IV. 638. — sexangulare. V. 219, 751, 753, 754. — sexangulum. IV. 638 — Tatus. IV. 639. — sp. I. 252; II. a. 5, 6; IV. 373; VI. 440. Diadema. IV. 548. — subangulare. V. 690, 695, 696. — variolare. VI. 249. Diastopora fasciculata. II. a. 160. — seriata. II. a. 160.

— sponsa. II. a. 163. — tennuis. II. a. 160. Diceras Lonsdali. VI. 304. — sp. II. d. 167; IX. 42. Dicotyledones (fossile Blätter von). VIII. 425, 447, 473, 474, 476, 479, 482, 502; IX. 156, 539, 540, *V.* 3, 135; X. 511. Dictyopteris sp. VI. 226. Dycynodon sp. IX. *V.* 25. Dimorphastraea Haueri. II. a. 162; X. *V.* 77. Dimorphina nodosaria. V. 751, 760. — obliqua. V. 760; VI. 354. Dinotherium giganteum. II. d. 122; III. c. 132; VIII. 167, 185. — sp. VII. 612; IX. *V.* 48. Diosmeae (fossile). I. 552. Diospyros brachysepala. I. 236. — Pannonica. II. d. 41. — sp. II. a. 188. Diploctenum conjungens. II. a. 161. — Ferrum equinum. II. a. 161. — Haidingeri. II. a. 161. — porrigens. II. a. 161. Diplodictyum sp. I. 357. Diplodonta rotundata. I. 672. Diplograpsus. III. b. 147, 153. — ovatus. III. b. 147. — palmeus. III. b. 147. — parallelocostatus. III. b. 147. Diploria crasso-lamellosa. II. a. 161. Diprotodon australis. X. *V.* 177. Diprion. III. b. 153. Dipterites obsoleta. VII. 832 Anmerk. Dipterus sp. IX. *V.* 19. Discina Cellensis. IV. 735. Discoidea Conulus. I. 244. Discopora sp. II. a. 11. Ditaxia confertipora. VI. 353. Dodonaea sp. I. 552; II. b. 188. Dolium denticulatum. III. d. 137. Dombeyaceae (fossile). I. 164. Dombeyopsis grandidentata. VIII. 750. — grandifolia. V. 559. — helicteroides. VIII. 739. — tiliaefolia. I. 604. — sp. VI. 300. Domopora prolifera. VI. 353. Donax Brocchii. I. 672; II. d. 117; VII. 354. — elongata. I. 596. — Trunculus. IX. 626, 640. Donisia lineata. IV. 644. Dorcatherium Naui. I. 54, 166; VII. 221; VIII. 284. — Vindobonense. I. 166; V. 524. Dreissena Brardi. I. 595, 596. — Feldmanni. X. *V.* 178. — laciniata. X. *V.* 178. — sp. I. 594; VIII. 448. Dryandra eocenica. II. b. 186. — Vindobonensis. II. d. 41, 43. — sp. I. 682; II. b. 188; VI. 886; VIII. 744 Anmerk. Dryandroides acuminatus. IX. *V.* 19. — grandis. X. 212. — hakeaefolius. X. 28. — Lignitum. VIII. 494, 745.

Echinocyamus pyriformis. I. 592. Echinodermata des Diphya-Kalkes. VIII. 300, 301. — (eocene). VIII. 317; X. 294, 320. — (neocome). VI. 248. — (nummulitische). VIII. 225, 286. — (silurische). VII. 357. Echinolampas Bouéi. II. a. 14, 16. — Brogniarti. II. a. 14. — conoidea. II. a. 14, 16. — ellipsoidalis. IX. 121. — elliptica. II. a. 14. — grandiflora. VI. 743. — hemisphaerica. VIII. 317, 318. — Kleini. I. 593; IV. 548. — Laurillardi. I. 593. — semiglobus. I. 593. — subsimilis. IV. 548; IX. 116. Echinus granulatus. IX. 659. — neglectus. IX. 659. — sp. IV. 548. Echites sp. IV. 192. Ehrenbergina serrata. V. 758. Elaiodes Fontanesia. I. 236; VI. 287. Elephas primigenius. I. 56, 194; II. a. 77; III. c. 132, d. 79; IV. 180; VI. 322, 407; VII. 693; VIII. 158, 178, 618, 764, 790, 815; IX. 628, *V.* 95; X. 463, *V.* 19, 52, 86, 113. Emarginula clathrataeformis. VIII. 384. — crassa. IX. 606, 650. — Fissura. IX. 606. Emys Europaea (fossil). VIII. 333. — lutaria (fossil). VIII. 333. — Michelottii. X. *V.* 46. — sp. IV. 429. Enallhelia compressa. V. 695. Encrinitae des untern Alpen-Kalkes. VII. 724. Encrinites Buchi. VI. 897. — gracilis. I. 38. — liliiformis. I. 37; VI. 892, 897; VII. 417, 442, 443, 451, 729, 844; VIII. 216. — sp. II. c. 3; VII. 357, 359. Encrinus dubius. III. a. 154. — liliiformis. III. a, 154; IX. 159, 335, 460, 465; X. 95. Engelhardtia Bohemica. VIII. 494. Entalophora anomala. VI. 353. Ephedrites Sotzkianus. III. d. 135. Ephialtes primigenius. VII. 831 Anmerk. Equisetaceae (fossile). II. a. 154. Equisetitae der Pilsener Kohle. VII. 265. Equisetites Brauni. II. d. 45; III. d. 47. — Brongniarti. II. b. 145. — columnaris. I. 49; IV. 742; IX. 335. — Gamingianus. IV. 742. — Münsteri. IX. *V.* 18. — Ungeri. IV. 742. — sp. VI. 235; VIII. 209. Equisetum sp. I. 357. Equus Adamiticus. I. 194. — Caballus (fossil). VI. 908. — fossilis. IX. 249, 628, *V.* 95. Erato (fossile) des Wiener Beckens. III. b. 166. Ericaceae (fossile). I. 361, 745; II. a. 154. Ervilia Podolica. X. *V.* 175. Eschara bipunctata. VI. 353. — coronata. II. a. 162, 163. — costata. VII. 589. — exilis. VII. 353. — membranacea. II. a. 162. — militaris. VII. 353. — papillosa. II. a. 162, 163; VI. 353. — polystomella. VII. 353. — stenosticha. II. a. 161. — undulata. VII. 353. — varians. VIII. 353. — sp. II. a. 11; VI. 297. Escharina scutella. II. a. 161. Esox (fossil). IX. 637. Estheria. VII. 852. Eucalyptus oceanica. II. b. 186; III. d. 135; X. 177. — sp. I. 557; II. b. 188. Eugeniacrinites nutans. I. 254. Eugeniacrinus sp. IV. 386. Eulima subulata. IV. 639. Eulimae (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 379. Eumalpus firmus. VII. 831 Anmerk. Eunomia caespitosa. II. a. 162. Eunomya Alpina. IV. 328. — grandis. IV. 329. Euomphalus. III. a. 168. — excavatus. IV. 753, 760. — Orbis. IV. 753, 760. — ornatus. IV. 753, 760. — Reussi. IV. 753, 760 — sp. IV. 329. Eupatagus sp. IX. 117, 394 Anmerk. Euphorbiaceae (fossile). II. b. 188; V. 214. Euphorbiophyllum crassinerve. VIII. 739, 754. — Stiriacum. VIII. 755. Eurypterus sp. VII. 250. Evonymus Haidingeri. VIII. 739, 752. — obovatus. VIII. 752. Exogyra Columba. III. c. 143; V. 710, 711, 721; VI. 111; VII. 24, 38, 327; IX. 147, *V.* 73, 81, 113; X. *V.* 61, 76, 77, 123. — Couloni. III. c. 138. — haliotoidea. VII. 327. — spiralis. VI. 310. — sp. II. a 25; VIII. 223. Explanaria Astroïtes. I. 673; III. d. 125; VII. 355. — sp. IV. 355.

Fagus Atlantica. IV. 115. — castaneaefolia. II. d. 41; IX. 345, *V.* 148. — dentata. VI. 287, 789. — Deucalionis. VII. 334; VIII. 744. — Feroniae. I. 735; II. b. 186; IV. 177; VIII. 507. — macrophylla. VI. 287. — Pyrrhae. VI. 287, 288, 290. — sp. VI. 300. Fascicularia sp. IX. 600. Fasciolaria Bellardii. VI. 178. — Burdigalensis. I. 665, 668, 672; II. d. 112. — fimbriata. I. 162; IV. 182; VI. 178. — Polonica. IV. 188; V. 747. — propinqua. I. 672. — Tarbelliana. VI. 178. — sp. II. a. 13; IV. 182. Fasciolariae (fossile) des Wiener Beckens. VI. 178. Favosites Gothlandica. III. a. 167. — Spongites. III. a. 167. Felis spelaea. VI. 322, 908. Fenestella sp. VII. 812. Fibularia sp. II. a. 11. Ficus ciliosa. VIII. 746. — Joannis. VIII. 746. — lanceolata. VIII. 746. — laurifolia. VIII. 746. — laurogena. VIII. 494. — microcarpa. VIII. 746. — Reussi. V. 740. — tiliaefolia. VIII. 747. — sp. I. 364; IV. 175; VI. 299. Filices (fossile). I. 557, 633. — — der Faserkohle. VI. 236. — — der Kohlenschiefer. VIII. 335. — des Kupfer-Sandsteines. VIII. 180. — — im Lignit-Tegel. IX. *V.* 148. Filisparsa biloba. VI. 353. Fische (fossile). VI. 404, 416, 743; VII. 326, 331, 373, 417, 452, 570, 728, 827; VIII. 149, 704, 705; IX. 159, *V.* 38, 40; X. *V.* 11. — (tertiäre). VIII. 149, 319, 446, 482, 483, 502; IX. 50, 51, 104, 127, 128, *V.* 36, 49. Fischzähne (fossile). I. 245; III. a. 184, d. 48; IV. 447; IX. 113, 116, 120, 380, 381, *V.* 9. Fissurella Graeca. IX. 606, 650. — Italica. I. 672; IV. 188, 639; V. 747. — sp. II. a. 6, 13. Fissurellae (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 383. Fistulana sp. VII. 572. Flabellaria Bilinica. IV. 177. — Lamanosis. III. a. 186. — Latania. II. d. 160. — longirhachis. II. b. 122. — major. II. d. 159. — maxima. II. d. 160. — Radnitzensis. V. 197. — raphifolia. II. d. 159; III. a. 186; IV. 115. — verrucosa. II. d. 159. — sp. VI. 886. Flabellum appendiculatum. IV. 118. — bipartitum. II. a. 161. — bisinuatum. II. a 161. — subcarinatum. II. a. 161. Foraminifera des Leitha-Kalkes. VI. 193, 194, 351; VII. 583, 589. — der Meeres-Molasse. VI. 441. — (eocene). X. 314, 315, 318. — (neogene). VIII. 227, 228. Formica acuminata. VII. 832 Anmerk. — aemula. VII. 832 Anmerk. — atavia. VII. 832 Anmerk. — fragilis. VII. 832 Anmerk. — Freyeri. VII. 832 Anmerk. — globularis. VII. 832 Anmerk. — Heraclea. VII. 832 Anmerk. — Imhofi. VII. 832 Anmerk. — indurata. VII. 832 Anmerk. — Lavateri. VII. 832 Anmerk. — Lignitum. VII. 832 Anmerk. — longaeva. VII. 832 Anmerk. — longipennis. VII. 832 Anmerk. — macrocephala. VII. 832. — minuta. VII. 832 Anmerk. — obesa. VII. 832 Anmerk. — oblita. VII. 832 Anmerk. — obliterata. VII. 832 Anmerk. — obscura. VII. 832 Anmerk. — obvoluta. VII. 832 Anmerk. — ocella. VII. 832 Anmerk. — ophthalmica. VII. 832 Anmerk. — pinguicula. VII. 831. — pinguis. VII. 832. — pumila. VII. 832 Anmerk. — Redtenbacheri. VII. 832 Anmerk. — Ungeri. VII. 832 Anmerk. Fracastoria (fossile Früchte von). X. 142, *V.* 91. Fraxinus ambigua. VIII. 494. Frösche (fossile) der Blätterkohle. VIII. 156. Frondicularia elliptica. I. 244. — monacantha. V. 759. — sp. V. 757. Fucoïden (fossile). IX. 271, 479, 481, *V.* 49, 77. — — der Kreide. VI. 548, 886; IX. 492, 493, 494, *V.* 97. — — der Steinkohle, VII. 265; IX. 333, *V.* 78. — — im Tertiären. IX. 125. Fucus antiquus. I. 402; IX. 333. *V.* 77. — Brianteus. I. 635. — furcatus. V. 228. — granulatus. VII. 27. — intricatus. I. 402; II. b. 20; V. 228; X. 109, 116 Anmerk. — Targionii. I. 402; II. b. 20; V. 228; X. 109, 116 Anmerk. Funginella discoidea. II. a. 162. — Scutellum. II. a. 162. Fungia rudis. IV. 378. — sp. VIII. 304; IX. 600. Fusi (fossile) des Wiener Beckens. IV. 855, 856. Fusus aduncus. IV. 641. — antiquus. IX. 603, 605, 613, 626, 653. — Bamfius. IX. 606, 607, 652. — Barvicensis. IX. 606, 652. — Basteroti. IX. 380, 385. — bilineatus. II. d. 105; IV. 247, 407. — Burdigalensis. VII. 353. — cinereus. IX. 606. — clavatus. I. 597; IV. 182, 190. — contrarius. IX. 606, 614, 620, 626, 653. — corneus. I. 672, 675; IV. 182, 188; V. 747; IX. 605. — crispus. IX. 606, 653. — despectus. IX. 653. — Fabricii. IX. 606. — Forbesi. IX. 606, 653. — fornicatus. IX. 627. — Glomus. IX. *V.* 67. — Hoessi. I. 672. — intermedius. V. 210. — Islandicus. IX. 653. — Klipsteini. IV. 641. — lamellosus. IV. 182, 641. — lignarius. IV. 641. — longirostris. IV. 641; VII. 353. — minax. IV. 404. — mitraeformis. IV. 641. — muricatus. IX. 652. — Noae. VI. 187. — pentagonus. IV. 182. — polygonus. II. d. 152; X. 497, 506, *V.* 77. — Puschi. VII. 353. — reticulatus. IV. 191. — reversus. IX. 613. — rostratus. II. b. 173; III. d. 77; IV. 182, 641, 707; V. 218. — Sabinei. IX. 627, 653. — Sandleri. IV. 188; V. 747. — scalariformis. IX. 602, 606, 652. — Stützi. I. 675. — subcarinatus. VIII. 445; IX. *V.* 121. — Valenciennesi. VII. 353. — virgineus. VII. 353. — vulpeculus. IV. 182. — sp. II. a. 13, b. 190, d. 56; IX. 653.

Galeocerdo aduncus. II. b. 189. Galerites albogalerus. I. 249, 251. Galionella varians. IX. *V.* 35. Gasteropoda der Gosau-Formation. II. d. 56; IV. 111, 395. — (silurische). VII. 357, 359. — (triassische). VIII. 157. Gaudryina Badensis. V. 758, 760. — deformis. V. 748, 749, 751, 754, 755, 758, 760, 761, 763. Geinitzia cretacea. I. 161; II. b. 122; V. 721, 740. Gervillia angusta. IV. 375. — bipartita. VI. 448; VIII. 801; IX. 140, 470, *V.* 17, 33. — costata. IX. 159. — gastrochaena. IV. 375. — inflata. IV. 375, 735, 737; V. 127; VI. 448; VII. 26, 37, 336, 419, 726, 731; IX. 139, 476, 478. — Joannis Austriae. X. 24. — Reichi. IX. *V.* 73. — Renauxiana. I. 187. — salvata IX. 463. — socialis. I. 37; IV. 375;

IX. 159, 267, *V.* 111; X. 24. — solenoides. II. b. 191. — tortuosa. IV.375. — sp. III. b. 67; IV. 91; VIII. 303. Gethonia Antholithus. IV. 115; VII. 579. — petreaeformis. IV. 115. Gladiolites. III. b. 142. Glandulina laevigata. V. 752, 762. — Leopolitana. II. a. 163. — rotundata. II. a. 163. Glaphyroptera Pterophylli. X. 133. Globigerina bilobata. V. 760; VI. 354; VII. 585. — concinna. V. 758. — diplostoma. V. 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 758, 759, 761, 762. — Globulus. V. 751, 758, 760. — quadrilobata. V. 752; VI. 354 — regularis. *V.* 752, 754, 755, 758, 760, 762. — trilobata. V. 748, 749, 750, 751, 752, 754, 758, 759, 761, 762, 763; VI. 351, 353, 354; VII. 585. Globulina aequalis. II. a. 163; V. 752, 758. — Guttula. V. 760. — gibba. V. 755, 763. — inaequalis. VI. 352. — inflata. V. 755. — irregularis. V. 755. — minuta. VI. 352. — pygmaea. II. a. 162. — rugosa. V. 754, 760. — spinosa. V. 752. — tuberculata. V. 755. — sp. V. 751, 755, 761. — Glypticus hieroglyphicus. I. 188. Glyptostrobus Europaeus. VIII. 742; IX. 403, *V.* 148; X. 28, *V.* 179. — Oeningensis. IV. 177, 478, 638; V. 561; VI. 290. Goniopteris Styriaca. IX. 403. Goniomya rhombifera. IV. 742, 744. Gorgonia sp. IV. 407. Graptolithi. II. a. 164. — (böhmische). III. b. 139. Graptolithus. III. b. 148. — armatus. III. b. 152.. — Barrandei. III. b. 152. — Becki. III. b. 151. — Bohemicus. III. b. 149. — Chimaera. III. b. 152. — Colonus III. b. 150. — convolutus. III. b. 151, 153. — dubius. III. b. 150. — Falx. III. b. 151. — ferrugineus. III. b. 149, 153. — fugax. III. b. 152. — Halli. III. b. 152. — laevis. III. b. 152. — Linnaei. III. b. 152. — Nilssoni. III. b. 151. — palmeus. III. b. 148. — peregrinus. III. b. 152. — priodon. III. b. 148, 150, 151. — Proteus. III. b. 152. — — var. plana. III. b. 152. — Sedgwicki. III. b. 151, 153. — serratus. III. b. 149, 153. — spiralis. III. b. 151. — Taenia. III. b. 150, 153. — tectus. III. b. 152. — Testis. III. b. 149, 153. — turriculatus. III. b. 151. Grateloupia donaciformis. I. 672. Gratomyia Bucklandi. III. a. 186. Grevillia sp. I. 682; II. b. 188. Gryllacris sp. I. 365. — Ungeri. VII. 832 Anm. Gryphaea Archiaciana. IX. *V.* 130. — arcuata. I. 635. — Columba. I. 50. — Cymbium. X. 411. — navicularis. I. 677; II. a. 141, b. 190; X. *V.* 33, 126. — vesicularis. I. 46, 250; II. a. 12, b. 122, d. 54. — sp. I. 271, 668; VII. 5; VIII. 322. Guttulina Austriaca. V. 748, 762, 763. — Problema. II. a. 163. V. 752. — semiplana. V. 754, 755, 758, 760, 763. Gymnopus Aegyptiacus. IV. 178. — Duvaueeli. IV. 178. — Stiriacus. X. *V.* 46. — Vindobonensis. X. *V.* 46. — sp. IV. 178. Gyracanthus sp. II. a. 145. Gyrolepis sp. IV. 330, 371.

Hakea pseudonitida. II. d. 41, 43. — sp. I. 558, 682; II. b. 188. Halianassa Collinii. I. 163, 629; II. d. 121; VI. 442, 443; VII. 163. — Faujasi. II. b. 122. Haliotis Volhynica. VIII. 378. — sp. I. 668. Halobia Lommeli. IV. 475, 727, 728, 776; V. 216; VI. 894, 895 Anmerk., 908; VII. 16, 17, 35, 72 Anm., 84, 179, 338, 373, 379, 414, 440, 442, 445, 448, 449, 454, 455, 637, 638, 657, 739; VIII. 216, 217, 776, 786, 796; IX. 268, 338, 466, 468, 469, 470, *V.* 33; X. 82, 84, 85, 86, 95, 96, 98, 99, 131. Hamites bifurcatus. V. 194; VI. 306. — Hampeanus. II. a. 122. — Michelii. V. 228. — rotundus. I. 250. — simplex. I. 252. — sp. I. 245; III. c. 141. Harpactor gracilis. VII. 832 Anmerk. Harz in versteinten Hölzern. VII. 733. Hedycarya sp. II. b. 188. Helioceras sp. III. c. 142. Heliopora sp. IV. 59. Helix agricola. II. d. 122. — Arbustorum. I. 377. — argillacea. IV. 713. — Austriaca. I. 377. — bidentata. X. 463. — cellaria. X. 463. — costulata. X. 512, 515. — crystallina. VII. 66. — Delphinula. III. a. 186. — denudata. IX. 473. — Fruticum. X. 463. — glabra. IX. 437. — hispida. II. b. 189; VIII. 331. — inflata. VII. 176; VIII. 451. — inflexa. IX. 394, *V.* 49. — montana. II. b. 83 Tabelle. — nemoralis. I. 672; II. d. 122. — personata. X. 463. — plicatella. VII. 544. — pomatia. I. 377; VIII. 331; X. 463. — rostrata. VIII. 479, 480. — ruderata. VII. 66. — semiplana. IX. 437. — Steinheimensis. VII. 176; VIII. 451. — strigella. X. 463. — Tiarella. III. a. 187. — Turonensis. VII. 354; VIII. 382; X. 27. — vermiculata. I. 672; III. a. 223. — Verticillus. I. 377. — Vindobonensis. I. 668; II. d. 117. — sp. I. 56, 629, 689, 694; III. d. 48, 51; IV. 37, 434; VI. 436, 437; VII. 544, 545, 697, 699, 813; IX. 62, 114, 529, 534, *V.* 95; X. 25, 231, 568, 569. Helminthoida crassa. VII. 56. — irregularis. VII. 36. — sp. VII. 16, 29. Hemerobius sp. (fossil). VII. 831 Anmerk. Hemiaster Edwardsi. VIII. 314. — verticalis. IX. 116. Hemicardium sp. VI. 743. Hemicidaris crenularis. V. 690, 695. — sp. IV. 753. Hemipneuster radiatus. I. 46. Hemipristis Serra. II. b. 190. Hemithyris senticosa. III. a. 185. — spinosa. V. 697. Heterocoenia dendroides. II. a. 161. — grandis. II. a. 161. — provincialis. II. a. 161. Heterogaster redivivus. VII. 832 Anmerk. Heterospora sp. II. a. 11. — stellulata. II. a. 162, 163. Heterostegina costata. V. 749. — Puschi. VII. 593. Hinnites velatus. V. 682. Hippocratiaceae (fossile). II. b. 188. Hipponyx sulcata. IV. 639. — sp. IV. 423. Hippopotamus major. X. *V.* 19. Hippotherium gracile. II. a. 147, b. 83 Tabelle, 85, d. 122; V. 521. — sp. IX. 433, *V.* 113. Hippuritae (Organisation der). V. 199. Hippurites arboreus. VI. 899. — bioculatus. VII. 607. — Bouchardianus. I. 189. — contortus. I. 190. — Cornu pastoris. I. 190; III. a. 192. — Cornu vaccinum. II. d. 55, 59; VII. 736; IX. 492, 493; X. *V.* 76. — costulatus. II. b. 123. — fasciatus. I. 190. — Fortisi. I. 190. — imbricatus. I. 190.

— inaequistriatus. II. d. 55. — maximus. I. 190. — nanus. I. 190. — Neocomiensis. I. 189. — organisans. I. 190; II. d. 55, 59; VII. 607. — rugulosus. I. 190. — sulcatus. II. d. 55, 59; VII. 607, 736; X. *V.* 77. — Turricula. I. 190. — Zoveti. I. 190. — sp. V. 405; VI. 877; VII. 20. Hiraea sp. V. 211. Höhlenbär. I. 101, 194, 364; II. a. 137, 159, d. 140; IV. 843; VI. 322; VII. 688, 689; VIII. 169, 764, 789, 815. Höhlenlöwe. VI. 322, 908. Holaster granulosus. IX. *V.* 73. — latissimus. VIII. 318. — Natica. I. 191. — sp. VIII. 301. Holectypus depressus. X. 413. Holoptychius sp. II. a. 143. Holz (verkieseltes). VII. 326; VIII. 325. — (verkohltes). VI. 869, 870; VII. 553; VIII. 477; X. 531, 533. — (versteintes). VIII. 725, 728, 729, 730, 801; IX. *V.* 38. Hoplichnus Equus. X. *V.* 189. Hornera Haueri. VI. 352, 353. — Hippolithus. II. a. 11. Hyaena spelaea. IX. *V.* 113, 147. Hydrangea (fossile). II. b. 159, 188. Hydrobius Ungeri. VII. 831 Anmerk. Hydrochleis sp. VI. 886. Hydrophora multilamellosa. II. a. 161. — Styriana. II. a. 161. Hymenophyllites dissectus. VIII. 342, 346, 350, 351. Hymenoptera (fossile). I. 365. Hyracotherium. VIII. 365.

Janira aequicostata. IV. 336. — Cometa. IV. 336. — striatocostata. IV. 336. — sp. III. b. 162; VI. 349. Ichthyosaurus platyodon. I. 39, 645; IV. 726. — (Wirbel von). VII. 731. Idmonea compressa. VI. 353. — subcancellata. VI 352, 353; VII. 589. — subcarinata. VI. 353. — undata. VI. 352. Jeanpaulia dichotoma. IV. 742. Ilex stenophylla. VII. 589. Illaenus Katzeri. VII. 357. — sp. VI. 611. Infundibulum muricatum. IV. 639. Infusoria (tertiäre). VII. 552, 553; VIII. 482, 488. Inoceramus (Schalen-Structur d. Gattung). II. d. 168. — annulatus. I. 245, 250; IX. *V.* 73. — Brongniarti. I. 245, 250. — concentricus. IX. *V.* 73. — Cripsi. I. 46, 162, 252; VII. 21, 24; X. *V.* 77. — Cuvieri. I. 46, 250; II. a. 25; IX. *V.* 73. — Falgeri. VII. 10, 18, 31, 35. — gryphoides. II. c. 21, 26. — Lamarcki. I. 192; V. 228. — mytiloides. V. 720; IX. *V.* 73; X. 230, *V.* 61. — planus. IX. *V.* 73. — plicatus. VI. 311. — striatus. IX. *V.* 73. — sulcatus. I. 46. — ventricosus. IV. 746, 751; VII. 733. — sp. III. b. 162; IV. 383, 386, 637; V. 684, 726; VI. 249; IX. 344. Insecten (fossile). VII. 328, 831; VIII. 321, 477, 482, 502. — Isis sp. II. a. 11. Isocardia Carinthiaca. IV. 732; VII. 369, 373. — Cor. I. 594, 596; V. 219; VIII. 227; IX. 382, 383, 384, 622; X. *V.* 33, 124. — grandicornis. IV. 732. — inflata. IV. 707. — sp. II. b. 190; VIII. 216; X. *V.* 104. Juglandeae (fossile). II. a. 154, 155, b. 188. Juglans Bilinica. I. 236; IV. 425; VI. 287. — cinerea. X. *V.* 50. — costata. I. 393; VIII. 494, 507. — deformis. I. 236. — elaenoides. IX. 403. — latifolia. VI. 291; VIII. 755; X. 28. — minor. VI. 289. — ventricosa. I. 393; VIII. 473.

Keckia annulata. VI. 101; VIII. 157; IX. 47. Kellia rubra. IX. 615, 617. Kirchneria. V. 886. Klipsteinia medullaris. VII. 546. Knightia. I. 682. Koppia imbricata. VIII. 351.

Lachnus Bonneti. VII. 832 Anm. Lacuna Basterotina. VIII. 375. — Montaguei. X. 616, 651. — neritoides. IX. 616. — vincta. IX. 605, 616, 651. Lamna contortidens. VIII. 289. — crassidens. II. b. 190; VI. 302. — cuspidata. II. b. 190. — denticulata. II. b. 90. — elegans. VII. 587. Lasmogyra Michelini. II. a. 161. Lastraea Stiriaca. IX. 403. Latomaeandra abbreviata. II. a. 161. Laurineae (fossile). I. 553; II. a. 154, 155, b. 188. Laurogene cretacea. V. 740. Laurus acutangula. VIII. 494. — Heliadum. VI. 287. — Lalages. III. a. 169. — ocoteaefolia. II. d. 41. — primigenia. III. c. 157; *V.* 230. — princeps. IX. *V.* 19. — Swoszowicensis. I. 236; II. b. 147, 186, d. 41; III. d. 135; VIII. 494. Lebias Mayeri. VIII. 482, 483. Leda. IX. 647. — Deffneri. IX. 476. — hyperboraea. IX. 606, 615. — minuta. IX. 605, 607, 615, 624, 647. — oblongoides. IX. 648. — rostrata. IX. 606, 607, 647. — striata. VIII. 227. — sp. IX. 648. Leguminosae (fossile). I. 361, 745; II. a. 154. Leguminosites ingaefolius. II. d. 42. — machaerodes. II. d. 42. Leiospermum sp. I. 557. Lepidodendreae. VII. 274. Lepidodendron brevifolium. IV. 435. — Haidingeri. IV. 435. — Sternbergi. IV. 435. — sp. I. 552; III. d. 119; VI. 407; VII. 265. Lepidoderma Imhofi. VII. 250. Lepidophloios sp. VII. 265. — Lepidopides brevispondylus. VIII. 319; IX. 51. — dubius. IX. 51, 128. — leptospondylus. IX. 50, 104, 128. Lepidotus sulcatus. IX. *V.* 40. Leptaena depressa. III. a. 168. — sp. VII. 239, 240. Leptastraea antiqua. II. 162. Leptomeria (fossile). III. a. 171. Lepton squamosum. IX. 621. Leptoria Koninckl. II. a. 161. Leuciscus brevis. IX. *V.* 35. — Colei. III. d. 126; VIII. 480. — sp. VIII. 502. Libellula concolor. VII. 831 Anm. — Freyeri. VII. 831. — Dorii. VIII. 502 Anm. — Hageni. VIII. 831. Lichas incola. VII. 357. Lima aspera. I. 250. — gibbosa. VI. 889. — gigantea. IV. 735, 738, 742, 744; VII. 731; X. *V.* 47. — Haueriana. VII. 340. — Hoperi. I. 245. — multicostata. V. 711, 712; VII. 327; X. *V.* 61. — proboscidea. IV. 376. — Pseudo-cardium. V. 711, 712. — punctata. X. 259. — rigida. IV. 376. — semicircularis. IV. 376, 775. — striata. X. 82. — succincta. X. 259. — sp. IV. 361, 727; V. 690; VI. 297; VII. 340. Limnea sp. VI. 297. — Zelli. VIII. 382. Limnobia cingulata. VII. 832 Anm. — debilis. VII. 832 Anm. — formosa. VII. 832 Anm. — tenuis. VII. 832. Limopsis aurita. IV. 183. Lingula attenuata. VII. 357. — Jowensis. VII. 796. — sulcata. VII. 357. — tenuissima. VIII. 149; X. 24. Lingulina costata. V. 757; VI. 352. Linthia irregularis. IX. 116. — sp. IX. 116. Liquidambar

Europaeum. II. d. 41; VI. 287. Listriodon splendens. I. 166; II. d. 121; X. *V.* 53. Lithodendron clathratum. IV. 378. — compressum. V. 690. — Dianthus. V. 194. — dichotomum. V. 125. — subdichotomum. IV. 378. — sp. IV. 361; IX. *V.* 121. Lithodomus lithophagus. III. c. 132; VII. 591; IX. 385. Littorina expansa. IX. 606, 616. — littorea. IX. 605, 613, 626, 627, 651. — neritoides. IX. 605. — palliata. IX. 616, 651. — rudis. IX. 602, 616, 651. Littorinella sp. VI. 438. Lomatia sp. I. 682. — Swantoviti. VII. 334. Lomatophloios crassicaule. IV. 435. Loripes undularia. IX. 626, 642. Lottia fulva. IX. 623. — parvula. IX. 626. — testudinalis. IX. 616, 650. — virginea. IX. 600, 650. Loxonema Meneghinii. IX. 141. Lucina Altivillensis. II. b. 190. — anodonta. I. 665, 668, 672, 676; II. d. 113, 115; IX. 382, 383, 385. — Astartea. IX. 642. — circinaria. IX. 153. — Columbella. I. 672, 676; II. b. 190, d. 110, 115; III. a. 223, d. 52; IV. 188; V. 748; VII. 193, 354, 575, 580, 581, 584, 591; IX. *V.* 144; X. *V.* 48. — dentata. I. 676; IV. 188; V. 748. — divaricata. I. 672; II. b. 190, d. 115; III. a. 223; VII. 193, 354, 572, 575, 580, 581; X. *V.* 48, 49. — elliptica. IX. 639. — Flandrica. II. b. 190. — flexuosa. IX. 626. — Haidingeri. I. 676; IX. 382, 383, 384, 385, *V.* 9; X. 178. — lactea. I. 676; IV. 188; V. 748. — lenticularis. VII. 327; IX. *V.* 73. — leonina. VII. 193, 580; X. *V.* 65. — proavia. III. a. 167. — Radula. II. b. 190; IV. 183, 188; V. 748; IX. 615, 626, 642. — rotundata. IX. 622. — Scopulorum. I. 595; III. a. 223; VII. 580. — squamosa. IV. 188; V. 748. — transversa. I. 672, 676. — undulata. II. b. 190; IX. 612. — sp. II. b. 190; III. d. 51; IV. 274, 282; VI. 438; VII. 599; IX. 155, 383, 384; X. 178, 179, 186, *V.* 105. Lunulites intermedia. IV. 646. — umbellata. IV. 646. — ureeolata. IV. 646. — sp. IX. 600. Lutraria convexa. VII. 192, 572, 575, 576; IX. 382, 383, *V.* 9. — elongata. II. a. 141. — Listeri. IX. 626. — sanna. I. 672; IX. 383; X. 508. — unionoides. I. 40. — sp. II. a. 14; IV. 377; VI. 437, 438, 440. Lycophrys lenticularis. I. 596. Lycopodiaceae (fossile). VIII. 335. Lycopodites sp. VIII. 218. Lygaeites pumilio. VII. 832 Anm. — pusillus. VII. 832 Anm. Lygaeus ventralis. VII. 832. Anm. Lymnaeus acutus. VIII. 478, 479, 480. — medius. IX. 437. — minor. IX. 437. — sp. II. a. 7, d. 122; IV. 434; VI. 437; VII. 545; VIII. 328, 330, 333, 477, 494, 502; IX. 534; X. 25. Lyriodon alaeformis. I. 163. — Curionii. X. 104.

Macreightia Germanica. X. 511. Macropneuster pulvinatus. IX. 116, 121. Mactra arcuata. IX. 626, 639. — deaurata. IX. 615. — deltoidea. I. 596. — inflata. I. 672; II. d. 117. — Podolica. II. d. 117; III. a. 223; IV. 275; V. 565, 566; VII. 354; X. *V.* 175. — ponderosa. I. 668. — solida. V. 219; IX. 605, 620, 626, 638. — Sirena. VIII. 224. — striatella. I. 594. — Stultorum. IX. 626, 638. — subtruncata. IX. 626, 639. — triangula. II. b. 174; IV. 183, 644; V. 219. — sp. II. a. 6; VI. 290; X. 178, 579. Mactromya cardioides. IV. 742, 743. Madrepora compressa. II. a. 162. — hippurea. III. a. 147. — raristella. IX. 115. — Taurinensis. IX. 115. — sp. X. *V.* 188. Maeandrina angigyra. IX. 115. — reticulata. IX. 115. — Salzburgiana. II. a. 161. — sp. IV. 355. Magas gracilis. III. c. 138. — semiglobosus. III. c. 138. Magnolia Bohemica. VIII. 494. Malachius pallidus. VII. 831 Anmerk. Mallotus villosus. IX. 637. Malpighiaceae (fossile). II. b. 188. Malpighiastrum lanceolatum. III. d. 135. Mammuth (Schädel vom). VII. 841. Manon capitatum. I. 248. — Peziza. I. 248, 250. Marginella auriculata. I. 671; II. d. 105. — Aurisleporis. IV. 190; VII. 569. Marginulina cristellarioides. V. 757. — hirsuta. V. 757. — inflata. V. 750, 757. — regularis. V. 757. — rugoso-costata. V. 752. — similis. V. 757. — sparsispina. V. 750. — sp. V. 750; VI. 354. Marsupialia (fossile). X. *V.* 177. Martes sp. (fossil). IX. *V.* 147. Mastodon angustidens. I. 54, 194; II. b. 83, 187, 188, d. 121, 122; III. d. 46; IV. 156, 711, 714, 836; V. 521; VII. 221; VIII. 284, 365; IX. 629. — Arvernensis. IX. *V.* 88. — brevirostris. IV. 714. — longirostris. IX. *V.* 88. — (Stosszahn von). VII. 608. Megalodus Carinthiacus. IX. 340, 360, *V.* 128; X. *V.* 11. — cucullatus. IV. 732. — scutatus. IV. 731, 777; VI. 894 Anmerk.; VIII. 304, 795; IX. 474. — triqueter. III. d. 90; IV. 731, 734, 735, 736; V. 124, 129; VI. 855 Anmerk.; VII. 336, 337, 669, 685, 731; VIII. 216, 218, 219, 302, 438; IX. 269, 469, 475, 476, 477, 478, 479, *V.* 93, 97; X. 105, 107, *V.* 50, 59, 60. Melania campanella. II. a. 141; III. d. 77. — conica. VIII. 216. — costellata. III. a. 193; IV. 183. — curvicosta. IV. 639. — distorta. IV. 188; V. 747. — elongata. X. 504, 506. — Escheri. VIII. 283, 444, 451, 453, 454; IX. 393, 394, *V.* 9, 49; X. 217, *V.* 50. — Pecchiolii. VIII. 382. — semidecussata. VIII. 223. — Stygia. III. a. 193; VIII. 223. — subulata. II. d. 122; X. 25. — turrita. VII. 176; VIII. 283, 287, 451, 453. — sp. II. a. 82; III. a. 168; IV. 329; VI. 436, 437, 438; VIII. 227; IX. 395, *V.* 95; X. 212, 281, 314. Melanopsides (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 381. Melanopsis Bonellii. IV. 639. — Bouéi. II. b. 83 Tabelle, 86, d. 118; III. a. 223; IV. 40, 405; VII. 354; X. 569. — buccinoidea. II. a. 5, b. 190; VI. 438. — Dufouri. II. d. 116; III. a. 223; X. 569. — impressa. VII. 354; VIII. 323. — Martiniana. I. 622, 745; II. b. 83 Tabelle, d. 118; III. a. 223, d. 51; IV. 40, 43, 183, 405, 707, 709; VII. 354; IX. 107; X. 217, 512 Anmerk., *V.* 38. — Olivula. VI. 434, 437, 438. — Pichleri. VI. 735, 736. — pygmaea. II. b. 83 Tabelle, 86. — sp. II. a. 8; VI. 437; VIII. 224.

Meleagrina sp. III. d. 126. Meletta crenata. VIII. 321; X. 512 Anmerk., V. 38. — longimana. IX. 104, 128; X. V. 37, 38. — Sardinites. VIII. 321, 322; IX. 104; X. 497, 506, 512 Anmerk., V. 38. — sp. I. 56, 689; VIII. 446. Melia sp. V. 205; VII. 733. Melonites sp. VIII. 182. Membranipora angulosa. II. a. 160. — cincta. II. a. 160. — robusta. II. a. 162, 163. — vulgata. II. a. 160. Merista. II. d. 150, 160. Mesodesma Jauresi. IX. 615. Mesostylus antiquus. V. 708, 709, 711, 742. Micraster Cor anguinum. I. 244, 249, 250; II. b. 191; V. 721; IX. V. 73; X. V. 71. — Cor testudinarium. I. 249. — gibbus. IX. 116. — sp. I. 247. Microlabis Sternbergi. VII. 250. Microphyllia Agaricites. II. a. 161. Millepora microstoma. II. a. 162. Millericrinus mespiliformis. V. 690, 695, 696. Mitra Bronni. IV. 644. — buccinula. I. 671. — clavatularis. IV. 182. — cornea. IX. 626. — cupressina. II. d. 107; IV. 182, 644. — Ebenus. I. 675; V. 210. fusiformis. I. 671; III. a. 147, 222, d. 77; IV. 182, 188, 643, 706; V. 741. — goniophora. IV. 188; V. 741. — Michelottii. IV. 182. — obtusangula. I. 675. — plicatella. IX. 121. — plicatula. IV. 644. — pyramidella. IV. 644. — recticosta. III. a. 222. — scrobiculata. II. a. 88, b. 173; IV. 182, 643. — striato-sulcata. IV. 644. — striatula. IV. 182, 644. — sp. IX. 606, 656. Mitrae (fossile) d. Wiener Beckens. III. b. 166. Modiola angularis. IV. 404. — cymbaeformis. VI. 297 Anm. — discors. IX. 615, 617, 622. — discrepans. IX. 615, 617. — elegans. VI. 297. — gibbosa. IV. 374, 375. — Glandula. IX. 616. — Ligeriensis. V. 709. — marginata. V. 565; VI. 291, 297; X. 27. — nigra. IX. 615. — Scalprum. IV. 744. — Schafhäutli. II. c. 22, 25; IV. 731, 735, 737; VII. 37, 731; IX. 477; X. 107. — striata. IV. 274. — subcarinata. I. 673; II. a. 88, d. 117; IV. 190, 405; V. 219; X. 507. — Taurinensis. VII. 571, 572, 575. — Volhynica. V. 565; VI. 297 Anm. — vulgaris. IX. 605, 607, 615, 648. — sp. a. 25, d. 56; VI. 290. 448; VII. 336; IX. 112. Mohlites parenchymatosus. VI. 289. Mollusca d. Wiener Beckens (Dir. Hörnes's Werk über die). X. V. 174. Monoceros monacanthus. IV. 182. Monodon monoceros. IX. 636. Monodonta angulata. VII. 354. — Araonis. IV. 190. — Cerberi. VIII. 123. — laevigata. V. 751. Monodontae (fossile) d. Wiener Beckens. VII. 191. Monotis salinaria. I. 114; III. b. 67; IV. 723, 724; VII. 36, 739; VIII. 148, 150; X. 23, 85. — sp. IV. 726, 733; VI. 901. Montacuta bidentata. IX. 640. — ovata. IX. 621. — substriata. IX. 621. Montlivaltia rudis. II. a. 161. — sp. IV. 329; VIII. 304. Moreae (fossile) II. a. 154, b. 188. Morinium populifolium. V. 740. Mosasaurus Camperi. X. V. 93. Münsteria annulata. VII. 36. — geniculata. VII. 36. — Aquitanica. VII. 353. Murchisonia angulata. X. V. 59. — Murex absonus. IV. 642. — Brandaris. II. b. 173; IV. 642; V. 218. — craticulatus. I. 671, 675; IV. 642; VII. 353. — cristatus. IV. 182, 642. — decussatus. I. 665, 666, 671. — distinctus. IV. 642. — Erinaceus. IV. 642; VII. 353; IX. 601, 606, 626, 652. — exiguus. I. 672. — fistulosus. IV. 182, 642. — flexicauda. IV. 182, 642. — horridus. IV. 642. — inermis. I. 671; II. b. 173, d. 77. — Lasseignei. IV. 182, 642. — lavatus. III. a. 147, d. 77. — Lingua bovis. I. 594. — plicatus. IV. 182, 642. — polymorphus. III. a. 222; IV. 182, 642. — Pomum. I. 596. — porulosus. V. 210. — Rénieri. IV. 182. — scalaris. IV. 182, 642. — Sedgwicki. V. 218. — spinicosta. IV. 182, 706. — squamulatus. IV. 642. — striaeformis. IV. 188; V. 741. — subclavatus. III. a. 222. — sublavatus. I. 666, 672, 675; IV. 188; V. 210, 565, 741; VI. 297; VII; 574, 575; X. 569. — Truncolus. I. 671; II. b. 173, d. 112; III. a. 222; IV. 182, 642. — vaginatus. IV. 182, 642. — Vindobonensis. IV. 188; V. 741. — vitulinus. I. 668. — sp. I. 672; II. a. 13; X. V. 128. Murices (fossile) d. Wiener Beckens. IV. 851, 853, 854. Mya arenaria. IX. 603, 605, 615, 626, 638. — lata. IX. 626, 638. — truncata. IX. 605, 606, 615, 638, 639. — Tugon. IX. 383. Myacites elongatus. IV. 374. — Fassaënsis. I. 32, 360, 644; IV. 158, 369, 471, 721, 864; V. 120, 401, 893; VI. 744, 890; VII. 339, 441, 635, 654; VIII. 157, 213; IX. 267, 336, 337, 461, 462; X. 82, 83, 166. — longus. X. 24. — sp. IX. 159. Myadora sp. VII. 580. Mycetophila amoena. VII. 832 Anm. — antiqua. VII. 832 Anm. — Meigeniana. VII. 832 Anm. — pulchella. VII. 832 Anm. Myliobatis gonopleurus. VI. 187. — sp. II. a. 13, b. 190. Myoconcha Curionii. IX. 140. — Lombardica. IX. 140. Myophoria cardissoides. VI. 349. — Credneri. VI. 448. — curvirostris. IV. 782; X. 24. — elongata. IX. 139, V. 17; X. 103. — Goldfussi. IX. 158, 160, 337, 338. — Kefersteini. IX. 340. V. 40; X. 24, 104. — Pesanseris. IX. 159; X. 24. — simplex. IX. 267. — Struckmanni. X. 24. vulgaris. IX. 158. — Whatleyae. X. 24, 104. — sp. IV. 91, 100, 721, 864; VII. 443, 635; VIII. 305; IX. 158. Myoporum sp. II. b. 188. Myrianites II. a. 22. Myrica acuminata. IV. 115. — banksiaefolia. IV. 115; X. 117. — Caroliniana. VIII. 743. — cerifera. VIII. 743. — cordifolia. IX. V. 13. — denticulata. VIII. 744. — Joannis VIII. 739, 743; IX. V. 3. — longifolia. IV. 115. — Oeningensis. VIII. 744. — Ophir. X. 117. — sp. II. b. 188; IV. 115. Myrmica bicolor. VII. 832 Anm. — concinna. VII. 832 Anm. — Jurinei. VII. 832 Anm. — pusilla. VII. 832 Anm. — tertiaria. VII. 832 Anm. — venusta. VII. 832. Anm. Myrsine (fossile). I. 552. Myrtaceae (fossile). I. 361, 552, 557, 745; II. a. 155, b. 188. Myrtus Austriaca. II. d. 42, 44. Mytilus Antiquorum. IX. 626. — Brardi. I. 595, 596; VI. 441.

— eduliformis. IV. 374; IX. 159, 160. — edulis. IX. 602, 615, 620, 626, 648. — Faujasi. I. 668; VI. 441, 443. — Gallo-provincialis. V. 219. — Haidingeri. I. 665, 667, 668, 670, 673; II. a. 141, d. 113; IV. 275; X. *V.* 33. — Helli. IV. 374. — incrassatus. V. 565; IX. 383. — marginatus. V. 565. — sulcatus. X. 504, 506. — vulgaris. IX. 648. — sp. II. a. 6; IV. 91; IV. 742; VI. 285; VII. 216; IX. 112, 381, *V.* 149; X. 27, 411, *V.* 23, 49.

Nassa granulata. IX. 655. — incrassata. IX. 665. — Labellum. IV. 643. — Macula. IX. 605. — miocenica. IV. 643. — Monensis. IX. 606, 655. — pliocenica. IX. 606, 655. — pseudoclathrata. IV. 643. — reticulata. IX. 655. — semistriata. IX. 655. Natica Alderi. IX. 605, 657. — Alpina. IV. 735. — Bowerbanki. IX. 656. — bulbiformis. I. 162; II. d. 58. — bulimoides. VI. 311. — canaliculata. II. b. 190. — catenoides. IX. 626. — clausa. IX. 606, 607, 616, 657. — cochlearia. VIII. 223. — Comensis. IX. 141. — compressa. I. 672, 676; II. b. 173, 190, d. 112; III. a. 223; IV. 183; V. 892; VII. 572, 577. — crassatina. I. 590; VIII. 223. — epiglottina. II. a. 88. — Escragnollensis. VI. 311. — falcellata. IX. 141. — fastosa. IX. 141. — Gaillardoti. IX. 159. — Gaultina. VII. 20. — glaucina. I. 672; II. b. 173, 190; III. a. 223; IV. 183, 639; V. 751, 753, 754. — glaucinoides. II. d. 105; IV. 190, 706; V. 210; VI. 297. — Groenlandica. IX. 606, 623, 657. — helicina. IV. 183, 190, 639; IX. *V.* 67. — helicoides. IX. 657. — intermedia. VI. 187; VIII. 223. — Inwaldiana. III. c. 136. — Josephinia. III. a. 223; VII. 571, 572, 578; X. *V.* 38. — labellata. I. 672; IV. 188; V. 741. — lemniscata. IX. 141. — Lipoldi. IX. 141. — longispira. IX. 114. — Matheroniana. I. 252. — maxima. I. 590, 591, 592. — Meriani. IX. 141, 470. — millepunctata. I. 238, 622, 665, 672, 676; II. b. 173, d. 106, 111, 112; III. a. 147, 223, d. 77; IV. 183, 188, 640, 704; V. 210, 219, 741, 890; VI. 435; VII. 571, 572, 578; IX. 379, 383, *V.* 8; X. *V.* 33. — monilifera. IX. 626, 656. — Monstrum. IX. 137. — Olla. IV. 183, 639; VII. 572. — oolithica. IX. 159. — perusta. VI. 187; X. 497. — ponderosa. I. 590. — pseudoepiglottina. IV. 639. — pseudo-maculosa. IV. 640. — pseudo-spirata. VII. 379. — sigaretina. III. a. 193. — Smithi. IX. 606, 657. — subspirata. VII. 379. — Vulcani. VIII. 223. — sp. I. 398; II. a. 5, 13, d. 56, 58; III. a. 184, d. 51; IV. 355, 726; VI. 169, 249, 250; VII. 340, 448, 451, 645, 729; VIII. 429; IX. 112, 379, 383, 385, 656, *V.* 95; X. 99, 178, *V.* 128. Naticae (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 378. Naticella armata. VIII. 179. — costata. I. 161, 360, 644; IV. 471, 721; V. 120, 401, 893; VI. 744; VII. 339, 441, 442, 447, 448, 635, 654, 684, 841; VIII. 179; IX. 267, 336, 337, 338, 340, 460, 461, 462, *V.* 111; X. 82, 83, 84, 86, 87. Nautilus Aganiticus. II. b. 191. — aratus. II. c. 24; IV. 383, 777; VIII. 143. — bidorsatus. IX. 159. — Diluvii. IV. 190. — elegans. IX. *V.* 73, 76. — imperialis. II. a. 13. — inflatus. VI. 307. — intermedius. II. c. 24, 30; VII. 420, 733. — latedorsatus. IV. 386. — lingulatus. I. 52; II. a. 13; III. c. 144; VIII. 317; IX. 114, 117, 120; X. 494, 506. — Neocomiensis. III. c. 139; VI. 311. — plicatus. I. 50; VI. 311. — Ramsaueri. V. 204. — rectangularis. V. 205. — Requienianus. I. 239; II. c. 37; III. c. 139. — semistriatus. IV. 383; VII. 732; VIII. 144. — Sowerbyanus. IX. *V.* 76. — striatus. IV. 782. — Sturi. IV. 735, 736. — Toarciensis. IV. 386. — truncatus. IV. 386. — Varusensis. VI. 311. — Ziczac. II. a. 13; IX. 120. — sp. I. 163; II. b. 122; IV. 373, 387, 746, 747, 752; VI. 892; VII. 732; IX. 117; X. 95, 99, 411, *V.* 77. Neaera abbreviata. IX. 623. — costata. IX. 623. — cuspidata. IX. 623. Nemertilites Strozzii. V. 228; IX. 127; X. 265, *V.* 5. — sp. VII. 607. Nerinea bicincta. I. 162; II. b. 123, d. 59. — Borsoni. I. 190. — Bruntrutana. I. 255; II. c. 48; III. c. 136; IV. 54. — Buchi. VII. 734, 735. — Carpathica. III. c. 136; IX. 346. — depressa. I. 255; III. c. 136. — Haueri. IX. 346. — Mandelslohi. I. 255. — Renauxiana. VI. 311; IX. 347. — Roemeri. I. 255. — Staszyci. VII. 844; IX. 346. — teres. II. c. 48. — turritellaris. II. c. 48. — Visurgis. II. c. 48. — Voltzi. III. c. 136. — Wocinskiana. III. c. 136. — sp. III. b. 162. Nerita asperata. VIII. 330. — conoidea. I. 52; VII. 814. — funesta. VIII. 330. — Goldfussi. II. a. 25. — picta. VII. 572; VIII. 321; IX. *V.* 149. — Plutonis. VIII. 330. — Prinzingeri. X. 98. — Rhenana. VIII. 330. — Schmiedeliana. VII. 814; VIII. 185. — zebrina. IV. 639. — — var. marmorata. IV. 639. — sp. VI. 297; VII. 39; IX. 112, 114, 393; X. 506. Neritae (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 378. Neritina conoidea. VIII. 185; IX. *V.* 55. — Danubialis. VI. 438. — fluviatilis. I. 668, 672; II. b. 83 Tab., 86, d. 116; IV. 40. — Grateloupiana. X. 569. — Pachi. IV. 711. — virginea. IV. 713. — sp. II. a. 5, 8. Neritinium dubium. I. 236. Neritopsis elegantissima. IV. 753, 763. — Radula. VIII. 378. Nerium sp. IV. 192. Neuropteris acutifolia. V. 197; VIII. 603. — Alpina. V. 197; VI. 523 Anmerk. — auriculata. VIII. 603. — conferta. VI. 103. — cordata. V. 197. — gigantea. III. d. 129. — ligata. IV. 742. — Loshi. III. d. 129. — sp. IV. 435; VII. 265. Nilssonia compta. IV. 742. Niobe elongata. VII. 340. Niso eburnea. VIII. 379. — terebellata. IV. 183. — Terebellum. IV. 639. Nitidula Freyeri. VII. 831 Anmerk. Noctuites effossa. VII. 832 Anmerk. — Haidingeri. VII. 832 Anmerk. Nodosaria aculeata. V. 753, 759. — affinis. V. 757. — Bacillus. V. 759. — Badenensis. V. 757. — coarctata. V. 753. — globifera. V. 752. — irregularis. V. 759, 761.

— quaternaria. V. 762. — Rolleana. VI. 354. — rudis. V. 749, 753, 759. — stipitata. V. 753. — subglobularis. V. 753. — venusta. V. 748, 755, 757, 759. — sp. V. 748. Noeggerathia sp. VIII. 335; IX. 266. Nonionina Bouéana. V. 748, 750, 752, 755, 758, 759, 761, 762. — bulloides. V. 748, 750, 752, 753, 755, 757, 758, 759, 761, 762. — granosa. IV. 427. — perforata. IV. 427. — punctata. II. a. 163; IV. 427. — Soldanii. V. 748, 749, 750, 752, 753, 755, 758, 759, 761, 762; VI. 354. — sp. II. b. 122. Notaeus Agassizi. III. b. 177. Nototherium Mitchelli. X. *V.* 177. Nucleus sp. IV. 548. Nucula. IX. 647. — Bohemica. VII. 357. — Cobboldiae. IX. 626, 627, 646. — complanata. IV. 735, 737, 742, 744; VII. 37. — compta. I. 236. — emarginata. II. b. 190. — Faba. VII. 84. — Hammeri. IV. 742; V. 127, 683. — Hausmanni. V. 127. — hyperboraea. IX. 615. — Lacryma. IV. 375, 775. — major. VII. 357. — margaritacea. I. 676; IV. 645; V. 210, 219, 742. — minuta. IX. 615. — myalis. IX. 615. — Nucleus. IX. 605, 646. — nuda. IV. 374. — oblongoides. IX. 626. — obliqua. VII. 84. — pectinata. I. 251. — Placentina. I. 673; II. a. 141; V. 219. — producta. X. *V.* 61. — proxima IX. 646. — pseudospirata. VII. 379. — Rosthorni. VII. 373. — rostralis. I. 165. — semilunaris. IX. *V.* 73. — subspirata. VII. 379. — subtrigona. IV. 374. — sulcata. V. 219. — sulcellata. IX. 139; X. 24, 103. — striata. I. 236, 665, 676; V. 210, 219; VIII. 227. — striatula. I. 251. — tenuis. IX. 606, 615, 626, 646. — sp. II. a. 6, 25, d. 56; IV. 190, 707; V. 127; VI. 611; VII. 84, 337, 796; IX. 267, 268, *V.* 67, 101; X. 103. Nullipora annulata. VI. 653; VIII. 148; X. 99. — palmata. II. a. 10. — polymorpha. IX. 659. — ramosissima. II. a. 10; V. 756; VII. 582, 583. — sp. II. a. 141; VI. 901; IX. 619. Nummulina dissimilis. VI. 311. — elliptica. II. a. 10, 11, 16. — Humus. VI. 311. — intermedia. I. 590, 591, 592. — laevigata. II. a. 16; IX. 122. — modiolata. II. a. 16. — orbicularis maxima. II. a. 9. — Rotula. II. a. 10. — scabra. IX. 112. — umbilicata. II. a. 10, 11, 17. — sp. II. a. 11. Nummulites Beaumonti. X. 295. — Biarritzianus. I. 193; X. 295. — complanatus. IV. 548. — distans. I. 193. — exponens. X. 295. — granulosus. X. 295. — laevigatus. IV. 548. — Lucasanus. X. 283. — Murchisoni. X. 282, 283, 293, 321. — orbitoides. X. 337. — perforatus. X. 337. — Placenta. VII. 23. — planispirus. X. 337. — planulatus. IV. 548; X. 282, 283, 293, 320, 321. — polygyratus. VII. 23. — primaevus. X. 282, 298. — Ramondi. VII. 23. — Spira. X. 295. — spissus. VII. 23. — striatus. X. 283, 295, 320. — variolarius. VI. 297. — sp. IX. 115. Nyctagineae (fossile). I. 558; II. b. 188. Nyctomyces antediluvianus. VI. 289. Nymphaea Arethusae. VIII. 494. — Blandusiae. VII. 544.

Oculina Poppelacki. III. d. 77. Odontopteris obtusiloba. VI. 102; VII. 840. Odontostomata (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 379. Odostomia plicata. IX. 622. Oedipoda Haidingeri. VII. 831. — imperialis. VII. 831. — longipennis. VII. 831. — melanosticta. VII. 000. — Partschi. VII. 831 Anmerk. — pulchra. VII. 831 Anmerk. — Ungeri. VII. 831 Anmerk. Ogygia desiderata. VII. 357, 358. — sola. VII. 358. Olea Bohemica. VIII. 748; IX. 345. — borealis. VIII. 494. — mediterranea. I. 396; IX. 345. Oleaceae (fossile). II. a. 154. Olenus punctatus. III. b. 143. Oliva Alpina. IV. 777. — Dufresnei. I. 671, 676; II. b. 190. — flammulata. III. a. 222. — plicaria. I. 594. Omphalia conica. VII. 734. — Giebeli. IX. 492. — Kefersteini. VIII. 281, 443; IX. 211. Oniscia Cithara. III. d. 138. Operculina complanata. I. 192, 193; X. 283, 293, 295. Ophion tertiarius. VII. 831 Anmerk. Opis sp. IV. 726. Orbicula discoidea. X. 24. — sp. III. a. 171. Orbiculoidea sp. III. a. 171. Orbitulites complanatus. IV. 548. — Pratii. IV. 118. — submedius. IX. 122. — sp. VI. 223, 249; X. 282, 293. Orbulina universa. VI. 351, 353, 354; VII. 585, 588. Oreodon Culbertsoni. VIII. 182. Ornithopterus. X. *V.* 55. Orthis crenistria. VII. 340. — desiderata. VI. 611. — eximia. VII. 424. — macrostoma. VI. 611. — moesta. VII. 357. — socialis. VII. 357. — sp. VI. 417; VII. 240, 243; X. *V.* 70. Orthoceras alveolare. VII. 444. — bonum. VII. 357, 358. — complexum. VII. 357, 358. — depressum. V. 204; VII. 729. — dubium. VII. 444; VIII. 179, 216. — elegans. VII. 94. — exspectans. VII. 357, 358. — primum. VII. 357, 358. — regulare. VII. 242. — reticulatum. IV. 864; VII. 839. — sp. I. 29; IV. 386, 735, 736, 746, 752, 753; VI. 417; VII. 37, 239, 241, 379, 724; VIII. 148, 151; X. 95, 99, *V.* 59. Orthoceratites sp. IV. 329. Ostracodae (fossile). VI. 193, 251; VII. 589; VIII. 282. Ostrea borealis. IX. 616. — callifera. II. b. 190; III. d. 51; VI. 291; VII. 591; IX. 383, 385; X. 178, 568. — cariosa. VI. 188. — caudata. II. b. 190. — cingulata. II. d. 152; IV. 107. — Cochlear. X. 178, 187. — crassirostris. IX. 175, 178, 187, 195. — crassissima. II. a. 17. — cyathula. I. 591; VI. 188, 435, 441; VIII. 315, 329; X. 506. — Cymbiola. VI. 188. — Cymbula. II. b. 190. — cymbularis. I. 663, 666, 668, 673; II. a. 14. 141, b. 174; III. a. 224; IV. 405; V. 219; VII. 355, 372; VIII. 227, 323. — denticulata. II. b. 174; IV. 645. — digitalina. I. 676; V. 761; X. *V.* 33, 49, 65, 124, 126. — diluviana. IX. *V.* 73. — Dupiniana. VI. 311. — eduliformis. IV. 707. — edulis. IV. 709; V. 219; IX. 606, 616, 649, *V.* 101. — fimbriata. X. *V.* 37. — flabellula. II. b. 190; IV. 707; VI. 438. — Frons. V. 709, 710. — gigantea. II. a. 12, 14, 16. — Gingensis. X. *V.* 65. — Haidingeri. VI. 343, 347. — Haidingeriana.

IV. 377, 735, 738, 775; VII. 727; X. 104, 411, *V.* 23, 47. — hastellata. V. 690, 695, 697. — Hippopodium. I. 244; IX. *V.* 73. — intusstriata. IV. 377, 777; VI. 446, 448. — Lacerta. II. b. 190. — lamellosa. II. d. 110; IV. 709; X. *V.* 65. — Larva. IV. 709. — latissima. II. a. 141; IV. 405. — longirostris. I. 193, 666, 676; II. a. 7, 8, b. 190; III. d. 14; VI. 291, 300, 446; VII. 564, 569, 571, 572, 575, 580, 590, 699, 813; VIII. 323; IX. 174; X. 439, 506, *V.* 78. — macroptera. VII. 524. — Marshi. I. 114; IV. 85, 94, 377. — Marshiformis. IV. 343, 344, 377. — media. X. 178, 187. — minuta. IX. *V.* 73. — Montis-caprilis. VII. 724, 727; IX. *V.* 17; X. 104. — mutabilis. II. a. 6. — navicularis. IX. 156. — Neumanni. IX. *V.* 73. — placunoides. IV. 376, 377. — Proteus. I. 244; X. *V.* 61. — Sowerbyi. VI. 438. — spondyloides. IX. 159. — subserrata. V. 682, 695. — sulcata. IX. *V.* 73. — Toucasiana. VI. 310. — undata. II. b. 190. — Ventilabrum. I. 236. — vesicularis. I. 245; V. 709, 710; IX. *V.* 73. — Virginica. I. 193. — sp. III. a. 147, d. 23, 77; IV. 404, 705; V. 210; VI. 194, 249, 407, 435, 437; VII. 564, 568. 567, 571, 572, 578, 583, 697, 699; VIII. 321; IX. 116, 385, 385; X. 260, 568, *V.* 49, 126. Ostrya alnifolia. I. 604. — Prasili. VI. 289. — sp. VII. 334. Osyris sp. III. a. 171. Otozoum Moodyi. X. *V.* 190. Ovula gigantea. VII. 814; VIII. 185. — sp. II. a. 13. Oxyrhina Desori. II. b. 190. — Mantelli. VII. 327. — sp. II. a. 13; IV. 189, 387. Oxytelus sp. VII. 831 Anmerk.

Pachycardia rugosa. IX. 139, 339, 340, 360, 361; X. 103, 104. Pachyderma rugosa. IX. *V.* 111. Pachygyra daedalea. II. a. 161. — princeps. II. a. 161. Pachyneura Morloti. VII. 831 Anmerk. Palaeobromelia. III. a. 178. Palaeomeryx medius. I. 166; V. 524. — sp. VI. 442. Palaeoniscus Vratislaviensis. II. d. 166. — sp. VII. 812. Palaeotherium Aurelianense. II. d. 121. Palaeoxyris. III. a. 178. — Münsteri. II. a. 157. — regularis. II. a. 157. Palissya Brauni. IV. 742. Palmacites caryotoides. III. d. 130. Palmae (fossile). II. a. 154, 155. Paludina acuta. II. d. 116; IV. 426. — concinna. VII. 699. — Sattleri. VII. 699. — unicolor. IX. 627. — sp. IV. 426, 427, 706; VI. 297; VII. 448, 449; IX. 121; X. 506. Paludinae (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 580. Pandaneae (fossile). VII. 283; VIII. 157. Pandanus sp. II. a. 157, b. 122. Pandora margaritacea. IX. 621. Panopaea arctica. IX. 606, 615, 620, 638. — Bivonae. V. 219. — Faujasi. I. 597, 665; II. b. 190; IV. 275, 405, 644, 709; V. 219; VII. 561; VIII. 227, 327; IX. 382, 383. — Hebertiana. VI. 435. — longirostris. IX. 139. Menardi. VII. 561; X. *V.* 78, 124. — sp. III. d. 48; IV. 282, 377. Papilionaceae (fossile). I. 557. Paracyathus Bouéi. II. a. 161. — clavatus. II. a. 160. — Cupula. V. 747. — firmus. V. 747, 751. — pusillus. V. 751. — velatus. V. 747. Parastraea grandiflora. II. a. 162. Parmophorus Bellardii. I. 672. Patella aspera. I. 663. — ferruginea. I. 668; VIII. 384. — laevis. IX. 650. — papyracea. IV. 381. — pellucida. IX. 605, 649. — sinuosa. I. 668. — vulgata. IX. 606, 614, 649. — sp. IV. 427; IX. 114. Pecopteris aequalis. X. *V.* 194. — aspera. II. b. 145. — Pluckeneti. V. 197. — plumosa. V. 197. — polydactyla. II. d. 143. — Stuttgartensis. I. 49; IV. 742. — Zippei. I. 161; II. b. 122. — sp. I. 357; VI. 102, 235; VII. 265. Pecten aequicostatus. IX. *V.* 73. — aequivalvis. IV. 376, 775. — alternans. IV. 376. — ambiguus. IV. 376. — apricus. IX. 385. — asper. V. 740. — aspersus. III. a. 183. — Billaudeli. I. 592. — Burdigalensis. I. 594; II. b. 190; VIII. 323. — concentricus. VII. 340. — corneus. II. a. 14. — cristatus. I. 673; IV. 90, 405; V. 890; VI. 354; VII. 340; VIII. 285; IX. 382, 383, 385. — curvatus. V. 709, 710, 712. — Deluci. VIII. 302. — demissus. V. 682, 695. — Discites. IV. 376; IX. 159. — dubius. I. 668. — exilis. IV. 300. — filosus. X. 103. — flabelliformis. I. 673; II. a. 141, b. 172, 190; III. b. 95; IV. 645; V. 892; VII. 355; VIII. 321, 324, 326. — Fuchsi. IV. 864; V. 893; VII. 339; IX. 257. — Gerardi. X. *V.* 65. — Hecki. VI. 448. — Helli. IV. 376. — hispidus. I. 245. — Holgeri. I. 663, 670; II. a. 141; III. d. 51. — Jacobaeus. V. 219. — imbricatus. II. a. 14, 16. — Islandicus. IX. 602, 606, 616, 620, 648. — laevigatus. IX. 159, 463. — laevis. V. 709. — latecostatus. III. d. 51, 52. — latissimus. I. 349, 667; II. b. 141; VI. 743; VII. 583, 588, 589, 590, 591, 813; IX. 508; X. 175, 186, 187, 195. — liasinus. IV. 738, 742, 744; VII. 335. — Macovii. III. d. 40. — Malvinae. I. 673; V. 219, 756. — Margaritae. VIII. 213. — maximus. I. 663, 665, 668; IV. 709; VIII. 227; IX. 648; X. *V.* 33, 126. — membranaceus. I. 250. — miscellus. I. 245, 250. — multistriatus. VIII. 317; X. 506. — Nilssoni. I. 250; IX. *V.* 73. — nodosiformis. I. 667; III. d. 77; IV. 405. — obsoletus. IX. 626. — opercularis. I. 193, 663, 665; II. b. 190; IV. 183, 645; V. 219; VII. 583; IX. 606, 626, 648. — palmatus. I. 668; II. b. 190. — Partschianus. VII. 340. — pilosus. IX. 139, 140, *V.* 33. — Pleuronectes. IV. 645. — polymorphus. IV. 645; V. 219. — pulvinatus. III. d. 77. — quadricostatus. II. b. 191. — quinquecostatus. I. 245; II. b. 122; VI. 443; IX. *V.* 73; X. *V.* 61, 76. — reconditus. II. b. 190. — sarmentitius. VII. 355, 589. — scabrellus. II. b. 190; IV. 645; VIII. 227. — sinuosus. IX. 605, 649. — Solarium. I. 664, 665, 668; II. a. 141, b. 190, d. 113; IV. 405, 709; VII. 323. — squamifer. IX. *V.* 73. — squamulosus. IV. 189; V. 748. — striatus. I. 668. — subimbricatus. II. a. 14. — suborbicularis. II. a. 14. — subtripartitus. IX. 121. —

textorius. I. 40. — texturatus. IV. 376, 775. — triradiatus. IX. 640. — tumidus. IX. 622. — undulatus. IX. *V.* 73. — Valoniensis. IX. 478; X. *V.* 46. — varians. IX. 382. — varius. I. 663, 668, 673; IV. 645; V. 219; IX. 648. — venustus. II. b. 190. — vestitus. V. 893. — vimineus. I. 635. — sp. I. 238, 664; II. a. 8, b. 123, d. 56, 58, 167; III. d. 48; IV. 329, 361, 407, 707, 721, 726, 753; V. 710, 884; VI. 349; VII. 335, 433, 572, 587, 588, 589, 590, 731, 733; VIII. 285, 304; IX. 152, 267, 291, 385; X. 213, 230, 283, *V.* 67, 105. Pectunculus calvus. II. d. 58. — Cor. IV. 183; VII. 355. — filosus. IX. 605, 626, 646. — Glycimeris. IV. 645. — inflatus. IV. 183, 645. — Insubricus. II. a. 88; IV. 405, 645. — minutus. V. 753, 754. — nummarius. IV. 645. — obtusatus. I. 676; V. 892. — pilosus. IV. 645. — polyodonta. I. 664, 665, 670, 673, 676; II. b. 190, d. 113; III. a. 147; V. 219. — pulvinatus. I. 673, 676; II. b. 174, d. 110, 111, 112; IV. 189, 274, 704; V. 219, 748, VII. 355; X. *V.* 33, 48, 65, 124, 128. — sublaevis. VII. 327; IX. *V.* 73. — umbonatus. IX. *V.* 73. — violacescens. IV. 645. — sp. I. 362; II, a. 6, 14; VII. 587, 589; X. 27, 49, *V.* 126. Peltis costata. VII. 831 Anmerk. Pentacrinites basaltiformis. I. 254. — didactylus. I. 192; IX. 115. — sp. II. c. 3. Pentacrinus annulatus. VI. 310. — cingulatus. V. 690, 696. — didactylus. II. a. 11; VIII. 317. — propinquus. IV. 378; VII. 727. — subteres. IV. 386. — vulgaris. IV. 386. — sp. IV. 95, 349; VI. 248, 249, 349; VIII. 304; IX. *V.* 121. Pentamerus Knighti. VII. 239. — sp. VII. 239. Perna aviculaeformis. IV. 375. — Bouéi. VIII. 787; IX. 140; X. 103. — Lamarcki. IX. 115. — maxillata. I. 666, 668, 669, 670, 673; VI. 443. — sp. II. d. 56. Persoonia sp. I. 558. Petalolithus. III. b. 146. — parallelo-costatus. III. b. 148. Peuce Hoedliana. VI. 289; VII. 533. — Pannonica, VI. 289. — Württembergica. IV. 742. Phacops arachnoides. III. b. 143. — Glockeri. X. 482. — proaevus. X. 482. Phalaenites crenata. VII. 832 Anmerk. — obsoleta. VII. 832 Anmerk. Phaseolites ferrata. IV. 115. — orbicularis. IV. 115. — Physolobium. IV. 115. — Securidacea. IV. 115. Phocaena crassidens. IX. 636. Phoenicites angustifolia. II. d. 160. — salicifolia. II. d. 160. Pholadomya ambigua. I. 40; IV. 742, 743. — decorata. IV. 742, 743. — Esmarki. I. 50. — Hausmanni. IV. 742, 743. — lagenalis. IX. 477, 478. — Murchisoni. II. b. 155. — paucicosta. II. b. 191. — Puschi. I. 665; III. a. 193, b. 91. — sp. VII. 813; IX. 508. Pholas Cornueliana. VI. 311. — crispata. IX. 615, 626, 637. — sp. II. b. 190. Pholidophori (fossile). I. 698. Pholidophorus loricatus. IX. *V.* 40. — parvus. IX. *V.* 40. Pholidopleurus Typus. IX. *V.* 40. Phorus agglutinans. I. 13; IV. 182. — sp. VI. 435. Phoxinus Marsilii. II. b. 185. Phragmites Oeningensis. X. 28. — sp. VI. 887. Phyllitae (tertiäre) im Venetianischen. IV. 113. — Phyllites Pelagicus. I. 161; II. b. 122. — cinnamomeus. VIII. 112 Anmerk. Phyllocoenia grandis. II. a. 161. — Lilli. II. a. 161. — sculpta. II. a. 161. Phyllodus umbonatus. VII. 574, 580, 589, 591. — sp. VII. 583. Physeter macrocephalus. IX. 636. Pileopsis bistriata. I. 672. — Hungarica. V. 210. Pinites Aequimontanus. VI. 289. — Freyeri. VI. 287. — oviformis. VIII. 494; IX. 403. — Partschi. II. d. 41, 43, 45. — Protolarix. V. 198; IX. 699. — rigios. VIII. 482. — Saturni. II. b. 186. Pinna Folium. IV. 735, 738, 742, 744; VII. 355. — Galliennei. X. *V.* 76. — Hartmanni. IV. 374, 775. — ingens. IX. 623. — laevis. IV. 374. — margaritacea. IX. 382. — Neptuni. V. 740. — nobilis. V. 219. — pyramidalis. IX. *V.* 73. — quadrangularis. V. 711; IX. *V.* 73. — subquadrivalvis. I. 672; IX. *V.* 33. — sp. II. b. 123, d. 56; IV. 376, 709; V. 721; VI. 246; VII. 335, 572, 731; IX. 477. Pinus Abies (fossil, untermeerisch). IX. 629. — Cembra (fossil). VII. 731. — exogyra. V. 726. — ornata. IX. 403, 521. — sp. I. 364; II. d. 161; VI. 30; VIII. 473. Piperaceae (fossile). II. a. 154. Pisidium obliquum. IV. 426. Pisonia Brunoniana. I. 558. Pittosporeae (fossile). I. 552, 558; II. b. 188. Placocoenia Orbignyana. II. a. 161. Placodus sp. III. a. 92, 100; IV. 371. Placoparia Zippei. VII. 357, 358, 359. — sp. VI. 611. Placosmilia angusta. II. a. 161. — consobrina. II. a. 161. — cuneiformis. II. a. 161. Plagiostoma giganteum. II. c. 23, 27. — sp. IV. 392. Planera Richardi. II. b. 147; VIII. 746. — Ungeri. II. b. 147, 186, d. 41; III. a. 169; V. 230; VIII. 507, 746; X. 511. Planorbis Ammon. II. d. 118. — applanatus. VII. 544, 545, 546; VIII. 479. — corneus. II. d. 118. — nitidiformis. VII. 544, 546. — pseudo-ammonius. II. d. 122; IV. 435; VII. 544, 545, 546; VIII. 328, 330, 382; X. 25, 495. — Reussi. VIII. 382; X. 25. — subcarinatus. II. d. 122. — sp. I. 600; II. a. 7, c. 3; IV. 329, 426, 427, 434, 435; V. 524; VI. 238, 562; IX. *V.* 149; X. 506. Platanus digitata. IV. 115. — Goepperti. IX. 345. — grandifolia. IV. 115. — Herculis. IV. 115. — jatrophaefolia. IV. 115. — sterculiaefolia. VIII. 494. Platycarcinus Beaumonti. V. 886. Plesiosaurus (Wirbel von). VI. 868. Pleurocora Haueri. II. a. 161. — ramulosa. II. a. 161. — rudis. II. a. 161. Pleuromya unioides. IV. 742; VII. 335 Pleurotoma Agassizi. IV. 641. — asperulata. IV. 188; V. 565, 747, 890, 891; VI. 182; VII. 353; IX. 379, *V.* 8. — Bellardii. IV. 182, 641. — Bonellii. IV. 641. — Borsoni. IX. 379. — bracteata. IV. 641, 706; VI. 181. — brevicauda. II. d. 152. — brevirostris. I. 163; II. d. 105; III. d. 47; IV. 641, 707. — brevis. V. 753. — Brocchii.

IV. 641. — cataphracta. I. 163; II. b. 174, d. 105; IV. 182, 640, 641; VI. 182; VII. 353; X. *V.* 33. — concava. IX. 114, 121. — Confinium. IV. 190. — Coquandi. III. d. 77; IV. 706; VII. 353; IX. *V.* 67. — coronata. V. 753, 754. — crispata. IV. 641; VII. 353. — decussata. IX. 616. — Deshayesi. IX. 121. — dimidiata. I. 673; II. d. 105; IV. 182, 190, 641, 706; IX. *V.* 67; X. *V.* 33. — discrepans. IX. 654. — dubia. III. a. 147; IV. 641, 706, 707. — gracilis. IV. 641. — granulato-cincta. I. 675; II. b. 174, d. 106, 111; VI. 182; VII. 353. — Harpula. IV. 641. — Heckeli. I. 675. — hypothetica. IV. 182. — interrupta. IV. 641. — Jouanneti. I. 672; II. b. 174; IV. 188, 641; V. 210, 747; VII. 571, 574, 575. linearis. IX. 622. *V.* 73. — Monile. IV. 182. — Neugeboreni. X. *V.* 33. — Obeliscus. V. 753; VI. 182; VII. 353; IX. *V.* 67. — obtusangula. IV. 641. — Pannus. I. 672; V. 210. — Payraudeauti. V. 218. — pentagona. IV. 641. — pustulata. I. 672; II. b. 174; IV. 182, 641, 706; V. 210. — ramosa. I. 672, 675; V. 210; VII. 353, 574. — recticosta. I. 675; II. a. 174. — reticulata. IV. 641; IX. 606, 616. — rostrata. III. a. 147; IV. 707. — rotata. I. 163; II. d. 105; IV. 182, 190; III. d. 77; IV. 707; VII. 353; IX. *V.* 67; X. *V.* 33. — rufa. IX. 626, 654. — rugulosa. V. 753. — Schreibersi. I. 675. — semimarginata. VII. 577. — septangularis. IX. 654. — sigmoidea. II. 188; III. d. 77; IV. 641; V. 747. — spinescens. IV. 190; V. 890; IX. *V.* 67. — submarginata. IV. 641. — subterebralis. IX. *V.* 67. — textilis. IV. 641. — tuberculosa. I. 672, 675; II. d. 112. — Turricula. IV. 182, 190, 641; VI. 182; VII. 353; IX. 605, 626, 627, 654. — Vulpecula. IV. 641. — sp. II. a. 5, 6, 174, b. 190; IV. 182; V. 753; VI. 407; VII. 357; IX. 380, 654, *V.* 114; X. *V.* 32. Pleurotomae (fossile) des Wiener Beckens. VI. 181. Pleurotomaria. VI. 249. — Agassizi. IV. 762. — Anglica. IV. 761, 764; X. 259. — Blumi. VII. 84. — Buchi. IV. 762. — disticha. IV. 762. — expansa. IV. 735, 736, 762; X. 259. — helicina. IV. 762. — Hierlacensis. IV. 762. — Münsteri. V. 682. — principalis. IV. 761. — rotellaeformis. IV. 762. — subplicata. VII. 84. — Suessi. IV. 762. — tuberculato-costata. IV. 761. — undosa. IV. 761. — sp. III. a. 185; IV. 329, 726. Plicatula intusstriata. IV. 735, 738; VII. 419, 455, 456, 731; IX. 139, 477, 478; X. 107, 411, *V.* 23, 46. — mytilina. VII. 355. — obliqua. VI. 349. — sp. IV. 336, 376, 383. Plocogyra Edwardsi. I. a. 161. Plumeria Austriaca. IV. 638. — sp. I. 163, 164, 745; IV. 192; V. 525. Podocarpium Knorri. VIII. 502 Anm. Podocarpus eocenica. IX. 403. — spicata. I. 600. Polymorphina complanata. II. a. 163. — digitalis. VI. 351, 352; VII. 588. — dilatata. V. 758. — oblonga. V. 760. Polypodites heracleifolius. IV. 742. — Stiriacus. I. 279. Polystomella aculeata. II. a. 163. — Antonina. IV. 427. — crispa. II. a. 88; IV. 426, 427; V. 748, 749, 751, 755; VI. 351, 352; VII. 588. — Fichteliana. II. a. 163; V. 752, 753. — flexuosa. V. 755. — Listeri. II. a. 163; IV. 427; V. 755. — obtusa. II. a. 163; IV. 426, 427; V. 755. — rugosa. IV. 427. — umbilicata. X. *V.* 37. — Ungeri. II. a. 163. Polytremacis Blainvilleana. II. a. 161, b. 59. — Haueri. II. a. 161. — nummulitica. II. a. 162. — Partschi. II. a. 161. — sparsipora. II. a. 161. Pomaderris sp. I. 558. Pomatoceros tricuspis. IX. 659. Ponera anthracina. VII. 832 Anmerk. — Croatica. VII. 832 Anmerk. — elongatula. VII. 832. — fuliginosa. VII. 832. — livida. VII. 832 Anmerk. — lugubris. VII. 832 Anmerk. — Morio. VII. 832 Anm. — nitida. VII. 832 Anmerk. — Schmidti. VII. 832 Anmerk. — tenuis. VII. 832 Anmerk. Populus crenata. VI. 285. — latior. VIII. 748. — leucophylla. VI. 285, 287, 288, 290, 297. — mutabilis. IX. 403. — serrata. VII. 570. — sp. IV. 175; V. 211; VIII. 502 Anmerk. Porastraea nodulosa. II. a. 162. Porites Collegnianus. I. 673. — Deshayesianus. IX. 115. — interstictus. III. a. 167. — leiophylla. IX. 115. Posidonomya. VII. 852. — aurita. IV. 721; VII. 339; VIII. 157, 213; IX. 267, 461. — Clarai. I. 32, 660; II. a. 145; IV. 471, 721; V. 401; VII. 339, 340; VIII. 157, 167, 213; X. 81, 82, 83, 84, 86, 87, 166. — keuperina. VI. 901. — minuta. I. 645; IX. 159. — Moussoni. VI. 896, 901; IX. 460. — obliqua. IX. 137. — Wengensis. IV. 727. — sp. IV. 864; V. 893; VII. 417; VIII. 216, 217, 420. Potamides sp. X. 314, 316. Potamis. II. c. 50. — sp. II. a. 7. Potamogeton Ungeri. II. d. 40, 43. Poteriocrinus sp. VII. 632. Prenaster Alpinus. IX. 117. Priamus helicoides. IV. 639. Prionastraea dictyophora. II. a. 161. — Hörnesi. II. a. 161. — profunda. II. a. 161. Productus Cora. VII. 632; VIII. 273, 429; X. 206. — fimbriatus. X. 554. — giganteus. VIII. 209. — latissimus. VIII. 209. — punctatus. VII. 632, 668. — semireticulatus. VII. 424. — sp. IV. 407; VII. 812; VIII. 209. Proteaceae (fossile). I. 361, 552, 557, 558, 745; II. a. 155. Protomyia anthracina. VII. 832 Anmerk. — Bucklandi. VII. 832 Anmerk. — jucunda. VII. 832 Anmerk. — latipennis. VII. 832 Anmerk. — longa. VII. 832 Anmerk. — varicolor. VII. 832 Anmerk. — versicolor. VII. 832 Anmerk. Prunus Atlantica. VI. 287, 289. — nanodes. VI. 287, 289. — Paradisiaca. I. 236. — Zeuschneri. I. 236. Psammobia Faröensis. IX. 640. — florida. IX. 622. — Labordei. I. 668, 677; II. d. 113; V. 565, 892. — scopula. IX. 622. — vespertina. I. 672; IX. 622. Psaronius sp. VIII. 180; IX. *V.* 38. Psephoderma Alpinum. X. *V.* 81. Psilophyton. X. *V.* 35. Pterichthys. X. *V.* 19. Pteris pennaeformis. VII. 552.

Pterocarya Haidingeri. II. d, 42, 44. Pterocera sp. I. 154; II. d. 167. Pterodactylus. V. 195; X. V. 54. Pterophyllum Braunianum. IV. 742. — Buchianum. III. c. 141. — cretosum. IV. 168. — Haidingeri. IV. 742. — Jaegeri. VI. 893; IX. V. 18; X. 133. — longifolium. I. 49; III. d. 67; IV. 742. — Münsteri. IV. 742. — nervosum. III. c. 141. — Pecten. IV. 742. — taxinum. III. a. 194. — sp. I. 357; IV. 776; VIII. 218. Pteropoda (silurische). VI. 611; VII. 357, 358. Pterospermum dubium. II. d. 42. Ptychoceras Foetterlei. X. V. 47. — Gigas. X. V. 47. — Puzosianum. VI. 311. Ptychodus sp. II. a. 140; VI. 111. Pugiunculus elegans. VII. 375. — striatulus. VII. 357. — teres. VII. 357, 358. Pullastra aurea. IX. 644. — decussata. IX. 605, 644. — nana. VI. 297 Anmerk. — virginea. IX. 622, 644. Pupa dilucida. VII. 66. — Dolium. VIII. 331. — marginata. II. a. 83 Tab.; IX. V. 153. — pusilla. X. 503, 506. — sp. I. 56; IV. 87, 426, 427; IX. V. 95; X. 231, 569. Purpura fusiformis. I. 671. — haemostoma. I. 675; V. 218. — Lapillus. IX. 605, 606, 617, 626, 655. Purpurae (fossile) des Wiener Beckens. III. d. 138. Pustulopora anomala. II. a. 11. Pycnodus Münsteri. X. 569. Pygorhynchus Cuvieri. II. a. 14. — subcylindricus. II. a. 14. Pyralis Laharpiana. VII. 832 Anmerk. Pyramidella plicosa. II. b. 190; IV. 640; VIII. 377. — terebellata. II. b. 190. Pyrina carinata. IX. 116. Pyrula clara. I. 668. — clathrata. VII. 576. — condita. I. 672; II. d. 115; X. 506. — Geometra. VII. 590. — Lainéi. I. 595, 596. — Melongena. I. 672; II. d. 115; VI. 867. — reticulata. I. 163; II. b. 190; IV. 182; VII. 576. — Rusticula. I. 362, 665, 668, 672; II. d. 112; V. 210; VII. 353; X. V. 33. — sp. IV. 355; X. V. 77. Pyrulae (fossile) des Wiener Beckens. IV. 854, 855. Pyrulina Gutta. V. 748, 760. Pyrus euphemes. IV. 115. — minor. IV. 115. — Theobroma. IV. 115.

Quercus apocynophylla. VIII. 494. — Austriaca. VII. 693. — cuspidata. IV. 115. — Cyri. II. b. 186. — deuterogona. VI. 287. — Drymeja. III. d. 135; IV. 478.; IX. V. 19; X. 215. — furcinervis. I. 235, 396; III. a. 115; VIII. 494; IX. 345. — Glans. I. 393. — Goepperti. III. d. 144. — grandidentata. I. 235. — Haidingeri. II. d. 41. — Lignitum. I. 235; III. d. 135; IV. 115; VI. 435, 441; IX. V. 19. — limnophila. I. 393. — Lonchitis. II. b. 186; X. 212, 215. — mediterranea. I. 396; IX. 345. — myrtilloides. VIII. 502 Anmerk. — neriifolia. VIII. 745. — Palaeococcus. IV. a. 115. — Pseudo-castanea. VI. 287. — ulmifolia. VII. 335. — undulata. VIII. 745. — uryphylla. II. b. 186. — Zoroastri. III. d. 135. — sp. II. b. 178, 188; VIII. 473; IX. 345. Quinqueloculina Ackneriana. IV. 427. — Haueriana. II. a. 88; IV. 426, 427. — Mayeriana. IV. 427. — tenuis. V. 754. — sp. II. a. 164; V. 752, 754; VIII. 227.

Radiolites acutecostatus. II. d. 59. — acuticosta. IX. 354. — alatus. IX. 349, 350. — angulosus. IX. V. 71. — fissicosta. IX. 350. — hexagonus. VI. 899. — mammillaris. II. d. 59; IX. 354. — Marticensis. IX. 347. — Neocomiensis. VII. 380. — Pausianus. I. 190. — Sauvagesi. IX. 354. — socialis. IX. V. 71. — sp. IX. 348; X. V. 10. — (Organisation der Gattung). V. 205. Ranella. II. c. 50. — gigantea. IV. 642. — granulata. I. 672. — laevigata. IV. 642. — marginata. I. 672; III. a. 182; IV. 642; VII. 353. — reticularis. IV. 182, 642. Ranellae (fossile) des Wiener Beckens. IV. 851, 852. Ranina Aldrovandi. V. 886; IX. 117. Raphitoma. VI. 181. Receptaculites Oceani. X. 554. Redonia. VII. 162. — Bohemica. VII. 357, 359. Restiaceae (fossile). II. b. 157. Retepora cellulosa. VI. 352. — sp. VII. 607. — Rubeschi. VI. 353. Retiolites. III. b. 142. — Geinitzianus. III. b. 144, 145, 146, 153. — grandis. III. b. 145. Retzia radialis. VII. 424. — trigonella. X. 82, 83, 85, 86, 101, 124. Rhamnus Aïzoon. IX. V. 19. — Augustinii. II. d. 42. — Bilinica. II. b. 186. — Eridani. II. b. 186; VI. 287. — sp. II. b. 188. Ramphorhynchus. X. V. 55. Rhinoceros Filippii. VI. 200. — incisivus. II. d. 154; VI. 200; VII. 221; VIII. 284. — leptorhinus. VI. 200. — minutus. VI. 200; X. V. 19. — Schleiermacheri. I. 166. — tichorhinus. I. 56, 667, 670; II. a. 76, 136, d. 154; III. a. 166; IV. 37; V. 227, 527; VI. 198, 200, 322, 561, 908; VII. 548; IX. V. 113, 120; X. V. 178. — (Fossile Arten von) aus Italien. VI. 200. Rhipidia affinis. VII. 832 Anmerk. — extincta. VII. 832 Anmerk. — picta. VII. 832 Anmerk. Rhizangia Michelini. II. a. 162. Rhizocorallium Jenense. IX. 158. Rhizodus sp. II. a. 143. Rhizophoreae (fossile). I. 552; II. b. 188. Rhus prisca. IV. 404. — Herthae. IX. 345. — sp. V. 211. Rhyncholites acutus. III. a. 141. Rhynchonella acuta. III. a. 185. — Agassizi. III. c. 138. — amphitoma. IV. 733; V. 598. — Austriaca. III. d. 93; IV. 742, 744. — Clementina. III. c. 138. — concinna. IV. 738. — cornigera. III. d. 93, 94; IV. 731, 735; X. V. 46. — decipiens. III. c. 138. — decurtata. VII. 417; IX. 336; X. 95. — depressa. VI. 310. — fissicosta. IV. 731, 735, 739; VII. 37, 731. — Guerini. III. c. 138. — Hausmanni. III. a. 186; IV. 765. — Hörnesi. VII. 38; IX. 342. — inconstans. II. d. 167; IV. 54. — lacunosa. II. d. 167; IV. 54; V. 690, 695, 697. — lata. III. d. 129; VI. 311. — latissima. X. V. 77. — multiformis. VI. 310. — Mutoniana. III. a. 138. — nuciformis. III. d. 129. — obtusifrons. VII. 380. — octoplicata. IX. V. 73; X. V. 61. — pedata. VII. 733. — pentatoma. VII. 633. — peregrina. III. c. 141; VI. 311.

— pleurodon. VII. 340. — plicatilis. X. *V.* 77. — rigida. IX. 342. — senticosa. IV. 765, 769; X. *V.* 68. — serrata. IV. 753; IX. 342. — sparsi-costa. X. 415. — spinosa. X. 413. — spoliata. X. 415. — Sturi. IV. 753. — subfurcillata. III. a. 186. — subrimosa. IV. 731, 735, 739; VII. 731, 732. — Tatrica. X. 415. — trigona. IV. 768, 769; X. 413, 414. — trilobata. V. 690, 695, 697. — variabilis. IX. 353. — sp. III. a. 186; IV. 329; VIII. 304, 317; IX. *V.* 116, 121; X. 259. Rhypus maculatus. VII. 832 Anmerk. Rhyssa antiqua. VII. 831. Rhytoides. V. 206. Ribeiria pholadiformis. VII. 162, 357, 358. Riesenhirsch. IV. 861; VI. 198, 318, 416; VII. 161; VIII. 778, 779. Rimula Austriaca. IV. 753, 763. Ringicula buccinea. I. 238; IV. 182, 639, 706; V. 751. Rissoa Acinus. IV. 639. — cochlearella. VII. 588, 591. — Montagui. VII. 354. — pusilla. IV. 639. — semicostata. IX. 651. — subumbilicata. IX. 651. — sp. X. 281, 314, 317. Rissoae (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 379. Rissoïna decussata. VII. 354. — pusilla. VII. 354. Rissoïnae (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 380. Robinia Hesperidum. IV. 115. Robulina Austriaca. V. 749, 758, 759. — Calcar. V. 748, 749, 750, 752, 753, 758, 759, 761, 762. — clypeiformis. V. 758; VI. 354. — Comptoni. I. 244. — crassa. VI. 354. — cultrata. V. 758, 759, 762; VI. 354. — deformis V. 753. — depauperata. V. 759. — dimorpha. V. 759. — echinata. V. 753, 758. — flexi-septa. V. 749. — galeata. V. 749. — imperatoria. V. 753, 758, 759. — incompta. V. 759, 761, 762. — inornata. V. 748, 749, 750, 752, 753, 758, 759, 762; VI. 251. — intermedia. V. 748, 750, 759, 761. — neglecta. V. 753, 758, 759, 761. — obtusa. V. 753, 758, 759. — polyphragma. V. 748, 749, 750, 758, 759. — radiata. V. 758. — similis. V. 748, 749, 750, 758, 759. — simplex. V. 748, 749, 750, 758, 762. — spectabilis. V. 758. — striolata. V. 758. — trigonostoma. V. 758. — umbonata. V. 749, 750, 761. — sp. V. 750, 752, 753, 761. Rogas Radobojanus. VII. 831 Anmerk. Rosalina complanata. V. 748. — granifera. V. 748. — granosa. IV. 426. — obtusa. V. 754. — pusilla. V. 754, 762. — simplex. II. a. 161; IV. 426; V. 754. — Viennensis. IV. 427; V. 748, 755; VI. 352. Rostellaria bicarinata. V. 682. — columbaria. IX. 121. — costata. I. 162; X. *V.* 76. — fissurella. III. a. 193. — macroptera. VIII. 223. — papilionacea. III. c. 143. — Pes pelecani. I. 671, 675; II. b. 173, d. 105; III. a. 147, d. 77; IV. 707, 709; V. 890. — Vespertilio. II. b. 190. — sp. II. d. 56, 58; III. a. 193; IV. 329. Rostellariae (fossile) des Wiener Beckens. IV. 165, 166. Rotalia Ackneriana. V. 755; VI. 351, 352; VII. 588. — Brongniarti. V. 753, 758, 762. — carinella. V. 758, 762. — cryptomphala. V. 748, 751, 752, 754, 758, 759, 761. — Dutemplei. V. 748, 749, 750, 751, 754, 758, 759, 761, 762; VI. 351, 353; VII. 580. — Haidingeri. V. 748, 749, 752, 758, 759, 761. — Haueri. V. 748, 750, 751, 753, 755, 758, 759, 761. — Heinrichi. V. 758. — impressa. V. 750, 754, 758, 759, 761. — Kalembergensis. V. 750, 754. — nana. V. 759, 762. — Partschiana. V. 748, 749, 750, 752, 754, 755, 758, 759, 762. — scaphoidea. V. 758. — Schreibersi. V. 758, 759. — semitecta. V. 759. — Soldanii. V. 750, 752, 755, 758, 762. — Ungeriana. V. 748, 749, 751, 754, 759. Rotalina Ackneriana. II. a. 163. — Dutemplei. II. a. 163. — Soldanii. II. a. 88. — sp. X. 512. Rudisten. VII. 221, 236, 335. Ruppia brevifolia. II. d. 44, 45. — Pannonica. IV. 115.

Sagenaria Veltheimiana. VIII. 346, 351. — sp. VIII. 335. Salamandra Ogygia. X. *V.* 52. — sp. X. *V.* 51. Salicineae (fossile). III. d. 128, 144. Salix augustata. IX. 521. — acinervia. VIII. 494. — trachytica. III. c. 157; V. 230. — varia. IX. 403, *V.* 35. — varians. VIII. 747. Sanguinolaria Hallowaysi. VIII. 223. — sp. VI. 297. Santalum sp. III. a. 171. Sapindaceae (fossile). I. 552, 745; II. b. 188. Sapindus dubius. VI. 287. Sapotaceae (fossile). I. 552; II. a. 154. Sapotacites Daphnes. VIII. 494. Sargassites Sternbergi. IX. 403. Saurii des Kalkes im Randgebirg des Wiener Beckens. X. 260. Saxicava rugosa. VI. 297; IX. 602, 605, 607, 615, 626, 627, 640. — sulcata. IX. 602, 606, 640. — sp. I. 668. Saxifrageae (fossile). I. 557; II. b. 159. Scalaria borealis. IX. 651. — cancellata. IV. 190, 640. — clathra. IV. 640. — communis. IV. 640. — corrugata. IV. 182. — crispa. I. 672. — Groenlandica. IX. 627, 651. — muricata. IV. 182, 640. — pseudo-scalaris. V. 219. — pumicea. V. 219. — torulosa. IV. 640. — sp. II. b. 190. Scalariae (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 375, 376. Scaphites aequalis. IX. *V.* 73. — constrictus. I. 46. — Joani. I. 50; III. a. 241; VI. 311. — trinodosus. IX. 175, *V.* 54. — sp. IV. 391; IX. *V.* 75. Scarites Haidingeri. VII. 831 Anmerk. Schizaster canaliferus. IX. 384. — sp. VI. 354. Schizodus cloacinus. IX. 476. Schizostoma. IV. 329. Sciara minutula. VII. 832 Anmerk. Scissurella crispata. IX. 622. Sclerotium pustuliferum. VIII. 741. Scorpionidae (fossile). VII. 2. Scrobicularia piperata. IX. 639. Scutella Faujasi. V. 892. — subrotunda. I. 593. — sp. IV. 707; V. 884. Scutum Bellardii. VIII. 384. Scyphia cellulosa. II. b. 190. — cariosa. II. b. 190. — Decheni. I. 247, 250. — glomerata. VII. 20. — Murchisoni. I. 247. — Oeynhauseni. I. 248. Semieschara geminipora. VI. 353. Semionotus sp. II. d. 166. Sepia sp. VII. 844. Sequoya Langsdorfi. VIII. 738, 743. Seriaca sp. X. 554. Serpula arenaria. IV. 709. — Canaletti. IV. 645. — corrugata. VII. 588. —

filiformis. V. 709, 712. — gordialis. VI. 249. — lumbricalis. IV. 189; V. 748. — mediterranea. II. c. 49. — nummularia. II. a. 10; IV. 548. — proteusa. IV. 645. — spirulea. II. a. 13, 17; IX. 115, 121. — uniplicata. VI. 310. — vermicularis. IX. 659. — sp. II. c. 3; III. a. 143, d. 51, 77; IV. 426, 753; V. 697. Sigaretus canaliculatus. II. b. 190; VIII. 378. — haliotoideus. I. 668, 672; VII. 354; VIII. 378; IX. 616. — sp. VII. 572. Sigillaria intermedia. VIII. 166, 603. — oculata. VIII. 166, 603. — Pes capreoli. VIII. 166, 603. — tesselata. VIII. 603. — sp. III. d. 119; IV. 407; VII. 265; VIII. 346. Siliquaria anguina. VIII. 376. — sp. II. a. 13. Sephonia pertusa. VI. 249. — pyriformis. VI. 249. Siphonina fimbriata. V. 754, 758, 759, 761. Skenea serpuloides. IX. 616, 617. Smilacites grandifolia. IV. 115. — hastata. IV. 115. Solaria (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 374. Solarium canaliculatum. IV. 640. — millegranum. IV. 640. — moniliferum. IV. 640. — perspectivum. IV. 707. — plicatum. VI. 187. — pseudoperspectivum. IV. 640. — simplex. I. 672. — subvariegatum. IV. 640. — variegatum. III. d. 77; IV. 640, 703. — sp. II. a. 13; V. 682. Solecurtus sp. VII. 572. Solen caudatus. IX. 139, 350, 360. — coarctatus. IV. 644. — Ensis. IX. 605, 615, 637. — Siliqua. IX. 606, 626, 637. — strigilatus. I. 665; IV. 709. — Vagina. I. 668. — sp. I. 245, 668; IV. 190; VII. 575. Spatangus Cor-anguinum. VI. 249. — Hoffmanni. I. 193; II. a. 5. — retusus. I. 46; II. d. 162; VII. 5. — suborbicularis. II. a. 14. — sp. II. a. 7; III. b. 91; IV. 190, 391, 548. Sphaerococcites sp. IX. *V.* 77. Sphaerodus cingulatus. VII. 587. — pygmaeus. II. b. 83 Tabelle; VI. 302. — sp. II. b. 190; III. d. 46, 77; VIII. 301. Sphaeroidina Austriaca. V. 748, 754, 758, 760, 761, 762, 763; VI. 354. Sphaerulites da Rio. I. 190. — duplo-vulvata. I. 190. — Gazola. I. 190. — umbellatus. I. 190. Sphenia Swainsoni. IX. 638. Sphenodus sp. IV. 97, 387, 388. Sphenophyllum angustifolium. II. b. 172; III. b. 170. — Schlotheimi. II. d. 143. — sp. IV. 435; V. 366; VI. 837; VII. 265. Sphenopteris Collombi. II. a. 145. — distans. VIII. 351. — Goepperti. II. d. 143. — Hartlebeni. II. d. 143. — Hoeninghausi. VIII. 342, 350. — lanceolata. VIII. 342, 350. — longifolia. II. b. 156, d. 143. — microloba. VIII. 342, 350. — Nilssoni. II. a. 145. — patentissima. IV. 742. — Roemeri. II. b. 156, d. 143. — tenera. II. d. 143. — trifoliata. III. d. 129. — sp. III. d. 119, 129; IV. 435; VI. 102; VII. 265. Sphyrna lata. VI. 302. Spirifer bisulcatus. VII. 340. — Emmrichi. IV. 731, 735. — Fischerianus. VII. 340. — fragilis. VIII. 796; X. 82. — glaber. III. a. 181; VII. 340. — Haueri. III. d. 93; IV. 742. — heteroclitus. III. a. 168. — Mentzeli. VIII. 796. — mesolobus. III. a. 181. — Münsteri. III. d. 92, 93; IV. 731, 735, 738, 742, 746, 753; V. 126; VI. 448; VII. 26, 731; X. *V.* 22, 46. — octo-plicatus. II. c. 25. — pyramidalis. IV. 738. — rostratus. II. c. 26; III. a. 181, d. 92, 93; IV. 85, 377, 731, 735, 742, 746, 753. — striatissimus. VII. 340. — togatus. X. 482. — tumidus. I. 162, 634. — uncinatus. IV. 85, 95, 377, 738; VII. 37. — Walcotti. I. 40; II. b. 155; III. a. 181; IV. 377. — Zieteni. III. a. 181. — sp. IV. 383, 407; VI. 349; VII. 812; VIII. 367, 780. Spiriferina gregaria. VII. 338; VIII. 441. — Mentzeli. X. 82, 85, 94. — Münsteri. VII. 379. — pyramidalis. IX. 342. — rostrata. IX. 342. — sp. IX. 353. Spirigera oxycolpos. IV. 377, 735, 738; V. 126; VII. 731. Spirigerina reticularis. X. 482. Spirolina Austriaca. IV. 427. Spiroloculina tenuissima. V. 758. — sp. V. 761. Spiropora pulchella. VI. 353. Spirorbis corrugatus. IX. 659. Spirula Peroni. IX. 617. Spondylus asperulus. II. a. 14. — comptus. X. 82. — crassicosta. I. 667, 673, 677; IV. 645; VII. 583, 588, 591; X. *V.* 32, 33. — Gaederopus var. IV. 645. — lineatus. I. 245, 250; IX. *V.* 73. — obliquus. IV. 777; VII. 727. — radiatus. I. 250. — Radula. IX. 115. — rarispina. VIII. 223. — spinosus. IX. *V.* 73. — striatus. VII. 327; X. *V.* 77. — velatus. V. 682. — sp. IV. 336; V. 750; X. 32, 502. Spongites Saxonicus. VIII. 157. — sp. VI. 248. Squalidae (Zähne von). I. 666, 667, 669; II. a. 13, 149; IV. 361; IX. 113, 115, 120, 380, 480. Squalodon Grateloupi. I. 163. — sp. I. 629. Squalus Cornubicus. II. a. 6. Steinhauera oblonga. IX. 403. Stenochelus triasicus. IX. *V.* 75. Stephanocoenia elegans. II. a. 162. — formosa. II. a. 161. Sterculia Labrusca. II. b. 186. — Vindobonensis. II. d. 42, 44. Stigmaria ficoides. VII. 265; VIII. 167, 731. — sp. III. d. 119; IV. 435; VI. 407. Stringocephalus Burtini. VII. 239. Stromatopora sp. IV. 59. Strombi (fossile) des Wiener Beckens. IV. 165, 166. Strombus Bonelli. I. 671; II. b. 173; IV. 166; VIII. 364. — coronatus. IV. 166. — Fortisi. IV. 404. — latissimus. I. 591. Strophomena sp. VII. 240. Stylocoenia lobato-rotundata. II. a. 162, 163. — Taurinensis. II. a. 162, 163. Stylophora rugosa. II. a. 162, 163. Styraceae (fossile). I. 361, 735, 745; III. d. 128. Styrax pristinum. II. d. 41. Succinea oblonga. II. b. 83 Tabelle, 189; VII. 65; IX. *V.* 153; X. 463, 569. — sp. I. 56; III. d. 18; VII. 332; VIII. 331; IX. *V.* 95; X. 231. Sus Palaeochoerus. I. 166; II. d. 122. — priscus. I. 194. Symphyllia hypocrateriformis. II. a. 162. Synastraea Agaricites. II. a. 162. — Cistula. II. a. 162. — composita. II. a. 162. — exigua. II. a. 162. — media. II. a. 162. — multi-radiata. II. a. 162. — sp. IV. 378. Synhelia gibbosa. II. a. 161.

Syringodendron sp. VII. 265. Syrphus Freyeri. VII. 832 Anmerk. — fusiformis. VII. 832 Anmerk. — geminatus. VII. 832 Anmerk. — Haidingeri. VII. 832 Anmerk. — infumatus. VII. 832 Anmerk. — Morloti. VII. 832 Anmerk.

Tabernaemontana sp. IV. 192. Taeniopteris asplenioides. IV. 742; VIII. 218. — Bertrandi. IV. 118. — Haidingeri. IV. 742. — marantacea. III. a. 194. — Phillipsi. IV. 742. — vittata. I. 356; IV. 742. — sp. I. 357; VI. 235; VIII. 218. Tapes gregaria. X. *V.* 175. Taxites Langsdorfi. I. 235; II. d. 48, 49. Taxodites dubius. VIII. 473; IX. *V.* 149. — Oeningensis. I. 600; II. b. 186. Taxodium dubium. VIII. 742. Telephorus tertiarius. VII. 851 Anm. Tellina Baltica. IX. 641. — calcarea. IX. 606, 607, 626, 641. — complanata. I. 665; II. d. 115; III. a. 223; IV. 275, 644; V. 219; VII. 354; X. *V.* 104. — crassa. IX. 626, 641. — depressa. IX. 605. — donacina. IX. 622. — Fabula. IX. 601, 626, 641. — Groenlandica. IX. 606, 615, 641. — lacunosa. X. *V.* 65. — obtusa. I. 672. — planata. IV. 644. — Royana. II. a. 25. — semi-costata. II. b. 191. — serrata. I. 672; IV. 644. IX. 383. — solidula. IX. 601, 605, 626, 627. — subalpina. IV. 373, 775. — subdecussata. II. b. 191. — tenuis. IX. 641. — tumida. I. 597, 668; II. d. 113. — zonaria. I. 668, 672, 676; II. d. 113. — sp. II. a. 5; IV. 190; VI. 435; VII. 569. Terebellum conoideum. VII. 814. — convolutum. VIII. 185, 315, 329. — sp. II. a. 13. Terebra acuminata. III. d. 77; V. 891; IX. 383, *V.* 9. — Basteroti. IV. 182, 643. — cinerea. I. 671; IV. 643. — duplicaria. II. b. 174. — fuscata. I. 675; II. b. 174, d. 115; III. a. 222, d. 136; IV. 182, 643; V. 210, 890, 891. — fusiformis. VI. 407, 413. — nodulosa. IV. 643. — pertusa. I. 671; IV. 190, 643. — plicaria. II. b. 174; IV. 643. — plicatula. IV. 182. — sp. IV. 704. Terebrae (fossile) des Wiener Beckens. III. d. 136. Terebratella loricata. V. 690, 695, 697. — pectunculoides. II. d. 168; V. 690, 695, 697. — trigonella. V. 697. Terebratula. II. d. 156, 160. — Agassizi. X. *V.* 69. — alata. VI. 249; VII. 327; IX. *V.* 73. — amphitoma. IV. 733. — Ampulla. I. 663; II. a. 163. — angusta. II. c. 29; IX. *V.* 16. — antinomia. VIII. 302. — antiplecta. I. 40, 162, 643; IV. 93, 769; VII. 38. — Aquensis. II. a. 14. — Ascia. VI. 900; VII. 30, 33, 38, 733. — auriculata. III. c. 138, 141. — bicanaliculata. V. 690, 695. — Bieskidensis. X. 415. — Billimeki. X. 415. — biplicata. II. b. 191; III. c. 137; IV. 92, 95, 377, 696. — bisuffarcinata. X. 411. — Bouéi. I. 41; III. a. 185; IV. 753, 765; X. 411, 414, *V.* 68, 69. — bullata. I. 187. — Caput serpentis. II. a. 14; IX. 600, 616, 623, 626, 637. — carnea. I. 244, 250, 251, 252; II. a. 13, 19; III. c. 138. — Carteroniana. III. d. 129. — coarctata. II. d. 168; IV. 55. — Columbella. IX. 342. — concentrica. I. 165; II. b. 155; IV. 738. — concinna. I. 40, 162, 254, 643; II. b. 191; IV. 93. — cornuta. IV. 731, 735, 738, 742; VI. 37, 730, 731; X. *V.* 46. — decorata. I. 40, 635; II. a. 155; IV. 744. — Defranci. II. a. 14, 19. — diphya. I. 168, 188; IV. 769; VII. 836; VIII. 301; IX. 343, 481, 487, *V.* 97, 130; X. 411, 415, *V.* 68, 69. — diphyoides. III. c. 137. — dorso-plicata. X. 413. — elongata. II. c. 3, 4. — Gallina. II. c. 3, 4. — globata. VII. 19. — gracilis. III. c. 138. — Grafiana. III. c. 137, 138. — grandis. II. b. 190; III. d. 51; IX. 151; X. *V.* 124, 129. — gregaria. IV. 731, 735; VI. 348; VII. 379; VIII. 146; IX. 410, *V.* 22, 46. — Grestenensis. IV. 742; VII. 836. — Grossulus. IV. 742. — Heyseana. IV. 746. — Hippopus. III. c. 137. — Horia. IV. 735. — Hungarica. X. 413, 414. — impressa. III. a. 185; V. 696. — inconstans. III. c. 138. — indentata. II. c. 23; IV. 735. — integra. VIII. 304, 306. — intermedia. II. c. 23, 25, 27. — lacunosa. III. c. 137. — lagenalis. II. c. 23, 25, 27. — lata. VII. 5. — Lens. II. a. 13. — longirostris. III. c. 138. — Lycetti. VII. 380. — Mentzeli. IX. 468. — Muriana. III. c. 138. — nucleata. III. a. 185; X. 415. — numismalis. II. c. 23; III. a. 185. — obesa. III. c. 138. — octo-plicata. IX. *V.* 81. — orbicularis. II. c. 23, 25, 29. — ornata. I. 244. — ornithocephala. I. 187; II. c. 23, 25, 27. — ovoidea. III. d. 93. — Pala. I. 40; IV. 769; VI. 900; VII. 30, 33, 38. — Partschi. III. d. 92; IV. 753. — pectunculoides. IV. 55; V. 690, 695, 697. — Pectunculus. II. c. 3, 4. — pedata. II. c. 23, 25, 27. — per-ovalis. II. c. 3, 23, 25, 26; IV. 55. — Pisum. I. 244. — plicatilis. I. 250. — praelonga. VII. 20. — psittacea. IX. 606, 616, 637. — Pugnus. III. a. 168. — punctata. VII. 380. — pusilla. VII. 589, 590. — pyriformis. IV. 731, 735; VII. 731, 732, 836. — quadrifida. II. c. 23. — Ramsaueri. VII. 338. — Rehmanni. II. c. 24, 25. — rimosa. II. c. 21, 24, 26, 27, 29. — rostriformis. III. c. 138. — Royssii. III. a. 181; IV. 738. — Sella. III. d. 129; VI. 249. — semiglobosa. III. c. 138. — Simonyi. III. a. 185, d. 92; IV. 753, 765. — striatula. II. a. 14. — subalpina. IX. 355; X. 283, 286. — subdecussata. II. c. 25. — subglobosa. IX. *V.* 73. — subrimosa. VII. 30. — subserrata. II. c. 25. — substriata. I. 254; IV. 55. — Tamarindus. VII. 5. — tetraëdra. II. c. 25; IV. 744. — Triangulus. I. 188; VIII. 301. — trigonella. VII. 447; VIII. 796; IX. 159, 267, 465, *V.* 16. — triloba. IV. 74. — tubifera. IX. 351. — tumida. III. a. 181. — variabilis. II. c. 29. — vicinalis. II. c. 23, 25; IV. 738. — vulgaris. I. 37; IV. 780; VI. 893; VII. 443, 445, 450, 724, 727; IX. 159, 464, 465, *V.* 16. — Waterhousei. IV. 731. — Zieteni. III. a. 185. — sp. II. c. 27, 28, d. 109; IV. 91, 329, 391, 407, 782; V. 690; VII. 243, 589, 812; VIII. 301, 303, 317, 441; IX. 116, 141, 268, 274, 291, *V.* 95. Terebratulina auriculata. VI. 311. — substriata. II. d. 168. Teredina sp. X. 37. Teredo navalis.

IX. 615, 617. — Tournali. IX. 121. — Termes (fossile). I. 365. — Croaticus. VII. 831 Anm. — giganteus. VII. 831. — Hageni. VII. 811. — Hartungi. VII. 831. — obscurus. VII. 831 Anm. — pristinus. VII. 831 Anm. — procerus. VII. 831 Anm. — venosus. VII. 831. — vetustus. VII. 831 Anm. Terminalia sp. V. 211. Ternstroemiaceae (fossile). II. a. 155. Testudo Europaea im Diluvium. VIII. 333. Tetrachela. IX. V. 75. Tetralophodon. IX. V. 88. — Arvernensis. X. V. 19. Tettigonia antiqua. VII. 832 Anm. — debilis. VII. 832 Anm. — Morio. VII. 832 Anm. Textularia articulata. VI. 354. — carinata. V. 748, 749, 750, 751, 755, 758, 760, 761. — Nussdorfensis. VI. 353. — pectinata. V. 752. — Poppelacki. V. 749. Thalassites concinna. I. 40. Thamnastraea mammillosa. II. a. 162. Thecidea sp. VI. 249. Thecla discors. VI. 611. — elegans. VI. 611. — striatula. VI. 611. Thecophyllia brevissima. II. a. 161. — sp. IV. 329. Thecosmilia deformis. II. a. 161. Thetis undulata. II. b. 191. Thinnfeldia. V. 886. — sp. VI. 235. Thoracopterus Niederristi. IX. V. 40. Thracia declivis. IX. 639. — phaseolina. VI. 438. — pubescens. IX. 621. — sp. VI. 437. Thuites Heheneggeri. III. c. 141. Thuyoxylon ambiguum. VI. 289. — juniperinum. VI. 289. — sp. X. V. 50. Tipula lineata. VII. 832 Anmerk. — maculipennis. VII. 832 Anmerk. — obtecta. VII. 832 Anmerk. — varia. VII. 832 Anmerk. Tornatella fasciata. IV. 640. — gigantea. I. 162, 663; II. b. 123; VII. 607. — pyramidata. IX. 656. — semi-striata. I. 672. — tornatilis. IV. 640; IX. 622. — voluta. I. 162. — sp. II. b. 190; VII. 421. Toxaster oblongus. VII. 20. Trematosaurus Brauni. III. b. 159. Trichopteris borealis. IX. 600, 617, 623, 655. Trigonella sp. X. 94. Trigonia caudata. VI. 311. — Kefersteini. VI. 893, 894 Anmerk. — laevigata. VI. 896. — Whatleyae. I. 260; VI. 893. — sp. VI. 349; VIII. 216. Trigonotreta lamellosa. II. d. 160. Trilobiten (devonische). VIII. 367. — (silurische). VII. 356, 357, 358. Triloculina Austriaca. II. a. 88. — consobrina. IV. 426, 427. — inflata. IV. 427. — sp. II. a. 6. Trilophodon. IX. V. 88. Trinucleus Goldfussi. X. 482. — Pragensis. X. 482. — Reussi. VII. 357. Trionyx Austriacus. X. V. 46. — Partschi. IV. 178. — Stiriacus. X. V. 46. — Vindobonensis. X. V. 46. — sp. IV. 178; VI. 184, 185. Triton (Batrachier) basalticus. X. 497, V. 51. — — Noachicus. X. V. 52. — — opalinus. X. V. 51. Triton (Gasteropod) affine. IV. 642. — — Apenninicum. IV. 642. — — distortum. IV. 642. — — intermedium. IV. 642. — — succinctum. IV. 642. Tritones (fossile) des Wiener Beckens. IV. 166. Tritonium affine. VII. 353. — Apenninicum. IV. 182; V. 210. — corrugatum. I. 671; IV. 182, 704, 707; V. 210. — nodiferum. V. 218. Trochi (fossile) des Wiener Beckens. VII. 190, 191. Trochitae im Muschelkalk. IX. 159. Trochocyathus lamelli-costatus. II. a. 160. — Sismondae. IX. V. 67. Trochoseris lobata. II. a. 162. Trochosmilia Basochesi. II. a. 161. — Boissyana. II. a. 161. — complanata. II. a. 161. — dilatata. II. a. 161. — elongata. II. a. 161. — inflexa. II. a. 161. — varians. II. a. 161. — sp. II. d. 59. Trochotoma Haueri. IV. 753, 763. — Rathieriana. IV. 763. — striata. IV. 753. Trochus aciculus. IV. 753, 759. — agglutinans. IV. 640: VII. 588. — Basteroti. I. 250, 675; III. a. 223. — Bennettiae. I. 594, 596. — Boscianus I. 590. — Bouéi. II. d. 116. — carinifer. IV. 753, 759. — cinerarius. IX. 658. — coniformis. II. d. 116; III. a. 223; V. 565; VI. 291. — Conulus. IX. 622. — crispus. IV. 640. — cumulans. I. 665, 672; III. d. 77. — Deslongchampsi. IV. 753, 758. — Epulus. IV. 753, 758. — exasperatus IX. 658. — Infundibulum. IV. 640. — Labarum. I. 590. — labiosus. I. 672. — late-umbilicatus. IV. 753, 759. — Magus. I. 672; V. 210. — Millegranum. V. 218. — monilifer. I. 665. — Montacuti. IX. 622. — obliquatus. IV. 640. — Orbignyanus. X. 568. — patulus. I. 668, 672, 675, 676; II. a. 88, b. 173, 190, d. 111; III. a. 223; IV. 640, 707; V. 891; VII. 354, 580, 581; VIII. 326; X. V. 49, 65, 124, 126. — Podolicus. VI. 291, 301; VII. 354. — Poppelacki. II. d. 116; VII. 354. — quadristriatus. X. 568. — Simonyi. IV. 753, 759. — tumidus. IX. 658. — turritus. IX. 605. — zizyphinus. IX. 657. — sp. II. a. 13, c. 21, 26, d. 57; III. a. 143; IV. 329, 427; V. 756; VI. 290; VII. 698; IX. 479; X. 568. Trogus fusiformis. VII. 832 Anmerk. Truncatulina arcuata. V. 754. — Bouéana. V. 752, 755, 758, 760, 761; VI. 352. — lingulata. VI. 352. — lobatula. V. 752, 754, 755; VI. 352. — Moravica. V. 758. Tubulipora verrucaria. IX. 659. Turbinella. II. c. 50. — Dujardini. VI. 179. — Hordeola. IV. 641. — Labellum. VI. 179. — suberaticulata. VI. 179. Turbinellae (fossile) des Wiener Beckens. VI. 179. Turbines (fossile) des Wiener Beckens. VII. 190. Turbinolia bilobata. IV. 548. — centralis. I. 244, 248, 250. — complanata. IV. 548. — duodecim-costata. III. a. 143, d. 77; IV. 704. — sp. II. a. 6; IV. 335; IX. 115. Turbo Cassianus. VIII. 179. — depressus. IX. 141. — erythrinus. IV. 640. — Parkinsoni. I. 590. — Pugilator. IX. 137, 141. — recte-costatus. IV. 721; VIII. 213; IX. 267, 336, 337, 340; X. 82, 83, 87. — rugosus. III. a. 223; V. 218; VII. 354. — Stabilei. IX. 137. — sp. II. a. 6, 13; IV. 372, 707, 782; VI. 290, 435; VII. 589. Turbonillae des Oolith-Kalkes. VIII. 303. — des Wiener Beckens. VIII. 377. Turrilites

Cochii. V. 229. — Scheuchzerianus. I. 252. Turritella acutangula. II. a. 141; III. a. 147; IV. 275, 640, 707; V. 210. — acutangularis. III. d. 77; IV. 182, 704. — acuticosta. VII. 84. — angulata. IX. 354, 359. — Archimedis. I. 672, 675; II. b. 173, 190, d. 106, 110, 111; III. a. 223; IV. 188, 640; V. 210, 747; VII. 354; X. *V.* 33. — armata. VIII. 216. — asperula. III. a. 193. — Bavarica. II. b. 190. — bicarinata. VII. 354; X. *V.* 33, 124. — Brocchii. II. b. 190; IV. 640. — Carniolica. IX. 378. — cathedralis. I. 665, 666, 668. — Columna. X. *V.* 76. — communis. IV. 640. — Fittoniana. X. *V.* 77. — gradata. VII. 192, 354, 571, 572, 577; VIII. 454. — Hörnesi. VII. 192, 571. — imbricataria. II. a. 13; IV. 640. — incrassata. IX. 652. — Lommeli. IX. 335. — multi-costata. IX. *V.* 73. — multi-striata. II. b. 190. — multi-sulcata. I. 672. — Partschi. VII. 192, 334, 564, 571, 572, 579, 580. — plebeja. V. 210. — Riepeli. I. 666, 675; II. b. 173; III. a. 223, d. 77; VII. 354. — strangulata. I. 591, 592. — subangulata. V. 218, 750, 751, 753, 754. — subornata. VIII. 216. — Terebra. III. a. 147; IV. 640; IX. 606, 607, 626, 627. — terebralis. I. 665, 666, 668; II. d. 113; III. a. 223; VII. 572. — tornata. IV. 640; V. 218. — tricarinata. IV. 182. — triplicata. IV, 640. — Turris. IV. 182; VII. 354; IX. 378, 379, 380, 383, 385, *V.* 8, 9; X. *V.* 32, 33, 48. — vermicularis. I. 663, 675, 675; III. a. 223; V. 210; VIII. 326; X. *V.* 65. — Vindobonensis. 362, 664, 675; II. a. 141, b. 173, 190; III. a. 223, d. 77; IV. 704, 707, 750, 751, 890, 891; VII. 191; VIII. 227. — sp. II. a. 6, b. 173, d. 57; III. d. 77; IV. 426; V. 890; VI. 439, 440; VII. 565; VIII. 324; IX. 383, 385; X. *V.* 32, 49, 126, 128. Turritellae (fossile) des Wiener Beckens. VII. 189, 190. Typhaeloipum lacustre. VII. 546. Typhis fistulosus. IV. 182, 642. — horridus. IV. 642. — tubifer. I. 597.

Ulmaceae (fossile). I. 361, 364, 745; II. b. 147. Ulminium diluviale. VIII. 76. Ulmus bicornis. IX, 403, *V.* 35. — parvifolia. I. 235. — plurinervia. VI. 287, 288. — prisca. VI. 300. — sp. I. 396; VI. 299; IX. 345. Unio atavus. II. b. 83 Tabelle, d. 118. — Lottneri. X. *V.* 178, — Ravellianus. IV. 713. — securiformis. X. *V.* 178. — sp. II. a. 7; IX. 159, 383 698, *V.* 95. — (Monographie der Gattung). IX. *V.* 4. Ursus aretoideus. I. 101, 194. — spelaeus. I. 101, 364; II. a. 136, 137, d. 140; VI. 322; VII. 688, 689; VIII. 169, 764, 789, 815; IX. 113, 122, 147. — — var. major. II. a. 159. Uvigerina fimbriata. V. 748, 750, 751, 752, 754, 755, 758, 763. — pygmaea. V. 749, 751, 758; VI. 354. — semiornata. V. 748.

Vaccinium Acheronticum. IV. 115. — icmodophilum. IV. 115. — myrsinites. IV. 115. — Vitis Japeti. IV. 115. — sp. III. d. 144. Vaginella depressa. I. 596; VIII. 384. Vaginulina Badenensis. V. 757, 761; VI. 354. Vallesia sp. IV. 192. Valvata piscinalis. II. d. 122; VIII. 381; X. 25. Velutina elongata. IX. 650. — laevigata. IX. 605, 616, 626. — undata. IX. 606, 651. Venericardia complanata. X. 504. — intermedia. I. 592; II. b. 174; III. a. 224; IV. 188; V. 219, 748. — Jouanneti. I. 676; II. b. 174, d. 106; III. a. 223, d. 51; V. 892; X. *V.* 32. — Partschi. I. 672, 676; II. b. 174, d, 110; IX. a. 224; X. *V.* 78. — Pinnula. I. 595. — plana. IV. 709 — rhomboidea. I. 665; II. d. 113; III. a. 224; V. 219; X. *V.* 33. — scalaris. III. a. 224. — tumida. III. d. 77. — sp. II. d. 108; VI. 290, 297; VII. 588; X. *V.* 32. Venus aurea. IX. 664. — Brocchii. I. 362, 665, 668, 672, 676, 677; II. d. 113, 115; III. a. 223; VII. 355; VIII. 321; IX. 379, 380, 381, 382, 385, *V.* 9; X. *V.* 33. — Brongniarti. I. 672, 676; IV. 188; V. 748, 751; VII. 587. — Casina. IX. 645. — casinoides. I. 596, 665, 672. — Chione. I. 677. — concentrica. IX. *V.* 73. — Corbis. I. 592. — crassatellaeformis. III. a. 147. — decussata. IX. 664. — fasciata. IX. 605, 626, 644. — Gallina. IV. 644; IX. 645. — glabrata. III. a. 223; VII. 355. — gregaria. I. 622; II. b. 146, d. 117; III. a. 223; IV. 405, 426, 427; V. 565; VII. 355, 698, 699; IX. 107; X. 27, 443, 508, 569, *V.* 65. — Haueri. I. 668, 670. — incrassata. V. 565; VI. 288, 291, 296, 297, 301. — Islandicoides. IV. 644. — laminosa. IX. *V.* 73. — marginata. III. a. 223. — Maura. VIII. 223. — Moravica. I. 672. — multi-lamella. IV. 188; V. 748. — ovalis. IX. *V.* 73. — ovata. V. 219; IX. 622, 644. — parva. IX. *V.* 73. — Pectunculus. IV. 644. — plicata. I. 597, 672, 676; III. a. 223, d. 77; IV. 190, 644; V. 892; VII. 192, 355, 565, 571. — pulla. IV. 426. — Pullastra. IX. 644. — radiata. II. d. 117. — reticulata. I. 595, 596. — Rhotomagensis. X. *V.* 76. — rotundata. IV. 183. — rudis. IV. 644. — rugosa. II. b. 174, d. 108; IX. 606. — senilis. IV. 183, 644. — umbonaria. X. *V.* 49. — Ungeri. VII. 571, 572, 576. — Venetiana. IV. 644. — verrucosa. IX. 645. — Vetula. I. 672; VII. 575, 576. — virginea IX. 644. — Vitaliana. V. 565; VI. 297 Anmerk. — sp. I. 672; II. a. 141; III. d. 40; IV. 282, 427, 704, 709; V. 756; VI. 299, 434; VII. 699; VIII. 227, 323; X. 27, *V.* 128. Vermeti (fossile) des Wiener Beckens. VIII. 376. Vermetus arenarius. VII. 354. — Gigas. I. 672; III. a. 223; IV. 646; V. 210, 218. — glomeratus. IV. 645. — intortus. I. 675; IV. 645. — — var. exilior. IV. 646. Vespa crabroniformis. VII. 831. Vincularia cucullata. VI. 352. — grandis. X. *V.* 77. Vioa sp. IX. *V.* 101. Virgulina Schreibersi. II. a. 163, 164; V. 754, 755, 758, 760. Vögel (ausgestorbene) auf Neu-Seeland. X. *V.* 178. — -Knochen in der Höhle von Langenau. VIII. 169. Volkmannia. II. d. 165. — arborescens. II. b. 192. — sp. VII. 265. Voltzia heterophylla. II. b. 145. — sp. IV. 887.

Voluta acuta. X. *V.* 76. — affinis. I. 671; VIII. 224. — rarispina. I. 671, 675, 676; II. b. 173, d. 111; III. a. 222; V. 890, 891; VIII. 319, 321. Volutae (fossile) des Wiener Beckens. III. a. 203. Vulsella falcata. II. a. 14.

Walchia piniformis. VI. 102; VII. 840. — sp. VIII. 180. Waldheimia angusta. X. 85, 94. — Norica. X. *V.* 46. — Pala. X. *V.* 68. Waltonia sp. II. d. 160. Weinmannia sp. I. 557; II. b. 183. Widdringtonites Kurrianus. II. d. 143. — Ungeri. I. 164; IV. 115; V. 525; VIII. 742.

Xylomites maculatus. IV. 114. — Salicis. VIII. 741. — tuberculatus. IV. 114. — umbilicatus. IV. 114. — varius. VIII. 741. Xyrideae (fossile). II. b. 157; III. a. 178.

Yoldia. IX. 647. — sp. IX. *V.* 101.

Zamia sp. VI. 235. Zamiostrobus elegans. V. 740. Zamites Feneonis. II. b. 145. — lanceolatus. IV. 742. — sp. I. 357. Zanthoxylon sp. II. b. 188. Zizyphus Daphnogenes. VIII. 739, 753. Zosterites marinus. IV. 114; X. 27, 28. Zygomaturus trilobus. IX. *V.* 56; X. *V.* 177.

Inhalt.

	Seite
Personen-Register	1
Orts-Register	29
Sach-Register	72
Namen-Register (paläontologisches)	106

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Z ZASOBÓW
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
II 15011
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ZAKŁAD GEOLOGII